





1

2

3

11. 3. 79



AI

SVMMA PLANTARVM

QVÆ HACTENVS INNOTVERVNT

METHODO LINNÆANA

PER GENERA ET SPECIES

DIGESTA ILLUSTRATA DESCRIPTA

A FVLGENTIO VITMAN

AB. VALLUMBROS.

IN R. MEDIOL. LYC. PVBL. BOTANICES PROF.

ET PLVR. ACAD. SOC.

TOMVS II.



MEDIOLANI. MDCCLXXXIX.

TYPIS IMPER. MONAST. S. AMBROSII MAJORIS.
SVPERIORVM PERMISSV.

11 3. 19

CLASSIS V.

CONTINUATIO.

PENTANDRIA MONOGYNIA.

303. CESTRUM. **C**Or. infundibulif. Stam. denticulo in medio.
Bacca 1-locul. polysperm.
Differt a Lycia bacca 1-locul.
1. nocturnum. C. fl. pedunculat: fol. ovat-acutis. *Syst. veg. ed. 14.*
Jasminoides &c. *Dill. elth. tab. 153. f. 185.*
Jasminum &c. *Loann. Jam. 2. tab. 204. f. 2.*
Syringa &c. *Pluk. alm. tab. 64. f. 3.*
Parxu. *Few. peruv. 2. tab. 32. f. 1.*
In Jamaica, Chilli &c. h.
Dens inter lacinias singulas cor. Frutex 2-cubit.
& ultra, ramis longis, superne in latera vergentibus. Fol. alterna, breviter petiol. Citriform. margine involuto, supra late virid. subtus dilutiora. Fl. axill. & terminal. racemosi, intus albidi, extus virefcent. odori, per diem clausi. Fruct. atro-cœrul.
2. vespertinum. C. fl. lateralibus, subspicat: fol. elliptic. *Syst. veg. ed. 14. Nov. comm. Gætt. Vol. V. tab. 8.*
Ixora alternifolia, *Jacq. amer. pict. tab. 16.*
Jasminum &c. *Plum. ic. tab. 157. f. 1.*
C. fruticosum. *Aubl. Guian.*
In Antillis h.
Arb. 2-orgyal. Rami infer. patentiff. superior. adscenden. alterne undiq. dispersi, 1-2-ped. viridi-grisei: ramulosi. Propagines foliosæ. Fol. alterna, vel solitar. conferta, breviter petiolat. repanda, integerr. utrimq. viridia, subtus venis transversalibus fere paralellis, convexis, varie flexa, nitida. Fl. axill. conferti, bini-teroi-quaterni (per *Linn. 6-9.*) veluti umbellati, sessil. divergentes, mane, & vespere expansi. Cor. fere pollic. extus virid.

A ij

4 PENTANDRIA MONOGYNIA.

marginē apice inflexo, ad latera, & intus alba.

3. *diurnum*. C. fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Jasminoides &c. *Dill. elth. tab. 154. f. 186.*
Laureola &c. *Pluk. alm. tab. 95. f. 1.*
Hediunda &c. *Few. per. tab. 20. f. 3.*
In Chillī, Havana h.

Frutex 8-10-ped. post 3 a satione annos, superne in ramos 1-2-ped. divisus. Fol. *Laureola* semper virentis, nervo medio albicante; contrita odorem foetidum olent. Fl. in summis alis 8-9. collecti, breviores quam in priore, non ita odori, virecent. *Differt a laurifolio, pedunc. longioribus; limbo cor. latiore; filamentis nudis; fol. lanceol. nec ovalibus; fl. albis, nec luteis.*

4. *tomentosum*. C. fl. terminalibus, confertis, sessilibus: ramis foliis, calycibusq. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

In Amer. meridion. h.

Fig: foliorum, florumq. ut in *C. diurno*, sed calyc. rami, foliorumq. pagina infer. tomentosa: calyc. ma: cor. colorata; tubo breviori, limbo magis ampliato.

- laurifolium*. C. filamentos genticulari, nudisve: fol. ellipticis, coriaceis, nitidissimis: pedunculis penulo brevioribus. *Herit. Strep. nov. fasc. 4. tab. 34.*
Laureola &c. *Pluk. phyt. tab. 95. f. 1.*
In America h.

Frutex sempervirens, lucidus. Rad. ramosa, rugosa, cinerea. Caul. erectus, teres, rugosus, cinereus, ramosus. Rami suberecti, alterni, teretes. Fol. sparsa, breviter petiolata, elliptica, seu ovata, obtuse acumin. acumine reflexo, integerrima, uninervia, costa utrimq. prominente, glaberrima, virentia, subtus pallidiora, patentia, reclinata, perennantia, 2-3. poll. longa, 1.3 poll. lata. Petioli suberecti, fol. sexies breviores, hinc teretes, inde plani, atropurpurei. Pedunc. axillar. & terminal. secus apicem ramulorum, erecti, breviss. subcorymbosi; multifi. vix bracteati. Fl. conferti, sessiles, luteoli, 6. lin. long. 4. lin. lati. Bractæ, dum adsunt, lineares, sub-fl.

Diagnosis. Genitalia inclusa. Pedunc. breviss.
Fol. perennantia, nitentia.

paniculatum. C. filamentis edentatis: stipulis lunatis. *Herit.*

Stirp. nov. fasc. 4. tab. 35.

Hediunda &c. Feuill. Obs. 3. tab. 20.

In humidis Lima h.

Frutex 2-oryzal. foetidissimus. Rad. ramosa, spadiceo-albida. Caul. saepe pl. erecti, teretes, subramosi, cinerei. Lignum odore viroso. Rami erecti, alterni, cinerei, verrucis adspersi. Turiones teretes, virides, pubescentes. Fol. alterna, petiolat. oblong-lanceol. acuminata, basi acuta, integra, plana, vel subundulata, glabra, costa subtus tantum prominente, nerviis alternis, laxis, patentissimis, virentia, subrus pallidiora, patentia, 5-poll. longa, 20-lin. lata. Petioli foliis quater breviores, hinc teretes, inde planiusculi. Stipul. axill. fol. similes, ramulum cingentes. Paniculae terminal. basi constantes spicis alaribus, erectae, foliaceae, bracteatae, villosae, 3-poll. longae. Pedunc. axillar. alterni, patuli, multifi. Fl. conferti, vix pedicellati, herbacei, 8-lin. longi, 4-5-lin. lati. Bract. rariores, lineares.

Differt a C. vespertino, fol. planis, nec margine conniventibus; stipulis auriculatis, nec nullis; fl. paniculatis, nec tantum corymbosis. A C. *Parqui*, caul. minus paniculato; stipul. lanceol. nec linearibus; tubo cor. cylindrico, nec clavato; limbo lineari-lanceol. nec revera lanceol. filament. brevissim. edentulis.

Parqui.

C. filamentis denticulatis, nullisve: caul. florifero, paniculato: stipul. linearibus. *Herit. Stirp. nov. fasc. 4. tab. 36. Feuill. Obs. 3. tab. 32.*

Habitus Conceptionis Ciles in humidis h.

Frutex oryzae, foetidus. Rad. stolonifera, ex-albida, foetens. Coryled. binæ, ovatae, obtusae, vix petiol. Caul. plurimi, erecti, ramosi, teretes, rimosi, cinerei. Rami patuli, alterni, teretes, tuberculis subadspersi. Turiones virides, glabri. Fol. alterna, petiolat. lanceol. seu angusto-lanceol. aut utrimq. acu-

tissima, integerrima, subundulata, glabra, subrus costa elevata; patentis, læte viridia, conculera, 4-poll. longa, 1-poll. lata. Petiol. breviss. hinc teretes, inde planiusculi. Stipul. instar foliorum nascentium axillares. Paniculæ terminal. erectæ, foliaceæ; bracteæ, glabræ, compositæ spicis axillaribus, simplicibus, vel compositis, patulis, 2-poll. longis. Fl. congesti, subsessil. obscure lutei, noctu odori, 8-lin. long. 6-lin. lati. Bractea linearis, acuta, sub calycibus patens.

304. LYCIUM. Cal. 5-dent. Cor. tubulosa, fauce clausa filamentorum barba. Bacca 2-locul. polysperma.

1. japonicum. L. inerm: fol. ovat. nervosis, planis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 17.*

In Japonia h.

Frutex erectus, vix orgyal. ramosiss. Fol. opposita, subsessil. inferne attenuata, obtusa cum acumine, integerr. nervosa, patentia, glabra, supra satore virid. unguicular. minoribus intermixtis. Fl. in ramulis e fasciculo fol. solitar. vel. aggregati, erecti, sessil. decidui. Cor. tubo viridi-albo; limbo incarnato. *Var. fl. pleno.*

2. barbatum. L. inerm. glabrum: fol. oblong. glabris: fl. aggregatis, pedunculat: stipulis barbatis. *Syst. veg. ed. 14.*

L. inerm. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei h.

3. afrum. L. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Trew. skret. tab. 24. Mill. dict. tab. 171. f. 1.*

Jasminoides &c. Niss. ad. 1711. tab. 12. Mich. gen. tab. 105. f. 2.

In Africa, & in regno Valentino h.

Frutex rectus, rigidus. Spinæ confertiores quam in *L. europæo*. Fl. atro-purpurasc. Bacca magnæ, globosæ, atro-rubræ.

4. ruthenicum. L. spinosum; fol. fasciculat. linearibus: ramis dependentibus: *Syst. veg. ed. 14. Comm. Got. tin. 1779. Vol. 2. tab. 2.*

Frutex 6-ped. Spinæ axill. solitar. alterne, 2-lin. longæ. Fol. quina-novena, plura, obtusa, succosa, subglauca, patent. Fl. 2-4. peduncul. inter fol. spinis min. Cal. apice purpur. Cor. extus viridi-purpurasc. intus purpur.

PENTANDRIA MONOGYNIA, 7

fauce pallida, striis 15. saturationibus. Bacca depressa, umbilic.

3. *fatidum*. L. fol. opposit. ovat-lanceol. stipul. interfoliac. fetaceo-spinulentibus; fl. axillar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In China, Japonia.

Fol. trita odorem stercoris olent.

6. *tetrandrum*. L. spinosum; fol. ovatis, acut. carnosis: ramis angulatis, glabris: cor. 4-fid. tetrand. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. L. afro, An satis distinctum reddant carnositas, & num. flamm. quaternarius?

7. *Borrhaavia*-L. spinosum; fol. ovat. integerr. acutis, glaucis: fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

folium.

Ehretia halimifol. Heris. Stirp. fusc. 3. tab. 23.

In Peru h.

Frutex pulcherrimus, caul. spinoso, ramis inermibus. Fol. pollic. Fl. L. barbari, cœrul. odori. Fl. Lycii flaminibus barbatis. *Fruet. Ehretie.*

8. *heterophyllum*. L. fol. ovat. flexuosis, glaucis; ramis horizontalibus: spinis gemmaceis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1783. tab. 2.*

9. *barbarum*. L. spinosum; fol. lanceol. calyc. sub-2-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

Jasminoides &c. Duham. arb. 1. tab. 121. Trew. Ehret. tab. 68.

In Europa, Asia, Africa h.

Frutex debilis, ni sustentetur, decumbens. Cortex ramorum exalbidus. Fl. e singulis gemmis solitar. raro bini, intus pallide rubicundi. Bacca ovata, coccin.

10. *europæum*. L. spinosum; fol. obliquis; ramis flexuosis, teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Mich. gen. tab. 105. f. 1.*

In Europa australi h.

Frutex ramosiss. Fol. 5-6. ex eadem gemma prodeunt. Fl. e singulis gemmis 2-5. Cal. 5-fid. Cor. limbo patente, fauce pallida, nigro-striata, intus purpurasc.

Differt a L. barbaro, quod per se recta stare valet; quod fol. non plana, sed obliqua, seu flexuosa: quod ramuli flexuosi, minime angulati, ulla linea a petiol. decurrente; superficie non glabra,

sed subtomentosa; & quod spinæ ex omni gemma. A. L. *afro*, fol. lanceol. ramis flexuosis, teretibus; fructu parvo.

11. *capsulare*. L. spinosum; fol. lanceolat. tenuibus, glabris: pedunc. calycibusque pubescentibus: pericarp. capsularibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Mexico h.

Frutex ramis teretibus. Spinæ simpl. patentēs. Fol. subpetiolat. Pedunc. axill. 1-fl. Capf. ovata, mucronata.

indicum.

L. inerm. fol. ovat. utrimq. acutis, nervosis. *Retz. Obs. fasc. 2. Kæmph. am. acad.*

Frutex lævis, strictus, ramis brevibus, patentibus. Fol. parva, opposita, in petiol. tenuis desinentia, integerr. subrus pallidiora. Stip. 2. spiniform. molles, fusca. Fl. ad apices ramorum, sessil. obscure purpur.

305. JACQUINIA. Cor. 10-fid. Stam. receptaculo inserta. Bacca 1-sperm.

1. *armillaris*. J. fol. obtusis cum acumine. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 39. ed. 2. piñ. tab. 56.*

In America h.

Arbust. sub 5-ped. ramis verticillat. patentibus. Fol. verticillata, in petiol. breviss. attenuata, subrot-oblong. interdum emarginata, integerr. margine quandoque revoluta, coriacea, rigida, nitida. Racemus terminal. 2-pollic. laxus, sub-7-fl. pendulus, pedunculis ramosis. Fl. parvi, albi, odore Jasmini. Baccæ pisiform. ex aurantio-rubentes. Sem. cartilagin. flavo-subfusca: quibus perforatis armillas efformans incolæ.

2. *ruscifolia*. J. fol. lanceol-acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ed. piñ. tab. 57.*

Fruticulus &c. *Dill. elth. tab. 123. f. 149. optima. In Amer. merid. h.*

Habitus prioris. Frutex 3-ped. Fol. breviora, rigidiss. pungentia. Pedunc. penduli, 1-fl.

3. *linearis*. J. fol. linearibus, acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 40. f. 1. ed. 2. piñ. tab. 58.*

In America h.

Habitus priorum, sed minus concinnus. Frutex 2-ped. ramosiss. Fol. 4. verticillata, subsessil. pollicar. sæpe contorta, pungent. Pedunc. termi-

- nal. penduli, 1-fl. Fl. rigidiusc. inodori. Petal. alba, lacin. convexis.
306. **CHIRONIA**. Cor. rotata. Pistill. declinatum. Stam. tubo cor. infidentia: Anth. demum spir. Peric. 2-locul.
1. *trinervia*. C. herbacea; calycin. foliol. membranaceo-carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lyfimachia &c. Burm. Zeyl. tab. 67.
Ad cap. b. Spei ☉.
Tota planta amarissima. Caul. 4-gon. acutus. Fol. opposita, lanceol. acumin. integerr. trinervia, glabra. Fl. ex summis alis oppositi, pedunculat. folitar. Cor. ampla, cœrul.
2. *Jasminoides*. C. herbac., caul. 4-gono; fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
 Caul. altus, lævis. Fol. opposita, sessilia, erecta, integerr. glabra. Panícula terminal. erecta, dichotoma, paucifl. Bract. oppositæ, subulat. Cor. magnitudine *Tabaci*.
3. *Lychnoides*. C. caul. simplic. fol. lineari-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad rad. montium cap. b. Spei.
 Caul. 2-ped. strictus, teres. Fol. opposita, connata, lævia, erecta. Peduncul. terminal. 3. quorum later. instructi bractearum pari subulato. Cor. purpur. magnitudine Gladioli.
4. *campanulata*. C. herbac., fol. lanceol-linearibus: calycibus longitud. cor. *Syst. veg. ed. 14.*
In Canada.
 Caul. pedal. teres, ramis longis. Fol. lævia. Fl. terminal. folitar. purpur. longe pedunculati.
5. *angularis*. C. herbac., caul. acutangulo: fol. amplexicaulibus, ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
Facies Cent. min. Caul. pedal. alis membranac. Fol. opposita. Fl. congesti ut in *Hyperico*.
6. *linoides*. C. herbac., fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Rapuntio &c. Breyn. cent. tab. 90.
In cap. b. Spei herbidis 24.
 Caul. suffruticos. ramosus. Fol. pollicar. opposita, sessil. succulenta, glabra. Fl. peduncul. solitar. Cal. semi-2-fid. obtusus. Cor. coccinea.
7. *nudicaulis*. C. herbac., fol. oblongis, obtusiusc. caulibus sub

10 PENTANDRIA MONOGYNIA.

2-phyll. simplicifl. 1 fl. calycibus dentibus fetaceis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. sæpe in cespitem radicata.

8. *tetragona*. C. fruticosa; fol. ovat. obtusiuscul. trinerviis: foliol. calycin. obtusiusc. carinatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Flos maior, luteus. *Differt a C. trinervia, quod nostra sit fruticosa; fol. breviora obtusiora.*

9. *baccifera*. C. frutesc. baccifera. *Syst. veg. ed. 14.*

Centaurium minus &c. Comm. rar. tab. 9.

In Æthiopia h.

Simil. C. Linoidi. Frutex ramosus, 4 gon. Fl. terminal. solitar. Calyc. breves, subulati. Cor. rubicunda.

10. *frutescens*. C. fruticosa; fol. lanceol. subtomentosis; calycibus campanulat. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 97.*

Centaurium &c. Comm. rar. tab. 8. Burm. Afric. tab. 74. f. 1.

In Æthiopia h.

Frutex ramis cinereis. Fol. sub-2-pollic. opposita, sessil. obtusa, carnosæ. Pedunc. axill. foliol. binis, 2-3-fl. Rami corymbosi. Calyc. foliol. ovat. obtusa, subtoment. tubo cor. multo latiora. Fl. quadruplo ma. priore. Cor. rubra.

307. *CORDIA*. Cor. infundibulifor. Styl. dichotomus. Drupa nucleis 2-locular.

1. *Myxa*. C. fol. ovatis, supra glabris: corymb. lateralibus: calycibus 10-striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Sebestena. Black. tab. 398. Comm. hort. 1. tab. 72.

Prunus &c. Pluk. alm. tab. 217. f. 3.

Vidi-maram. H. Mal. 4. tab. 37.

In Ægypto, Malabar h.

Arbor grandis, ramosa, cortice fusco. Gemmæ prætuberant. Folia *Alni*, petiolis contortis, sparsa, basi minimo spatio angustata, apice acuminate, subtus scabra, undulata, exsucca, fere coriacea, supra satore, subtus dilute virescentia, quandoq. nervis albido-ferrugin. Cor. lutea. Drupa globoso-acumin. pedicellat. calyce cincta. Nuclei dulces, adstringentes.

2. *spinescens*. C. fol. ovat. acutis, ferratis, scabris; petiolis subsperiscentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In India Oriens. h.

Rami stricti, tomentosi, ferruginei. Fol. alterna, petiolat. tomentosa, supra magis scabra, magnitudine fol. *Cerasti*. Pedunc. breviss. Racemus axillar. simpl. vel 2-fid. fil. form. Cor. 5-dent. calyce duplo ma. Fruct. sparsi, sessil. nigri, magnitudine *Ribes*.

3. *Sebestena*. C. fol. oblong-ovat. repandis, scabris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. ed. 2. pi. tab. 44. Plum. ic. 105. Dill. elch. tab. 255. f. 331.*

Cornus sanguinea. Forsk. *Æg. Vahl.*

Caryophyllus &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 64. Catesb. car. 2. tab. 91.*

Novella nigra. *Rumph. amb. 5. tab. 75.*

In India h.

Arbusc. 10-ped. erecta, foliosa. Fol. maxima, quandoq. subrotunda, iuniora ferrata, adulta vix repanda, suprema certe integerr. Stipul. nullæ. Racemi erecti, primo terminales, dein elongatis ramis laterales. Fl. plurimi, speciosi, leviter odori. Cal. oblong. 3-fid. Cor. figuræ *Mirabilis*, fulvo-lutea, æstivatione rugosiss. *Papaveris*.

4. *Gerafcanthus*. C. fol. lanceol-ovat. scabris; panicula terminal. calycibus 10-striat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 175. f. 168 ed. 2. pi. tab. 253. f. 12. Brown. Jam. tab. 29. f. 3.*

In Jamaica h.

Arb. 30-ped. erecta, superne ramosa. Fl. corymb. gemelli. Cor. 5-fida, alba, latin. oblong. Fruct. turbinatus, carnosus.

5. *macrophylla*. C. fol. ovat. villosis, sesquipetalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Prunus &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 221. f. 1.*

In Jamaica h.

Arb. 50-ped. ramis incurvis. Fol. petiolat. rugosa, læte viridia. Racemi umbellati. Fructus *Fabæ* maioris magnitudine, rubri.

6. *Callococca*. C. fol. cordat-ovat. integerr. fl. corymbosis: calycibus interne tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ceraso &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 203. f. 2.*

Cerasa &c. *Pluk. phyt. tab. 158. f. 1.*

In Jamaica h.

Arb. 6-pedal. superne ramosa, ramis sparsis; ramul. pilis ferrugineis. Fol. verticillata, 3-4-

inæqual. sessil. utrimq. pilis fuscis. Fl. axill. & terminal. Cor. subalbida. Fruct. albus.

- tetrandra*. C. fol. ovatis, subtus asperis: fl. corymbosis, parvis: fructu albo, tetrapyreno. *Aubl. Guian. tab. 57.*
In Guiana h.
 Arb. 50-ped. superne ramosa, ramis sparsis. Fol. alterna, petiolat. acuta, undulata, integerr. supra glabra, subtus aspera, basi inæqual. pallide virentia. Corymb. amplif. axill. & terminal. quasi umbellati. Cor. subvirid. Bacca globosa, alba.
- tetraphylla*. C. fol. verticillat. fructu Olivæform. *Aubl. Guian. tab. 88.*
In Guiana h.
 Arb. 7-ped. superne ramosa, ramis, & ramulis sparsis. Fol. quaterna, breviter petiolat. oval. integerr. glabra. Fl. axill. corymb. Fruct. luteus.
- flavescens*. C. fol. ovato-oblong. acuminat. fructu Cerasiforma, e viridi-flavesc. *Aubl. Guian. tab. 89.*
In Caienna, & Guiana h.
 Frutex, 8-9-pedal. caulibus sarmentosis supra arbores sparsis. Fol. alterna, breviter petiol. integerr. glabra. Fl. axillar. racemosi. Bacca exsucca.
- Toquerè*. C. fol. cordatis, acuminat. villosis: fl. racemosi. *Aubl. Guian. tab. 90.*
In Caribæis h.
 Frutex 6-ped. Caul. erecti, ramis tomentosis, ferrugin. Fol. alterna, breviter petiol. supra hirsuta, aspera, subtus tomentosa, pallide virid. Fl. axillar. & terminal. Pedunc. longus, nudus, villosus. Cor. alba. Nux. carnosa, sublutea.
- Juglandifolia*. C. fol. oblong. scabris. *Jacq. amer. In Domingo* h.
 Arbusc. erecta, 12-pedal. inelegans. Fol. 4-5-pollic. acuta, integerr. utrimque scabra. Racem. axill. sesquipollic. paucifl. Cor. tubo cæteris triplo brevior.
308. PATAGONULA. Cal. fructiferus maximus. Cor. rotata. Stylus declinatus.

1. *Americana*. P. fol. partim serratis, partim integris. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elih. tab. 226. f. 293.*

In Patagonia Amer. austr. h.

Cordiis adfinis: an istis associanda? Frutex facie inter *Ligustrum*, & *Alaternum*; post tertium a statione annum cubital. cortice e ciner-virente, punctis albis adpersus, superne hirsutus. Fol. *Alaterni*, dilute virid. modice cava, cum venis obliquis, utrimq. glabra, margine piloso. Fl. terminal. racemosi, albi, aut ex herbaceo-albidi, odore fl. *Sambuci*.

309. EHRETIA. Bacca 2-locular. Sem. solitaria, 2-locul. Stigm. emarginatum.

1. *tinifolia*. E. fol. oblong-ovat. integerr. glabris: fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 25. Brown. Jam. tab. 16. f. 1.*

Ceraso &c. Sloan. Jam. 2. tab. 203. f. 1.

In Jamaica h.

Arb. 20-30-ped. coma oblonga, densa. Fol. sub 4-pollic. alterna, breviter petiol. Racem. terminal. magni, oblong. Fl. multi. Pet. reflexa, alba, subgraveolent. Fruct. flavus,edul. dulcis.

2. *spinosa*. E. spinosa. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 80. f. 18. ed. 2. pict. tab. 259. f. 14.*

In America h.

Arb. 25-30-ped. Spinæ subaxill. crassissimæ. Fol. 3-4-pollic. breviter petiol. oblon. obtusa, basi attenuata, integerr. quandoq. repanda, nitida. Racemi breves, subcorymbosi. Fl. plurimi, parvi. Cor. flava. Fruct. pisiform. ruber.

3. *Bourreria*. E. fol. ovat. integerr. lævibus: fl. subcorymbos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 26. amer. pict. tab. 45.*

Bourreria &c. Brown. Jam. tab. 15. f. 2.

Mespilus &c. Comm. hort. 1. tab. 79.

Pittonia &c. Catesb. carol. 2. tab. 79.

Jasminum &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 204.

In Jamaica h.

Arb. sub 15-ped. Fol. alterna, petiol. varia, lævia. Fl. terminal. Cor. alba, laciniis subrotund. Bacca 4-gona, crocea, aut aurantiaca, succulenta, nitida, edulis, dulcis.

Adfinitas cum Cordia.

4. *exsucca*. E. fol. cuneiformi-lanceolat. margine reflexis. *Syst. veg. ed. 14.*

Bourreria &c. *Jacq. amer. tab. 173. ed. 2. piæ. sub. 259. f. 13. quoad fl. & fructum.*

In Amer. meridion. h.

Arbuse. 15-pedal. Fol. 2-pollic. alterna, glaberrima. Racemi subterminal. subcorymb. Fl. mæ: priore. Cor. alba, leviter odora, laciniis cordatis. Bacca 4-gona, leviter 4-fulcata, exfucca, viridis, dein e nigro-rufescens.

dubia.

E. pedunc. 1-fl. adgregatis. Jacq. Obs. 1. p. 19. In Jamaica.

Fol. magnitudine varia, oblongo-lanceol. acuta, alterna, petiolat. integerr. glabra. Fl. parvi, fordide albentes.

internodis.

E. fol. ovatis, integris: fl. lateralibus paniculat. Herit. Stirp. fasc. 3. tab. 24.

Subria s. Soubria. Commerf. MSS.

In saxosis montibus Mauritiæ h.

Frutex sesquiorgyal. Caul. erect. teres, reticulato-rimosus, cinereus. Rami sparsi, diffusi, teretes, reticulati, punctis exalbidis tuberculati. Turiones scabriusculi, virid. mox rufescent. Fol. alternatim sparsa, petiolat. acuta, patentia, basi sæpe subinæqualia, nervosa, rugosa, venosa & glabra, virentia, subtus pallidiora, reclinata, lateribus conniventia, 3-poll. longa, 20-24-lin. lata. Petiol. scabri. Paniculæ alis vix remotæ, peduncul. patulæ, laxæ: pedunc. solitar. apice ramosi. Fl. pedicellati, albi, suaveolent. 3-lin. lon. & lati.

Dignoscit. paniculis lateralibus, alari-internodibus.

310. VARRONIA. Cor. 5-fid. Drupa nucleo 4-locul.

1. *lineata.* V. fol. lanceol. lineatis: pedunc. lateralibus, petiolo adnatis: spicis globosis. *Syst. veg. ed. 14. Ulmi &c. Pluk. alm. tab. 328. f. 5.*

In America h.

Frutex ramis subpilosis. Fol. alterna, petiolis brevibus, articulatis innixa, remota, utrimq. attenuata, nonnullis crenis ferrata, nutantia, scabra, subtus tomentosa. Pedunc. attenuati, filiform. Capitul. axill. subrotundum. Cor. parva, flava.

2. *bullata.* V. fol. lanceol.-ovatis, venoso-rugosis: spicis globosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 33. ed. 2. piæ. tab. 43.*

In America h.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 15

- Altitudo sub-12-ped. Fol. 2-pollic. alterna, scabra. Fl. *Mirabilis Jalapa*, pulchri, candidi, inodori. Drupa rubra.
3. *martinicensis*. V. fol. ovatis, acuminat: spicis oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 32. ed. 2. pict. tab. 42.*
In Marunica h.
 Altitudo humana. Fol. 3-pollic. utrimq. scabra. Spicæ 1-2-pollic. Fl. ut in priore. Drupa pisiform. rubra, pulpa dulci. Nux depretia.
4. *globosa*. V. caul. dichot. fol. lanceol-oblong. pedunc. axillaribus, elongat. nudis: spicis globosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In America h.
Differt a priore spicis globosis: cor. laciniis emarginatis: stigmate obtuso, quadruplici.
 Calyc. dentes recurvati, longi.
5. *curassavica*. V. fol. lanceolat: spicis oblong. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 221. f. 3.*
In America h.
 Frutex 15-ped. ramis senioribus ferrugineis. Fol. alterna, petiolat. acuta, serrata, rugosa, venosa, odora, supra scabra. Spicæ terminat. densæ, peduncul. Fl. parvi, inodori. Cal. inflatus. Cor. alba, limbo brevi, & emarginato. Drupa parva, rubra.
6. *alba*. V. fol. cordatis: fl. cymosis. *Syst. veg. ed. 14. Mespilus &c. Comm. hort. 1. tab. 80.*
In America h.
 Arb. 30-ped. coma ampla. Fol. 4-5-pollic. subrotundo-ovata. Cymæ amplæ. Fl. numerosi, albi, inodori: Cor. limbo campanul. Drupa oblongiusc. semipollic. subpellucida, albescens, edulis. Nux oblonga, striata, nigra. Pulpa albida, dulcis.
-
- macrostachya*. V. spicis oblong. fol. lanceol-oblongis. *Jacq. amer. In Carthagenæ fruticosi h.*
 Arbusc. erecta, 12-ped. Fol. semipedal. angusta. Spicæ semiped. Reliqua ut in *V. curassavica*.
- humilis*. V. spicis subrotund. fructibus dispermis. *Jacq. amer. Brown. Jam. tab. 13. f. 2.*
In maritimis Caribæarum h.
 Frutex 4-ped. ramosus, similis *V. globosæ*, ut forte var. sed nuxes 2-locul.

311. LAUGIERIA. Cor. 5-fida. Drupa nucleo 5-locul.

1. odorata. L. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 177. f. 21. ed. 2. piñ. tab. 256. f. 16.*

In America h.

Frutex erectus, 10-ped. ramosus. Fol. 2-pollic. opposita, petiolat. subovat. acuta, integerr. glabra. Racemi axillar. paniculati, laxi. Fl. iristes, sordide rubentes, noctu odoratill. Fructus Piso ma: molles, aterrimi. *Variet spinosa, & inermis.*

312. BRUNSFELSIA. Cor. infundibulif. longiss. Bacca 1-locul. polysperma.

1. americana. B. fl. albo: fructu croceo, molli. *Syst. veg. ed. 14. Plam. ic. 65.*

In Amer. meridion. h.

Est didynama angiosperma.

Planta frutesc. Fol. petiolat. oblonga, obtusa, seu obverse ovata, integerr. venosa. Fl. terminal. pl. Cor. speciosa, 5-fid. tubo villoso. Anth. extra cor. tubum. Pistil. longiss. Bacca globosa, carnosa.

313. CHRYSOPHYLLUM. Cor. campanul. 10-fida, lacin. alternis erectis; alternis patulis. Bacca 10-sperma.

1. Cainito. C. fol. ovat. parallelo striatis, subtus tomentoso-nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 37. ed. 2. piñ. tab. 51. Pluk. phyt. tab. 262. f. 4.*

b. C. fol. oblong-ovatis, superne glabris, subtus ferrugineis: fl. alaribus, corymbosis. *Mill. diñ.*

y. C. jamaicense, fructu purpur. *Jacq. amer.*

Anona &c. Sloan. Jam. 2. tab. 229.

d. C. caeruleum &c. *Jacq. am. tab. 37. ed. 2. piñ. tab. 52.*

e. C. microphyllum &c. *Jacq. am. piñ. tab. 53.*

In Martinica h.

Arb. cortice subrufo. Fol. 5-pollic. alterna, breviter petiol. acuta, integerr. subcoriacea, utrinq. striata, supra nuda, & sature virent. Subtus tomento col. aurei fulgentis, & Cinnamomum imitantis. Pedunc. aggregati, breves, sparsi, vel pauciss. Fl. parvi, albidii, inodori. Fructus depressiusc. rosei, cum lævi flavedine, & virore mixti, edules. Sem. fusca.

Var. y. Fruct. subovat. viridi-purpur., carne purpur.

d. Fruct. globosus, totus caeruleus, triplo min. Pulpa caeruleus.

2. argen-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 17

2. *argenteum*. C. fol. falcato-ovat. subrus tomentoso-nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 38. f. 1. ed. 2. piã. tab. 54.*

In Havana, & Martinica h.

Habitus prioris var. c. Fol. alterna, breviter petiol. integerr. supra virid. glabra. Fruct. subrotundi, sordide e purpureo-ciner. magnitudine Pruni mediocris, edules, carne molli, cœrulefc.

3. *glabrum*. C. fol. utrimque glaberrim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 38. ed. 2. piã. tab. 55.*

In sylvis Martinicæ h.

Arb. erecta, 15-ped. ramosa. Fol. vix pollic. alterna, petiolat. ovata, acuta, subcoriac. integerr. utrimque nitida. Fruct. cœrul.

- McCoucou.* C. fol. ovat-oblon. acuminat. utrimque glabris: fructu pyritor. luteo. *Aubl. Guian. tab. 92.*

In Caribæis h.

Arb. excelsa, 30-ped. superne ramosa. Fol. alterna, breviter petiolat. integerr. utrimq. pallide virent. Fruct. corymbosi, aurantiaci; caro sublutea, edulis. Sem. nitida, rufescentia; amygdala alba, dulcis.

314. *SIDEROXYLON*. Cor. 8-10-rida, lacin. alternis, incurvis. Stigm. simpl. Bacca 4-5-sperma.

1. *mite*. S. inerme, fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
An *Lauritolia* &c. *Comm. hort. 1. tab. 100. ? sed fl. absque dentibus inter flam.*

In Africa h.

2. *inerme*. S. inerme; fol. obovat. perennantibus: pedunc. teretibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 265. f. 344.*

In Æthiopia h.

Planta arborea. Fol. breviter petiolat. obsolete retusa, subrus venoso-rugosa, subpubescent. virid. glauca, oblique nervosa. Fl. axillar. & lateral. aggregati, pedicellati. Cor. rotata, herbaceo-albicans.

3. *melanophleum*. S. inerme; fol. lanceolat. perennantibus: pedunc. angulat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 71.*

Padus &c. *Burm. Afric. tab. 84. f. 2.*

Laurifolia &c. *Comm. hort. 1. tab. 109.*

Ad cap. b. Sprei h.

Tom. II.

B

Habitus Lauri nobilis. Cortex fuscus, nitidus. Fol. alterna, obtusa, subundulata, coriac. integerr. satore virid. Petiol. purpurasc. Fl. axill. glomerati. Cal. colorat. Cor. lacin. obrutis, concavis, patentibus, satore carnea.

Differt a S. inermi rumis non striatis, aut punctis verrucosis; peduncul. non teretibus &c.

4. *foetidissimum.* S. inerm. fol. suboppositis: fl. patentiss. Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. pic. tab. 32.

In Domingo, in sylvis monosis h.

Arb. 12-ped. Fol. 4-pollic. petiolat. lanceol. oblong. obtusa, undulata, nitida. Pedunc. axill. multi, 1-fl. Fl. albi, foetidiss. Fructus Cereus magnitudine.

5. *cymosum.* S. inerm. fol. opposit. petiolat. cymis compositis, & decompositis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei h.

Frut. x parvulus.

6. *tenax.* S. subinerm: fol. lanceol. subtomentos. deciduis: peduncul. filiformibus. Syst. veg. ed. 14.

C. carolinense. Jacq. Obs. 3. tab. 34.

In Carolinae ficioribus h.

Arb. 20-ped. cortice albicante, ramis tenacissimis. Pedunc. multi, pollicar. 1-fl. Fol. intra pedunc. 5-6. petiolat. obtusiusc. integerr. digital. Fl. parvi. Nectar. in fauce cor. 5-part. foliol. 3-fid. media tere longiore. Drupa ovalis. Nux ovata, nitida, basi toraminibus 2. septo arcuato distinctis. Var. *spina brevissim.*

7. *lycioides.* S. spinosum; fol. lanceol. deciduis. Syst. veg. ed. 14. Duh. arbr. 2. tab. 68.

In Canada h.

Facies Lycii. Altitudo humana. Fol. alterna, petiolat. obtusa, undulata, integerr. virid. Spina axill. brevis.

8. *decandrum.* S. spinosum; fol. elliptic. deciduis. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. Septentr. h.

Simil. priori, sed ab eo specie, aut cultura nimis varians.

Arbor. Spinæ axillar. solitariae. Fol. alterna. Pedunc. axill. multi, 1-fl. Nect. 5-phyll. ferratum, breve, ad singulam cor. laciniam singulo lobo adnato. Bacca globosa, nigra, 3-5. locul.

9. *spinosum*. S. *spinosum*; fol. perennantibus. *Syst. veg. ed.* 14.

Lycii &c. *Comm. hort. 1. tab. 83.*

Lycium &c. *Pluk. alm. tab. 202. f. 2.*

Caro-mœlli. *H. Mal. 5. tab. 39.*

In Malabarica h.

Frutex 4-5-ped. ramulis aculeatis. Fol. oblong-rotunda, crassa, densa, vix crenata, nitida, atro-virent. subtus dilutiora, nervola. Fl. subvirid. graveolent. Baccæ primum virid. dein rubræ, tandem nigræ, acidæ.

pauciflorum. S. inerm. fol. alternis: fl. patentissim. *Jacq. amer. p. 55.*

In Domingo h.

Arb. erecta, 20-ped. Differt a S. *fatidif.* fol. semper obtusis, planis, vereque alternis: peduncul. ternis-quaternis: fl. minus foetidis: cor. tubo breviss. lacin. apice concavis: staminibus cor. æquantibus.

315. RHAMNUS. Cal. tubulosus, 4-5-fid. intus coloratus; squamis stamina munientibus. Petal. 4-5. Baccæ 2-3-locul. *Dantur etiam fl. sexu distincti.*

* *spinosi.*

1. *catharticus*. R. caul. erecto: fol. ovato-lanceol. spinis terminalibus: fl. 4-fid. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

Fl. Dan. tab. 850. Duham. arbr. 1. tab. 135.

Spina insectoria. *Matth. 158. Lob. ic. 181.*

In Europæ scribus h.

Arbuscula ramosa, & frondosa, ramis senescentibus in spinam terminatis. Fol. petiol. subtriliter ferrata, nervis convergentibus. Fl. axill. fasciculati, herbidi, aut sublutei. Baccæ nigræ, nitidæ.

2. *infectorius*. R. caulibus procumbentibus: spinis terminalibus: fl. 4-fid. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

R. cathart. minor. *Arduin. mem. 1. tab. 14.*

Lycium gallicum. *Bauh. hist. 1. p. 58.*

Spina insectoria I. *Clus. hist. 1. p. 111.*

In Europæ h.

Differt a priore caulibus procumb. cor. laciniiis longitud. tubi, nec longioribus.

Fol. subtus villosa. Cal. cyathiform. edentulus.

3. *lycioides*. R. fol. linearibus: spinis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.* B ij

R. tertius &c. *Clus. hist. 1. p. 110.*

In Hispania &c. *h.*

Fol. carnosa; viridia. Fl. conferti iuxta fol. nascuntur. Cor. herbac. Baccæ nigræ.

4. *oleoides*. *R. fol. oblong. integerrim. spinis terminalibus. Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania *h.*

Simil. R. cathartico, sed min. Fol. ad gemmas 2-3. Oleæ simil. & min. lævia, confluentia, breviter petiolat. obtusisc. reticulato-venosa. Fruct. solitar. simil. *R. cathartico*.

5. *saxatilis*. *R. spinis terminalibus: fl. 4-fid. hermaphroditis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 53. Araden. tab. 14.*

Spira insectoria, pumila 2. Clus. hist. 1. p. 111.

In Italia, Helvetia inter saxa.

R. cathart. humilior. Fol. breviter petiolat. lanceol. vel ovata, obtusa, vel acutiusc. ferrulata. Pedunc. aggregati, 1-fl. Baccæ pitiform. nitidæ, atræ.

6. *theezans*. *R. spinis terminalibus: fol. ovat. ferrulat: ramis divaricatis. Syst. veg. ed. 14.*

R. Thea. Osb. it. 232. 161.

In China, pauperibus Thea succedaneum h.

Arbusc. sarmentosa. Fol. alterna, petiol. obtusisc. lævia. Spicæ terminal. Fl. interrupto-glomerati, minuti, sessil. Cor. 5-fid.

7. *pentaphyllus*. *R. spinis lateralibus: fol. solitariis, quinatisque. Syst. veg. ed. 14.*

R. ficulus &c. *Bocc. Sic. tab. 21.*

In Sicilia, Africa h.

Frutex ramis ferrugineis, spinis validis, vix pollicar. Fol. *Buxi*, petiolat. obovat-oblong. integerr. lævia, venosa, decidua. Fl. axillar. conferti, sessil. 5-fid. hermaphrodit. Squamæ binæ, ovatæ singulum fl. vestiunt. Cor. campanul. 5-part. Nectar. suburceolat. Drupa ovata, glabra. Nux ovata.

An huius generis?

**** Inermes.**

8. *Sarsomphalus*. *R. inerm: fol. ovalibus, coriaceis, integerr. emarginat. Syst. veg. ed. 14.*

In America h.

Fol. msiusc. rigidula. Corymb. axill. breves, rigiduli.

9. *volubilis*. R. inerm. caul. volub. fol. ovatis, striatis, integerrim. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

In America h.

Caul. fruticulosus, rufesc. lævis. Fol. alterna, petiolat. oblongiusc. repanda, lævis.

10. *tetragonus*. R. inerm: fol. ovar. integris, glabris, sessilibus: ramis 4-gonis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

11. *micranthus*. R. inerm: fol. ovat-lanceolat. obliquis, (subtus) pubescentibus: stipul. lanceol. acuminatis, deciduis. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 12. f. 2.*

Muntingia &c. Plum. gen. ic. 206. f. 1.

In America h.

Fol. palmar. alterna, petiolat. trinervia, supra scabra. Stipul. ferrugineæ. Racem. axill. breves, veluti parvæ umbellæ. Baccæ parvæ.

12. *cubensis*. R. inerm: fl. hermaphrodit: fol. rugosis, integerr. tomentosis: caps. 3-locul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 49. am. piç. tab. 75.*

In fruticetis maritinis Cubæ h.

Habitus *Viburni Lantanae*. In sylvis arbusc. 7-ped. Fol. alterna, breviter petiolat. ovata, obtusa, venosa; juniora argentea, nitida. Rami iuniores sericei. Pedunc. axill. ramosi, tomentosi, primo plerumq. 2-fidi, dein ulterius divisi. Cal. (per Linn. cor.) lanuginosus, ferrugineo-cinér. Petala (per Linn. squamulæ nectarii) ochroleuca. Fruct. capsularis.

13. *colubrinus*. R. inerm: fl. monogynis, hermaphroditis, erectis: capsulis tricoccis: petiol. ferrugineo-tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 50. am. ed. 2. piç. tab. 74.*

Arbor baccifera &c. Comm. hort. 1. tab. 90.

In America h.

Arbusc. 4-ped. Fol. magna, alterna, breviter petiolat. ovata, acutiusc. integerr. glabra, supra læte virent. cum venis pallidis, & lucida. Pedunc. axill. breves, umbellati, sub 7-fl. Fl. magni, virefcent. Caps. subrotun. Ramuli: pedunc. petiol. & fol. nervi subtus sunt ferrugineo-toment.

14. *alpinus*. R. inerm: fl. dioicis: fol. duplicato-crenat. *Syst. veg. ed. 14. Hall. ed. Gatt. 2. tab. 16. Hist. helv. tab. 40.*

Alnus nigra &c. *Bauh. Hist.* 1. p. 562.

In Helvetia, Carniola &c. h.

Frutex 10-ped. Fol. magna, ovat-lanceol. glaberr. Fl. axill. & intra fol. Cal. 4-fid. segment. demum reflexis. Petal. 2-fid. rubra. Bacca nigra.

15. *pumilus*. R. inerm. repens: fl. hermaphrod. fol. serratis. *Syst. veg. ed.* 14.

R. rupestris. *Scop. Fl. Carn. tab.* 5.

In monte Baldi, Pedemontio, & summam rupium fissuris h.

Differt a *Frangula* caulibus saxis adhærentibus; fol. serratis: a *R. alpino* fl. hermaphroditis.

16. *Frangula*. R. inerm. fl. monogynis, hermaphroditis: fol. (plerumque) integerrimis. *Syst. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.* 278. *Black. tab.* 272. *Duham. arbr.* 1. tab. 100. *Ludw. ed. tab.* 82.

Frangula. *Matth.* 1271.

In Europæ nemoribus humidiusculis h.

Frutex 10-ped. Fol. alterna, petiolat. ovat-acumin. venos, quand. q. minutissime serrata. Fl. axillar. peduncul. racemosi. Cor. albo viridis. Bacca primum rubra, dein nigra.

17. *lineatus*. R. inerm. fl. hermaphrodit. fol. ovat. lineatis, repandis, subtus reticulatus. *Syst. veg. ed.* 14. *Osb. it. tab.* 7. *Burm. Zeyl. tab.* 88.

Acaciæ &c. Pluk. ph. 1. 122. f. 4.

In Chinæ, Zeylonæ elevatis h.

Frutex ramul. subpubescentibus. Fol. parva, alterna, petiolat. Cal. 5-part. albus. Petala 5. fig. cal. Bacca calycis rudimento insidens.

18. *Alaternus*. R. inerm. fl. dioic. stigmate triplici: fol. serratis. *Syst. veg. ed.* 14.

Alaternus 1. 2. *Clus. hist.* 1. p. 50.

In Europa australi h.

Alia individua mar., alia hermaphrodita fem.

Arbuseula. Spinæ geminæ, deciduæ. Fol. lanceol. Fl. axillar. racemosi, pedunculati.

*** *Aculeati*.

19. *Paliurus*. R. aculeis geminatis; inferiore reflexo: fl. trigynis. *Syst. veg. ed.* 14.

Rhamnus, seu *Paliurus* &c. *Bauh. hist.* 1. p. 35. *Dod. pempt.* 576.

Ramno 3. *Matth.*

In Europa australi h.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 23

Frutex fol. petiolat. ovatis, trinerviis, subseri & dilute viridibus. Pedunc. axill. 2-3-4-fl. Petal. parva, flava. Fruct. clypeiform. siccus.

20. *Lotus*. R. aculeis geminatis: altero recurvo: fol. ovato-bl. *Syst. veg. ed. 14.*

Zigiphus sylvestris. Shaw. afric. f. 631.

In regno Functano h.

Frutex ramulis teretibus. Fol. omnia *Zigiphi*, fig. nervis, glabritie, margitudine; at margo obsolete, & rarius crenatus.

21. *iguaneus*. R. aculeis subgeminat. altero patente: fol. nudis: racemis axillar. monoicis. *Syst. veg. ed. 14.*

Juiuba &c. Comm. hort. 1. tab. 73.

In America h.

Arb. ramis longiss. reclinatis. Spinæ breves, fortes. Fol. alterna, petiolat. disticha, lanceol-acumin. glabra, subferrata. Racem. axillar. parvi, solitar-bini-terni. Cor. exigua, flava. Drup. subrotund. vel ovata, Piso duplo ma: flava, pulpa dulci. Nux crassa, rugosa, alba, 1-locul.

22. *Napea*. R. aculeis subgeminat. recurvis: fol. ferratis, utrimque lævibus: peduncul. corymbosis: fl. semidyginis. *Syst. veg. ed. 14.*

Juiuba &c. Pluk. alm. tab. 216. f. 2.

Vidara littorea. Rumph. amb. 2. tab. 37.

In Zeylona h.

Arb. ramis subvillosis. Fol. alterna, petiolat. disticha, ovata, obtusa, crenulata, trinervia, flavescent. Pedunc. lateral. Aculei breves, nigri. Stipul. setaceæ.

23. *Juiuba*. R. aculeis solitar. recurvis: fol. retusis, subtus tomentosis: pedunc. aggregatis: fl. semidigyn. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 338.*

Malus indica. Rumph. amb. 2. tab. 36.

Perim-toddal. H. Mal. 4. tab. 41.

In India h.

Arbor ramis teretibus. Fol. petiol. subrotundo-ovata, basi altero latere angustiore, tenuissime ferrata, supra glabra. Pedunc. axill. Aculeus minimus, vel nullus.

24. *Enoplia*. R. aculeis solitar. recurvis: fol. (ovatis) subtus tomentosis: pedunc. aggregat. subsessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Juiuba &c. Burm. Zeyl. tab. 61.

In Zeylona h.

Arbor ramis alternis. Fol. alterna, petiol. ovat-acumin. non raro obliqua, trinervia, glauca, subtus sericea. Pedunc. axill. Fl. minimi.

25. *circumscissifolius*. R. aculeis solitar. recurvis, oppositifol. fol. oppositis, bifariis, obcordatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India Orient. dumetis h.

Rami patentiss. simplic. oppositi, angulati, læves, Fol. obsolete denticulata. Stripul. 2, minutissimæ ad folia. Fructificat. laterales, umbellatæ, simplic. Petal. ciliata, nivea.

26. *Ziziphus*. R. aculeis geminat. altero recurvo: fol. ovat-oblon. fl. digynis. *Syst. veg. ed. 14.*

Giuggioleno, o sia Zizole. *Matth.*

In Europa australi h.

Fol. triaervia, ferrata, lutescentia, nitida. Pedunc. conferti. Petal. flavescent. Fruct. ovati.

27. *spina Christi*. R. aculeis geminatis, rectis: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cænopia &c. *Clus. hist. 2. p. 313.*

Nabca &c. *Alp. Egypt. tab. 19.*

Juiubæ &c. *Pluk. alm. tab. 197. f. 3.*

In Æthiopia, Palæstina h.

Arbust. pubesc. Fol. ovata, acuta, acute ferrata, non nitida. Spinæ horizontal. apice nigricantes.

- Xylopyrus*. R. caul. aculeato; aculeis recurvis: fol. ovat. subtus tomentosis: fl. corymbosis. *Retz. Obs. fasc. 2.*

In India Orient. h.

Arbor vix homine altior, ramosa. Fol. late ovata, sæpe ad cordatam fig. accedentia, non raro obliqua, inæqualiter ferrata, superne obscura. Corymb. axillar. Cal. tomentosus. Drupa sicca, *Ceraso* maior, insipida.

An huius generis propter Drupam?

- Hydriensis*. R. *Hacq. Pl. alp. Carniol. tab. 2. f. 2.*

In Carniola h.

Arb. 3-4-orgyal. parum ramosa, inermis, cortice cinereo-fusco, verrucoso. Rami apice tantum foliosi, in orbem positi. Fol. ovalia, unico, vel duplici dente prædita, glabra, supra fusco-virentia, subtus albida. Fl. cymæ sub 30-fl. Cal. viridis. Baccæ rotundatæ, molles, pellucidæ, maturæ nigrescentes.

- scandens*. R. Hill. hort. Keven. tab. 20.
In Carolina h.
- dauricus*. R. Pall. it. 3. Gmel. apud Amman. tab. 33.
In Dauria h.
Statura R. cathartici. Lignum pallide rubrum.
Rami recti, nusquam spinescunt. Fol. multo
longiora R. cathartico, longius petiolat. ovat-
acumin. argute ferrulata. Cor. virescens. Bac-
cæ piliform. fuscæ.
- erythroxylum*. R. Pall. it. 3. tab. 1. f. 1.
In Dauria h.
Statura lycioidis. Altitudo humana. Frutex iner-
mis, tortuosus, ramis paucis, fuscis. Fol.
longiss. lanceol-linear. subtiliter serrata. Pe-
dunc. floriferi inter fol. fasciculati, crebri. Fl.
parvuli, masculi flavescent; fem. virescent.
Bacca piliformis, fusco-lutescens.
- Myrtinus*. R. inerm. fol. ovat-oblongis, integerrim. subtus
lucidis. Burm. Ind.
Habitat Coromandeli h.
- Nummularia*. R. aculeis solitar. gemmisque recurvis: fol. ovat.
integerr. peduncul. corymbosis. Burm. Ind. &
Zeylan. 132. Pluk. nlm. tab. 197.
In Zeylona, & Java h.
- heterogeneous*. R. aculeis geminis, simplic. & recurvis: fol. ova-
tis, serrulatis, trinerviis, lucidis: pedunc. so-
litar. 1-fl. Burm. Ind.
In India h.
- surinamensis*. R. inermis, fruticosus: fol. perennantibus, ellip-
ticis, acute dentatis, glabris, nitidis. Scop.
Delic. Insul. fasc. 3. tab. 5.
Habitat Surinami h.
Fruticul. erectus, ramis patentiusculis, sparsis,
ramulosis. Fol. fere Buxi, alterna, brevipe-
tiolat. supra obscure viridia, subtus flavescen-
tia, margine cartilagineo, dentibus rarioribus
rubellis. Fl. ex summis folior. alis 3-5, par-
vi, luteo-virides.
316. PHYLICA. Periant. 5-part. turbinatum. Pet. nulla. Squa-
mæ 5. stamina munientes. Capf. tricocca, in-
fera. Fl. plurimi, in discum, vel capitulum
collecti.
1. *crisoides*. P. fol. linearibus, verticillatis. Syst. veg. ed. 14.
Alaternoides &c. Comm. hort. 2. tab. 1.
In Æthiopia h.

Caul. fruticos. sesquiped. fuscus, pubesc. Fol. inordinata, mucronata, rigida, tomentosa, supra glabra. Fl. terminal. solitar. sessil. vix magnitudine *Pisi*, albi.

2. *bicolor*. P. fol. linearibus, pubescentibus: calycibus communibus cor. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei, in campis arenosis h.

Caul. ramis virgatis, rufescentibus, albo-pubescentibus. Fol. sparsa *Taxi*, margine revoluta, patula, subtus albo-toment. Capitula terminal. solitar. Cal. comm. reticulato-venosus, squamis lanceol. rubro carinatis, pilosus. Cor. pilis albis prædita.

3. *plumosa*. P. fol. lineari-subulat., summis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ricinus &c. Seb. thes. 1. tab. 23. f. 4. 5.

Alaternoides &c. Comm. præl. tab. 13.

Chamaelea &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 3.

In Æthiopia h.

Caul. 2-ped. ramosus, foliorum vestigia diu servans. Fol. parva, pilis albicantibus, supra viridia, subtus albicant. Fl. in apice ramorum in orbem dispositi, albo-lutei.

4. *imberbis*. P. fol. linearibus, obtusis, scabris: fl. terminalibus, pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Sanamundæ &c. Breyn. cent. 18. tab. 1.

Erica &c. Seb. mus. 2. tab. 49. f. 5.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. ramosus. Fol. subpetiolat. patula, subhirsuta, subtus sulco tomentoso. Fl. solitar. sessil. magnitudine *Pisi*. Cal. foliol. ciliatis.

5. *stipularis*. P. fol. linearibus, stipulat. fl. quinquecornibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Chamaelea &c. Burm. Afric. tab. 43. f. 2.

Ad cap. b. Spei, in arenosis h.

Caul. prolifer, nudus, seu scabriusc. a casu fol. Fol. sparsa, teretia, obtusiusc. lævia, patula, margine revoluta. Stipulae geminae, minimae, subulatæ. Capitula cal. polyphyl. a squamis nudis, obovatis, 2-part. lana contextis. Cor. infundibulif. lacin. 5. linearibus, longis, extus albo-lanatis.

Differt a P. ericoide cor. laciniis corniformibus, cor. lutea longioribus.

6. *dioica*. P. fol. cordat. fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei,

PENTANDRIA MONOGYNIA. 27

Calyc. squamæ hirtæ pilis glauco-griseis. Cor.
pilis albis. *Var. fol. revoluta-linearibus.*

7. *callosa*. P. fol. cordat. lanceol. supra papillofis, subtus
tomentosis, apice pungentibus: fl. capitat. vil-
lofis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Distincta a P. cordata, cum qua fig. fol. convenit.

8. *spicata*. P. fol. cordato-sagittat. lanceol. subtus toment.
supra glaberrim. acuminat. pungentibus: spicis
lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Differt a cæteris capitul. elongato in spicam vil-
losum.

9. *buxifolia*. P. fol. ovatis, sparsis, ternisque, subtus tomen-
tosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Chamaelea &c. Burm. Afric. tab. 44. f. 1.

In Æthiopia h.

Frutex ramis longis. Fol. breviter petiolat. cras-
sa, venosa, supra virid. glaberr. nitentia. Fl.
terminal. in capitulum subrotund. parvum dis-
positi. Fl. parvi, herbac.

10. *racemosa*. P. fol. ovat. glabris: fl. simplicibus, paniculato-
racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Juxta cap. b. Spei fissus h.

Frutex 3-ped. ramis rufescentibus, subpubescen-
tibus. Fol. conferta, alterna, sessil. acuta,
integerr. glabra, similia *Pentæ mucronatæ*. Pa-
nicul. terminal. e spicis compositis, fl. minu-
tis, alternis, sessilib., simplicibus. Cor. 2-ba.

An distincti generis?

11. *pinifolia*. P. fol. acerosis, utrinq. planis, glaberrim. fl. pa-
niculato-racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

In cap. b. Spei summis montibus h.

12. *parviflora*. P. fol. subulat. acutis, scabris, subpilosis: ramis
paniculato-multifl. *Syst. veg. ed. 14.*

In cap. b. Spei campis arenosis h.

Frutex 2-ped. simil. P. ericoidi, sed raro multifl.
fl. minoribus.

* *Omissa in Syst. veg. ed. 14.*

13. *cordata*. P. fol. cordato-ovat. patentibus: caul. prolifero.
Syst. veg. ed. 13.

Alaternoides &c. Comm. rar. tab. 12.

Ad cap. b. Spei h.

Differt a P. buxifolia, quod fol. non ovata, sed

cordata, exquifite apice attenuata. Caul. prolifer, nec capitula lateralìa.

strigosa. P. fol. lineari-lanceol. ramorum glabriuscul; ramulor. hirsuto-substrigosis: capitul. terminalibus, folitar. sessilibus, strigosis. *Berg. Fl. cap. Ad cap. b. Spei* h.

Caul. fruticosus, ramis inferne purpurascentibus, superne cinereo-tomentosis. Fol. brevia, semi-unguicul. breviter petiol. disticha. Capitula magnitudine fructus *Cerasi*, albo-substrigosa.

ariophoros. P. fol. linearibus, acutis, subpubescentibus: ramulis corymbosis: capitul. terminalibus, lanato-hirsutis. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. Rami longi, ramulosi. Fol. breviter petiolat. margine revoluti, subtus tomentosa, unguicular. Capitula magnitudine *Pisi*, subrotunda, alba. Cor. extus albo-hirsuta.

317. CEANOTHUS. Petal. 5. faccata, fornicata. Bacca sicca, 3-locul. 3-sper.

1. *americana*. C. fol. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. 1. tab. 51.*

Evonymus &c. Comm. hort. 1. tab. 86. Pluk. alm. tab. 28. f. 6. phyt. tab. 63. f. 2.

In Virginia, Carolina 24. h.

Frutex ramis rarioribus. Fol. *Corni sem.* simil. sed min. opposita, & alterna, breviter petiol. ovato-acumin. crenata, dilute virentia. Racemi terminal. Fl. parvuli, triangul. albicantes, aut spadicei, inodori.

2. *asiaticus*. C. fol. ovatis, enerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

Grossularia &c. Burm. Zeyl. tab. 48.

In Zeylona h.

Arbor. Fol. *Pyrì*, alterna, petiolat. ovat-acumin. obtusiusc. ferrata, lævia, venosa. Racemi axillar. sæpe 2. parvi. Fl. pl. caduci. Bacca magna, calyc. inclusa.

3. *africanus*. C. fol. lanceol. enerviis: stipul. subrotundis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 126. f. 1.*

Alaternoides &c. Comm. præl. tab. 11.

Ricinoides &c. Seb. thes. 1. tab. 22. f. 6.

In Æthiopia h.

Frutex 4-ped. ramosus. Fol. alterna, breviter

petiol. acumin. crenata, supra nitida, subtus albo-virid. petiolis rubris. Cal. semi-5-fid. Petal. calyci inserta. Stylus ex 3. coadunatis. *Thee succedaneum. Gesner.*

318. ARDUINA. Cor. 1-pet. Stigm. 2-fidum. Bacca 2-locul. Sem. solitaria.

Facies inter Randiam, & Penæam media.

1. *bispinosa*. A. Syst. veg. ed. 14.

Lycium &c. Mill. ic. tab. 300.

Ad cap. b. Spei h.

Frutex dichotomus. Spinæ 2. bigeminæ, erectæ. Fol. opposita, subsessil. cordata, integerrima, perennia. Fl. terminal. conferti, albi. Baccae rubræ.

319. BUT-TNERIA. Cor. 5-pet. Filam. apice petalis connata. Caps. 5-cocca, muricata.

1. *scabra*. B. fol. lanceolat. costa, petiolisq; aculeat. Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. 1. tab. 96.

In Amer. merid. h.

Frutex 4-5-ped. sarmentosus, quaquaversum diffusus, ramis alternis, longis, angulatis. Fol. 4-5-uncial. inferior. petiol. super. sessil. alterna, oblonga, petiolo, costaque aculeata; iuniora min. lanceol-acumin. seniora ovata, acuta: glabra, integerr. vel rariter ferrata. Racem. axill. & terminal. oblongi, aggregati. Fl. parvi, albicantes, inodori.

2. *carthagenensis*. B. fol. ovatis, in costa, petiolisq; aculeatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. pi. p. 41. qui eam diversum a priore declarat.

In Carthageria h.

3. *microphylla*. B. fol. inermibus: ramis flexuosis, lævibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 29.

In America h.

Habitus singularis. Spinæ caul. solitar. laterifol. horizontal. Fol. remota, alterna, seu gemina, subsessil: ovalia, obtusissima, patentia. Pedunc. lateral. axillar. capillar. Cal. 5-phyll. patens. Petal. linearia, basi utrimq; lobata.

320. MYRSI-NE. Cor. semi-5-fid. connivens. Germ. corollam replens. Bacca nucleo 5-locul.

Essentia Generis sua est in sigm. maximo, fimbriato-plumoso, extra florem exproredto.

1. *africana*. M. Syst. veg. ed. 14.

Vitis idæa &c. *Comm. hort.* 1. tab. 64.

Buxus &c. *Pluk. alm. tab.* 80. f. 5.

Frutex &c. *Breyn. cent.* 9. tab. 5.

In Æthiopia h.

Fl. axillar. 2-3. breviter peduncul. nutantes.

Cor. pallida, punctis testaceis scabra, ciliata.

Stam. laciniis cor. opposita, nec alterna.

Bacca fig. & magnitudinæ *Uvæ Ursi*, cœrul.

321. BLAD-
HIA. Cor. rotata, decidua. Baccæ 1-sperm. Sem.
arillatum.

1. *japonica*. B. fol. ferratis, glabris. *Syst. veg. ed.* 14.
Thumb. Jap. tab. 18. *Ad. Medic. Svec. T.* 1.
tab. 16.

Tadli-banna. *Kæmph. exot. Fasc.* V. p. 775.

In Japonia h.

Radix repens. Caul. fruticos. palm-ped. erectus,

flexuosus, raro ramosus. Fol. in apice fre-

quentia, pollicar. superiora parum maiora,

opposita, petiol. ovata, acuta, patentia. Fl.

axillar. umbellato-racemosi; peduncul. cernui.

Cor. alba, suaveolens.

2. *villosa*. B. fol. ferratis, villolis. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb.*
Jap. tab. 19.

In Japonia.

Caul. digital. erectiusc. filiform. tomentosus. Fol.

unguicul. opposita, petiolat. ovata, acuta,

remote ferrata, ciliata, villosa-scabra. Fl.

lateral. pedunculati. Pedunc. paucifl. tomen-

tos. *Priore longe min. & tota villosa.*

3. *crispa*. B. fol. oblong. crispis, glabris. *Syst. veg. ed.* 14.
Thumb. Jap.

Fanna Tadli-banna. *Kæmph. am. exot. Fasc.* V.
p. 776.

In Japonia.

Caul. erectus, spitham. & ultra, simpl. teres,

glaber. Fol. spitham. superior. longiora, al-

terna, petiolat. valde oblonga, apice atten-

nuata, sed obtusiusc. erecta, nervosa, subtus

pallidiora. Fl. lateral. paniculati. Bacca pifi-

form. rubra.

322. CELA-
STRUS. Cor. 5-petal. patens. Caps. 3-angul. 3-locul.
Sem. calyptrata.

1. *bullatus*. C. inerm. fol. ovat. integerrimis. *Syst. veg. ed.*
14.

Evonymus &c. *Pluk. alm. tab.* 28. f. 5.

In Virginia.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 31

Frutex fol. alternis. Fruct. coccineus, eleganter bullatus.

2. *scandens*. C. inerm: caul. volubili. *Syst. veg. ed. 14.*
Evonymoides &c. *Duham. arbr. 1. tab. 95.*
In Canada h.

Frutex ramis alternis. Foll. 3-poll. longa, 2-lata, alterna, petiol. supra obscure virid. subtus dilutiora, oblique nervosa. Fl. terminal. racemosi, albo-virescent. Fruct. lutei.

3. *myrtifolius*. C. inerm. fol. ovat. serrulat: fl. racemosis: caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

Myrtifolia &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 193. f. 1.*
In Virginia, Jamaica h.

Frutex cortice incano. Fol. alterna, petiolat. ovata, acuta, utrimque glabra. Fl. ex summis alis, parvi, albi.

4. *procumbens*. C. inerm: procumb. fol. ovat. serratis: fl. axillar. subfoliatar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

5. *filiformis*. C. inermis: fol. lanceol. integris: ramis filiformibus: pedunc. axillar. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

6. *acuminatus*. C. inermis: fol. ovat. acuminat. serratis: pedunc. axill. 1-fl. caul. erecto, laxo. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

7. *microphyl-lus*. C. inerm: fol. ovatis, obtusis, integris: cymis terminalibus, dichotomis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

8. *orbiculatus*. C. inerm: fol. rotundat. acuminat. serratis: pedunc. axillaribus, subtrifid. *Syst. veg. ed. 14.*

C. auriculatus. *Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. erectus, fruticos. Rami ferrugin. punctis albis adpersi. Fol. semipollic. alterna, petiol: patentia, ferrata, glabra, nervosa. Fl. axillar.

9. *punctatus*. C. inerm: ramis scandentibus, punctatis: fol. ovat. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia h.

Caul. fruticos. ramosus. Rami elongati, ramulosi. Fol. pollic. in ramulis alterna, petiolat.

- acuta, glabra, subtus, pallidiora. Fl. sparsi, solitar. peduncul. Sem. arillo flavo, rugoso.
10. *striatus*. C. inerm: ramulis erectis, striatis: fol. ovat. acuminat. ferratis: pedunc. sparsis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Tumb. Jap.*
In Japonia h.
 Caul. fruticos. Rami subrugosi, cinerei. Ramuli oppositi, divaricato-erecti. Fol. pollic. opposita, breviter petiol. patentia, glabra. *Differt a priore, ramis non punctat. nec scandentibus; & fol. subsessilibus.*
11. *alatus*. C. inerm: ramis alatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
Nisi kingi. Kämpf. am. exot. Fasc. V. p. 796.
In Japonia h.
 Caul. fruticos. orgyal. Rami oppositi, erecti, laxi, glabri. Ramul. oppositi, breves, patentiss. alati. Fol. pollic. alterna, breviter petiol. elliptica, acuminata, patentia, tenuissime ferrata, glabra. Fl. in ramulis sparsi, peduncul. Sem. arillata.
12. *buxifolius*. C. spinis foliosis: ramis angulat. fol. obtusis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lycium &c. Pluk. alm. tab. 202. f. 3.
In Æthiopia h.
 Fol. obovata, acute ferrata. Cymæ axillar. peduncul.
13. *pyracanthus*. C. spinis nudis: ramis teretibus: fol. ovali-lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 126. f. 2. 3.*
Lycium &c. Comm. hort. 1. tab. 84.
In Æthiopia h.
 Frutex 3-ped. & ultra, ramosus. Fol. inordinata, *Pyracantha* similia, superne ferraturis acuminatis, ut fere spinosis, perennantia. Cymæ lateral. peduncul. Fl. multi, albid.
14. *lucidus*. C. fol. ovalibus, integerr. marginatis, nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Herit. Stirp. tab. 25.*
Evonymus &c. Pluk. alm. tab. 280. f. 3.
Ad cap. b. Spei h.
 Frutex erectus, ramis fuscis, duris. Fol. alterna, obtusiusc. brevissime petiol. venosa, lucida, margine reflexo. Pedunc. axillar. conferti, simplic. fol. breviores. Petal. concava. Stigm. 3. divergent.

Differt

Differt a priore, fol. rotundioribus, concavis, quasi cymbæformibus; & ramis inermibus.

15. *linearis*. C. spinis foliolis: fol. linearibus, integris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

16. *integrifolius*. C. spinis foliolis: fol. ovat. obtusis, integerrimis, cymis lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

ovata. C. *Hill. hort. Kewens. tab. 16.*

In Baharmia h.

Frutex 8-ped. Fol. ovata. Fl. albid.

323. *EVONYMUS*. Cor. 5-petal. Caps. 5-gona, 5-locul. 5-valv. colorata. Sem. calyptata.

Fructificatio in quibusdam speciebus aufert 3.^m numeri partem.

1. *americanus*. E. fl. omnibus 5-fid: fol. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 115. f. 5.*

Rhus &c. Comm. hort. 1. tab. 81.

In Virginia h.

Frutex superne ramosus. Fol. opposita, lanceol. acumin. serrulata, satate virid. Fl. axill. 1-2. Cor. luteo-viresc. cum rubedine. Caps. verrucosa.

2. *tobira*. E. fl. 5-fid. fol. oblong. retusis, integris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.*

Tobera. Kamph. alm. exot. Fasc. V. f. 797.

In Japonia h.

Caul. erectus, fruticos. vix orgyal. ramosus, aphyllus. Rami erecti, alterni, teretes, aphylli, fasci. Ramuli foliosi, viridi. Fol. in ultimis ramulis aggregata, 1-2-pollic. alternat. & opposita, petiolat. obliqua, erecta, crassiusc. reticulata, marginibus deflexis, supra virid. nitida, nervo longitudinali albo, glabra. Petioli compressi, pallidi. Fl. terminal. aggregato-subumbellati, erecti, pedunculati. Cor. 5-raro 6-petal. alba, odore fl. *Citri*.
Tota planta sublaefcens, tetra.

3. *lasifolius*. E. fl. plerisq. 5-fid: capsul. aluto-angulatis, in pedunculis fol. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 289. Clus. hist. 2. p. 56.*

In Austria, Helvetia &c. h.

4. *europæus*. E. fl. plerisque 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 202.*

Tom. II.

C

Evonimo. *Mauh.*

In Europa h.

Arbust. 10-pedal. Fol. opposita, petiol. ovat-lanceol. Petal. ovat-oblonga, subvirid. Caps. roseo, & purpur. col. mixta.

Var. cortice leproso, Jacq: Austr. 1. tab. 49.

Planta hybrida. Petal. virore flavescente suffusa, cum col. sordide sanguineo.

E. verrucosus. Syst. veg. ed. 14.

5. *atro-purpureus. E. fl. omnibus 4-fid: ramis glabris: fol. petiolat. acutis. Syst. veg. ed. 14. Jacq: hort. 2. tab. 120.*

Altitudo humana. Fol. opposita, petiol. oblong-lanceol. acuminata, tenuissime serrulata, utrimq. glabra, petiolis, & margine purpurascens. Pedunc. 2-4-fl. Petal. atro-purpur.

7. *japonicus. E. fl. 4-fid: fol. ovat. obtusis, serratis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Jan.*

Iso kuroggi. Kamph. em. exot. Fasc. V. p. 790.

In Japonia h.

Caul. fruticos. orgyal. nudus, strictus, cinereus. Rami oppositi, erecto-patent. parum foliosi, virides. Ramuli breves, decussati. Fol. in ultimis ramis pollicar. adproximata, opposita, petiolat. serraturis obtusis, inferne integra, crassa, nervosa, glabra, erecto-patentia, subtus pallidiora. Fl. axillar. paniculati. Panícula subfastigiata, trichotoma, decomposita, divaricata. Cor. alba. Caps. subglobosa, 3-4-locul. 4-valv. *Var. fol. albo-maculatis.*

inermis. E. fol. alternis, ovatis, serrulatis, Forsk. Suppl. Æg.

In Arabia h.

Caul. fruticos. Fol. parva, sessil. nitida, venis reticulata. Cal. 5-part. ruber. Baccæ 3-5. intra calyc. maturæ nigrescentes.

324. DIOSMA, Cor. 5. petal. Nectar. 5. supra germen. Caps. 3-5. coalitæ. Sem. calyptrata.

1. *oppositifolia. D. fol. oppositis, subulatis, acutis. Syst. veg. ed. 14.*

Spiræa &c. Comm. rar. tab. 1.

Hypericum &c. Seb. thes. 2. tab. 40. f. 5.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. vix pedal. fuscus, ramulis cruciatis. Fol.

- parva, sessil. Rami compositi, in quorum apice fl. pl. albicautes. Caps. 5. subvirid.
2. *hirsuta*. D. fol. linearibus, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14.*
Spiræa &c. Comm. rar. tab. 3.
Ad cap. b. Spei h.
Odor totius plantæ Anisi stellati. Fruticul. vix altitudinem humanam attingens. Caul. simpl. rufescens. Fol. sparsa, breviter petiol. imbricata. Fl. pauci, subumbellati. Petal. alba.
Vales in Hemisrania.
3. *rubra*. D. fol. linearibus, mucronatis, glabris, carinatis, subtus bifariam punctatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Spiræa &c. Comm. rar. tab. 2.
Erica &c. Pluk. mant. tab. 347. f. 4.
In Æthiopia h.
Habitus Juniperi. Fol. breviter petiol. subimbricato-patentia, subtriquetra, glabra, subtus punctis pertusa. Fl. subadgregati. Petal. obverse ovata, alba.
4. *ericoides*. E. fol. lineari-lanceol. subtus convexis, bifariam imbricatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ericaformis &c. Pluk. amalth. tab. 279. f. 5.
In Æthiopia h.
Fruticul. pedal. Fol. sparsa, breviter petiol. obtusa, carnosae, teretia, glabra. Pedunc. sub 2-fl.
Hæc valde fragrans in Emplastris Hottentottorum.
5. *capensis*. D. fol. linearibus, triquetris, subtus punctat. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
Fol. opposita. Stam. sterilia huic fere petaloidea sunt.
6. *capitata*. D. fol. linearibus, imbricat. ciliatis, scabris: fl. capitato-spicat. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
Facies omnino Erica, seu Brunia nodifloræ. Caul. 2-ped. erectus, prolifer, fuscus. Fol. conferta, sparsa, octosariam imbricata, extus convexa. Fl. purpur. sessil.
7. *unicapsularis*. D. fol. lineari-lanceolat. capsul. 1-locular. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
Caul. ramis virgatis, lævibus. Fol. alterna, subpetiol. supra lævia, subtus rugosa, glabra, integerrima, sed quasi ferrata, cum punctis

- pellucidis. Pedunc. lateral. paucifl. Fl. minuti.
Capf. sæpius folitar. incurvata.
8. *latifolia*. D. fol. ovat. crenatis: caul. villosus: pedunc. axillar. folitariis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
Frutex ramis subpubescentibus. Fol. petiol. obtusiusc. vix acuta, margine punctis pellucidis crenulata, lævia, non disco punctata.
9. *marginata*. D. fol. cordato-attenuat. membranaceo-marginatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
Frutex erectus, ramulis vix pubescentibus. Fol. remota. Fl. ex summis alis solitarii.
10. *barbigera*. D. fol. amplexicaul. cordatis: petal. barbatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
Frutex ramosus. Fol. opposita, mucronata, lævia, subtus punctata. Corymb. terminal. subsessil. Cal. 5-gon. Petal. albo-barbata.
11. *tetragona*. D. fol. cordat. retusis, complicato-carinatis, ciliatis: ramis 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
Dignoscitur fol. confertis, ut caulis totus foliosus sit: & fl. magno.
Fol. latiora, quam longa, erecta, carinata, acumine patente.
12. *cupressina*. D. fol. ovat. imbricat. triquetris: fl. terminalibus, solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ericæformis &c. *Pluk. alm. tab. 279. f. 2.*
Ad cap. b. Spei h.
Rami erecti, filiform. alterni. Fol. parva, Ericæ, erecta, sessil. apice calloso, colorato. Cal. membranac. Petal. sæpe 4. obovat.
13. *imbricata*. D. fol. ovat. imbricat. mucronat. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
Simil. D. *ciliata*, sed petal. purpur. subrotund. unguibus calyce triplo longioribus.
14. *lanceolata*. D. fol. elliptic. obtusis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.
Fol. utrimq. pilis raris.
15. *ciliata*. D. fol. lanceolat. ciliat. rugosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Spirææ &c. Seb. mus. 2. tab. 17. f. 5. Pluk. alm. tab. 411. f. 3.
Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. superne ramosus. Fol. sparsa, breviter petiol. patentia, carnosa, margine, & carina ciliata. Fl. subumbell. pedicel. t-fl. hirsutis. Umbell. breves, simplices, densæ, sessiles. Bract. 2. ciliatæ. Petal. alba, oblong. unguibus vix calyce longioribus.

16. *crenata*. D. fol. lanceol-ov-libus, oppositis, glanduloso-crenatis: fl. foliatar. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Frutex facie *Betule nanæ*, ramis rubentibus. Fol. breviter petiolat. obverse ovata, subtus punctis adpersa. Fl. racemosi. Calyc. foliol. subulata, crenata. Petal. alba.

17. *uniflora*. D. fol. ovat-oblong. fl. terminalibus, solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cistus &c. *Pluk. mant. tab. 342. f. 5.*

Ad cap. b. Spei h.

Fruticulus. Fol. longe maiora, & rigidiora quam in priore, sparsa, imbricata, integerr. carnosa, utrimq. glabra, nitida, luteo-viridia. Fl. 1-2. Calyc. foliola magna, ovata, foliisque fere latiora. Petala carnea.

18. *pulchella*. D. fol. ovat. obtusis, glanduloso-crenatis; fl. axillar. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia, ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. pedat. & ultra, ramis dichotomis. Fol. ultra lineam longa, sparsa, patentia, carnosa, subtus nitida. Bract. minimæ, ovatæ, obtusæ. Petal. 5. ovat-oblong. obtusa, erecto-patentia, pulchre cœrul. vel alba.

- succulenta*. D. fol. opposit. carnosus, supra canaliculat. inferior. lemi-teretibus, superior. triangularibus; aculeato-ciliat. *Berg. Fl. Cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. ramis foliosis. Ramuli paniculati. Fol. subsessil. subparent. Fl. terminal. Pedunc. sub 2-fl. Bract. ternatæ, ciliatæ. Petal. subtus minutissime ciliata.

- villosa*. D. fol. ovat-oblong. acutiuscul. subsessilibus, villosis: fl. terminalibus, congestis. *Berg. (Hartogia) Fl. Cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosi, ramis umbellatim ramulosis. Fol. vix semi-unguicul. subtus hirsuta, subciliata,

frequentia, patentia. Fl. 6-7. Cal. hirsutus.
Cor. villosa, tenuissime ciliata.

315. HOVENIA. Cor. 5-pet. petal. convolutis. Stigm. 3-fid.
Capf. 3-locul. 3-valv.

1. *dulcis*. H. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Kenpokonna. *Kamph. am. exot. Fasc. V. p. 808.*
f. 809.

In Japonia h.

Caul. fruticos. sesquiorgyal. crassus. Fol. palmaria, alterna, petiolat. subcord. ovata, acumin. dependens. serrata, nervosa, glabra. Petioli reflexi. Fl. axill. & terminal. paniculati. Panicula dichotoma, compressa. Pedunc. carnosus, carne rubente, eduli, dulci, sapore fere Pyri, Cor. alba.

316. BRUNIA. Fl. aggregati. Filam. unguibus petalorum inserta. Stigm. 2-fid. Sem. folitar. 2-locular.

1. *nodiflora*. B. fol. imbricat. acutis, triquetris. *Syst. veg. ed. 14.*
Cupresso-pinulus &c. *Breyn. cent. 2. tab. 10.*

Erica &c. *Pluk. mant. tab. 346. f. 4.*

In Æthiopia h.

Caul. fruticos. ramosus. Fol. parva, obtusiusc. subcompressa, carinata, incurva, basi adnata, persistentia, 5-fariam laxè imbricata, squarrosa. Fl. capitati. Capitulum magnitudine fructus Cerafi. Cor. comm. discoidea. Cal. 5-part. Pet. 5. linear. rubra.

Hæc videtur a reliquis aliena, styl. 2. fructuq. supero, 2-locul.

2. *paleacea*. B. fol. quinquefariam imbricat. adpressis: corymbo terminali; paleis capitulorum exsertis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Frutex simil. priori, sed fol. min. ramos tegentia.

Caul. fuscus. Fol. parva, lanceol. gibba, acutiusc. apice calloso-fusca, supra plana, subtruncata, basi adnata, glabra. Petala 5. lanceol.-linear. obtusiusc. erecta, tenera, calyc. longiora, alba. *Congener B. nodifloræ.*

3. *lanuginosa*. B. fol. linearibus, patulis, apice callosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Tamariscus &c. *Pluk. alm. tab. 318. f. 4.*

In Æthiopia h.

Simil. B. Abrotanoidi. Rima nectarifera ut in illa.

Caul. fruticos. plusquam palmar. inferne nudus.

Fol. sparsa, sessil. disticha, obrutiusc. utrimq. carinata, apicibus nigris, glabra. Capitul. pedunculat. Cor. com. æqualis. Petal. 5. minima, ovata, concava, erecta, alba. Ramuli lanugine araneorum instar impleri.

4. *abrotanoides*. B. fol. lineari-lanceol. patentibus, triquetris, apice callosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afric. tab. 100. f. 1.*

Levisanus &c. *Pet. gaz. tab. 5. f. 7.*

Erica &c. *Pluk. mant. tab. 346. f. 7.*

In *Æthiopia* h.

Caul. fruticos. Fol. petiol. sparsa, obtusiusc. patentiss. glabra. Capitula subumbellata, globosa. Cor. uniform. alba. Petal. 5. obtusa, patentia. Germ. superum. Styl. 1. emarginatus.

5. *ciliata*. B. fol. ovat. acuminat. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. In Æthiopia.*

Germ. superum. Styl. 2-fidus.

6. *radiata*. B. fol. linearibus, triquetris; cal. radiante, foliol. intimis coloratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Chrysanthemum &c. *Breyn. cent. tab. 82. Pluk. mant. tab. 454. f. 7. Moris. hist. 3. f. 6. tab. 3. f. 43.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Caul. fruticos. plusquam pedal. subtrichotom. pilis longis, raris adpersus. Fol. sparsa, breviter petiol. obtusa, satore virid. summa pilosa. Fl. terminal. sessil. paniculati. Cor. comm. parum convexa. Pet. 5. obl. obtusa.

7. *glutinosa*. B. fol. linearibus, triquetris, calyce radiante: foliol. omnibus coloratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Muscus &c. *Pluk. mant. tab. 431. f. 1. ?*

Ad cap. b. *Spei* h.

Similis priori: differt disco fl. ampliore, glutinoso; fol. confertioribus; sed præcipue calyc. (ex bracteis congesto) fol. omnibus elongatis in radium coloratum.

8. *verticillata*. B. fol. triquetris, obrutis, glabris: ramulis fastigiatis, verticillatis: capitul. terminalibus, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. *Spei*.

Capitula parva, nec globosa.

327. *CYRILLA*. Petal. acuta, receptaculo inserta. Styl. 2-fid. persistens. Capf. 2-locul.

1. *racemiflora*. C. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Carolina* pictis humantibus h.

Frutex orgyalis. Rami compositi. Fol. alterna, petiol. lanceolata (Ligustri), exstipulata, integerr. glabra, supra subtilissime venosa. Racemi pl. terminal. penduli, spitham. bract. fetaceis. Fl. albi. Petala disco villosa.

328. ITEA. Petala longi, calyci inserta. Capf. 1-locul. 2-valv.

1. *virginica*. I. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arbr. 1. tab. 126. Pluk. ph. t. 339-23-4.*

In Virginia h.

Frutex humanæ altitudinis. Fol. alterna, petiol. ovata, ferrata. Racemi terminal. albi. *Facies Padi.*

329. GALAX. Cal. 10-phyll. Cor. hypocraterif. Capf. 1-locul. 2-valv. elastica.

1. *aphylla*. G. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia h.

Caul. simpl. nudus. Spica laxa, alba. Capf. colorata.

330. CEDRELA. Cal. marcescens. Cor. 5-petal. infundibulif. basi ad $\frac{1}{3}$ receptaculo adnata. Capf. lignosa, 5-locul. 5-valv. Sem. deorsum imbricata, ala membranacea.

1. *odorata*. C. fl. paniculatis. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 10. f. 1.*

Cedrus &c. Pluk. alm. tab. 157. f. 1.

Pruno &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 220. f. 2.

In Amer. meridion. h.

Arbor magna, ramis in coma sparsis, oblongis.

Fol. 2-3-pedal. alterna, pinnata; foliol. oblongo-acuta, mucrone angusto, integerr. glabra. Racemi compositi, ramis patentibus; ramulis 2-3-fl. Cor. Li'iacca, fere Hyacinthi, albescent, carnea. Lignum odoratum.

331. ELÆODENDRUM. Cor. 5-pet. Drupa ovata, nuce 2-locul.

1. *orientale*. E. *Syst. veg. ed. 14. Ad. helv. vol. 9. tab. f. 2.*

332. CALODENDRUM. Cor. explicata, 5-petal. Nect. 5-phyll. Capf. 5-locul.

1. *capense*. C. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Diff. nov. pl. gen. p. 43.*

333. ESCALLONIA. Petal. 5. distantia, lingulata. Stigm. capitatum. Bacca 2-locul. polysperma.

1. *myrtilloides*. E. *Syst. veg. ed. 14. Lin. suppl.*

In Amer. merid. h.

Frutex glaberrim. ramulis 1-fl. Fol. ramea, adproximata, brevissime petiol. alterna, paten-

tia, linguæform. apice tenuissime ferrata, glaberrima. Flos terminal. erectus.

Planta ficcata nigrescit.

334. CORYNOCARPUS. Nectar. 5. petaliform. cum petalis alternantia, basi glandulifera.

1. *lavigata*. C. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

In nova Zeylanda h.

Fol. alterna, petiolat. obovata, seu cuneiform. integerr. submarginata, venosa, glauerr. Panicula terminal. magna, sessilis, rugosa. Fl. albi.

335. ARGOPHYLLUM. Petala 5. Nectar. pyramidale, 5-angul. longitudine cor.

1. *nitidum*. A. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

In nova Caledonia.

Planta sericeo-tomentosa, nitida. Fol. alterna, petiol. ovata, utrimq. acumin. integerr. supra viridia, glabra. Pedunc. axillar. solitarii, elongati.

336. MANGIFERA. Cor. 5-petal. Drupa reniform.

1. *indica*. M. fol. simplicibus: fl. pentandris. *Syst. veg. ed. 14.*

Manga &c. Rumph. amb. 1. tab. 25.

Mao &c. Hort. Mal. 4. tab. 1. 2.

In India h.

Arbor 40-ped. ramis in orbem longe, lateque diffusis, cortice nitente; succo fusco, amaro. Fol. 2-3-4. simul ex eodem pedunc. ramis inhaerent, spithamam longa, palmum, & ultra lata, oblong-rotun. integerr. densa, nervosa, glabra, supra viridi-fusca, nitida, subrus dilutiora, costa flavescent. odore suavi, aromatico; iuniora rubra. Racemus compositus, brachiatus. Fl. parvi. Pet. candida, macula flavescente. Drupa magna, matura aurea, gratissima.

2. *pinnatis*. M. fol. pinnatis: fl. decandris. *Syst. veg. ed. 14.*

Lin. Suppl.

In India h.

Fol. ped. impari-pinnata. Foliol. oblong. integerrima.

amba. M. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Arabia.

Fol. conferta, sparsa, alterna, spitham. lanceol. Fructus magnitudine ovi anserini, flavus, edulis.

337. **HIRTELLA**. Petal. 5. Filam. longiss. persistens, spiralia. Stylus lateral. Bacca 1-sperm.

Est triandra monogyna. Houghton. Journ. des Sçavans. 1785.

1. *americana*. H. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 8. ed. 2. pict. tab. 11.*

In Brasilia, Martinica sylvis ad ripas torrentum h. Arbor 20-ped. Fol. 5-pollic. alterna, petiolat. ovalia, oblonga, acumin. integerrima, nitida, subtus pube grisea. Racem. terminal. semiped. laxi, villosi. Petal. alba.

338. **PLECTRONIA**. Petal. 5. calycis fauci inserta. Bacca 2-sper. inferta.

1. *ventosa*. P. *Syst. veg. ed. 14.*

Rhamnus &c. Burm. Afric. tab. 94.

Ad cap. b. Spei h.

Arb. spinosa, ubi fol. destituitur ramis 4-gonis. Fol. 4-pollic. longa, 3. circiter lata, opposita, petiol. ovat-acumin. integerrima, lævia, virid. Corymb. axillar. capillar. brachiati, fol. breviores. Petala reflexa, flava. Baccæ virid.

339. **RIBES**. Petal. 5. & flam. calyci 5-fido inserta. Styl. 2-fid. Bacca globosa, umbilicata, polysper. inferta.

* *Ribesia inermia*.

1. *rubrum*. R. inerme; racemis glabris, pendulis; fl. planiuscul. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 285.*

Ludw. ed. tab. 92. Knorr. del. 1. tab. 1. 5.

Ribes vulgare. Mauh.

In Sylvis alpestribus h.

Frutex 4-10-ped. Fol. vitiginea, alterna, petiolat. lobis incis, subtus subcanescent. Fl. axillar. racemosi. Petal. 2-fid. viridia. Baccæ parvæ, rubræ, vel albæ.

2. *petraeum*. R. inerme; racemis florentibus erectis; frutescentibus pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. ic. rar. tab. 39.*

Habitat . . .

Frutex 3-4-ped. cortice ex rubro-nigricante, tandem cinerascens, aculeis nusquam armatus. Racemi per truncum, & ramos undiq. sparsi, ex gemmis propriis solitariis. Fl. respectu magni, elegantes, per racemos sparsi, brevi-

ter pedunculati. Cal. coloratus, speciosus, roseus, quandoq. sanguineus, pelvifor. Petal. exigua, semiovat. alba, latiora quam longa, rotunda. Fol. in apice ramorum, & inter racemos multo ampliora *R. alpini*, plerumq. 3-loba, lobis magis, minus acutis, serratis, nuda, læte virid. tum ex virore nigricantia, petiolis longis pilis ciliatis. Baccæ magnæ, globosæ, sature rubræ, nitentes, læves, minus farinosæ, quam in *R. alpino*.

3. *alpinum*. *R.* inerme; racemis erectis; bracteis flore longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 47. Gunn. norv. II. tab. 2. f. 1. 2. Bauh. Hist. 2. p. 93. Besl. hort. vern. fol. 14. f. 1.*

In Europæ sepibus, sylvis montanis h.

Fol. priore plusquam dimidio min. saturatius viridia, magis lucida, supra subpilosa, subtus glabra. Petal. flavo-virid. Baccæ minus rubræ, saturæ. *Var. fol. angustioribus, acutioribus, ultra dimidium fere trilobis.*

4. *nigrum*. *R.* inerme; racema pilosis: fl. oblong. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 556. Ludw. ed. tab. 95. Knorr. delic. 1. tab. 1. 6. Black. tab. 285. Lob. adv. ic. 202.*

b. Ribesium &c. Dill. elth. 244. tab. 315.

In Europa, Pennsylvania &c. vallibus, & montibus h.

Frutex etiam 10-pedal. Fol. semitrilobata, lobo medio acuto, lateralibus semiquadratis. Racemi rariores. Pedunc. subhirsuti. Petala ex albo-rubent. Baccæ solitar. maiores nigræ. *Odor urinæ felinæ. Thee succedaneum. Gesn.*

**** *Grossulariæ aculeata*.**

5. *diasantha*. *R.* fol. incis; aculeis geminis ad gemmas. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pall. it. 2. tab. 1. f. 2.*

In Dauuria h.

Frutex erectus, sesquiulnar. striatus. Rami recti: aculei divergentes. Fol. fasciculata, cuneiform. trilobato-incisa, subtrinervia. Racemi inter folium solitar. multifi. ramento lineari ad singulum fl. Pl. parvi, virescenti-flavi. *Baccæ rubicundæ, dulces.*

6. *reclinata*. R. ramis reclinatis, subaculeatis: peduncul. bractea triphyllis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Germania, Helvetia h.

Baccæ obscure purpurascens.

7. *Grossularia*. R. ramis aculeatis; petiolorum ciliis pilosis: baccis hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. G.*

In Europæ montibus, ad vias in lapidosi h.

Fol. ampliora. Spinæ longiores, & validiores.

Petal. rubicunda, extus pilosa, intus hirsuta.

Baccæ grandes, albicantes, hirsutæ. Bract. 2-fida.

8. *Uva crispa*. R. ramis aculeatis: baccis glabris; pedicellis bract. 1-phylla. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dun. tab. 546. Black. tab. 277.*

Grossularia &c. Duham. arb. 1. tab. 109.

Uva spina. Matth.

In Europa boreali h.

Frutex 6-ped. Fol. semitriloba. Petala alba, aut rubella. Bacca magna, umbilicata, alba, cum lineis viridibus.

9. *oxyacanthoides*. R. ramis undique aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Grossularia &c. Dill. elth. tab. 139. f. 116.

In Canada h.

Differt a priore fol. profundius incisus, glabris, subtrus pallidioribus. Baccæ R. vulg: magnitudine, atro-purpur.

10. *cynosbati*. R. aculeis subaxillaribus: baccis racemosis, aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq: hort. 2. tab. 123.*

In Canada h.

Facies priorum. Fol. parum fissa. Pedunc. sæpius 5-fl. Cor. R. *Grossularis*. Germ. in fl. hispidum, nec aculeatum. Bacca magnitudine nucis *Coryli*, undique armata aculeis robustis.

- prostratum*. R. inerme; baccis hirsutis. *Herit. Stirp. nov. tab. 2.*

In Terra-nova h.

Frutex humil. Radix fusca, læsa fragrantiss. Caul. cubital. reclinatus, rimosus, cinereus. Rami alterni, nunc erecti, nunc prostrati, ramulosi. Turiones spadicei, nitidi. Gemmæ erectæ, ovatæ, rubicundæ. Fol. alterna, petiol. membranac. patent. cordata, 5-loba, lobis

summis minus divisis, acuta, inæqualiter serrata, revoluta, 5-nervia, venosa, rugosa, juniora pubescent. adulta glabra, 3-4 pollic. longa, & lata. Racemi lateral. hispidi, bracteati, $1\frac{1}{2}$ poll. longi. Flos pedicellat. patens, purpureasc. 2-3. lin. latus. Pedicel. purpureo-hispidi, uti racemus, qui 3-4. lin. longus. Bract. sub pedicel. lineari-lanceol. concava, subhispida. Baccæ hispida 5-6. lin. longa, 4. lin. lata, edulis, sed contemnenda.

Differt a congeneribus, ramis repentibus, & glandulis pedicellatis in exterioribus inflorescentiæ partibus: ab inermibus, fructibus hispidis. Gemmæ magis divaricatæ, rubræ, nec pubescent. ut in R. nigro.

floridum. R. inerme; racemis pendulis: fl. cylindricis: bracteis fl. vix brevioribus. *Herit. Stirp. nov.*

Ribesios &c. *Dill. elth. tab. 244.*

In Pennsylvania h.

Racemi numerosi, villosi, valde penduli. Fl. ventricoso-cylindrici; lacin. longioribus, revolutis. Baccæ nigræ.

Fol. utrimq. glandulis fulvis adpersa: in R. nigro glandulæ in pagina inferiore tantum; in cæteris nullæ. Bract. linear. pedicello longiores: in R. nigro bract. minutissimæ, pedicello breviores. Gemmæ cineræ, nec rubræ.

340. GRO-
NOVIA. Petal. & stam. calycis incisuris inserta. Caps. monosper. infera.

1. *scandens.* G. *Syst. veg. ed. 14. Martyn. cent. 1. tab. 40.*
In vera Cruce.

Planta cucurbitac. cirrhis scandens, graveolens. Caul. altissim. ramosiss. Fol. pampinea, urentia. Fl. parvi, tristes.

341. AQUILICIA. *Est Læca æquata.*

342. HEDERA. Petal. 5. oblonga, patentia, apice non coalita. Baccæ 5-sper. calyce cincta, globosa. Fl. in umbella simplici. Frutex volubilis.

1. *Helix.* H. fol. ovatis, lobatisque. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 188.*

Hedera arborea. Matth.

In Europæ arboribus putrescentibus, & sepibus h.
Caul. fruticos. volubil. Fol. alterna, petiolat. inter. triangular. summa solum ovata: dura, nervosa, integerr. nitida. Fl. terminal. glo-

- merato-racemosi. Petala virescent. Baccæ subrot. apice dilatatae, nigrae, intus purpureae.
2. *quinquefolia*. H. fol. quinquatis, ovatis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Corn. Canad. tab. 100.*
In Canada h.
 Arb. sarmentosa, scandens, ramosiss. Fol. longe petiol. Racemi 3-fid. bis dichot. ultimo umbellat. Cal. breviss. obtuse dentat. apice rubicundus. Petal. oblong. obtusa, apice fornicata, virid.
343. *VITIS*. Cal. 5-dentat. Petala apice coherent. emarcida. Baccæ 4-5-sperm. supera. *Fl. racemosi.*
1. *vinifera*. V. fol. lobatis, sinuat. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Duham. arb. fruit. 2. Black. tab. 154. Ludw. ed. tab. 125.*
b. V. aepyrena. Bauh. hist. 2. pag. 72.
Colit. in totius Orbis locis temperatis. Labrusca, seu sylvestris, ad sepes, & dumeta sponte nascitur h.
 Frutex debilis, capreolat. Fol. 3-lobat. lobis profunde divisis. *Fl. racemosi. Cirrhus oppositifol. racemifero-floriferus.*
2. *indica*. V. fol. cordat. dentat. subtus villosi: cirrhis racemiferis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 39. f. 2. Scembra-valli. H. mal. 7. tab. 6.*
In India h.
Magnitudo V. vulg. tota villis griseis adspersa.
 Frutex sarmentosus. Fol. alterna, petiol. ovato-acumin. Cirrhi dependent. Racemi corymbosi, subumbellati. Baccæ subrot. acumin.
3. *Labrusca*. V. fol. cordat. subtrilobis, dentat. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 259. f. 1. Pluk. phyt. 249. f. 1. Sloan. hist. 1. tab. 210. f. 4.*
In Amer. septent. h.
 Sarmentosa, prorepens. Cirrhi axill. ramosi. Fol. profunde dent. venosa. Racemi longi, ex nodis dependent. Baccæ coalitæ, min. nigricant.
4. *heterophylla*. V. fol. simplicibus; inciso-3-5-lobis, serratis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
 Caul. scandens, ramosus, nodosus, articulatus, subangulat. glaber. Rami alterni, parentes. Fol. alterna, petiol. suprema indivisa, serrata, supra satute virid. lævia, subtus pallidiora,

PENTANDRIA MONOGYNIA. 47

venis scabris. Cirrhi peduncul. oppositi, 2-fidi. Panícula subdichotoma, glabra. Cor. alba. Bacca globosa, magnitudine *Pisi*, viridis.

5. *vulpina*. V. fol. cordat. dentato-serratis, utrimque nudis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 249. f. 1. In Virginia h.*

Stirps, & crescendi modus ut in *V. vinifera*. Rami lanuginosi. Fol. supra viridia, subtus alba. Baccæ R. *vulg.* magnitudine, satore purpureæ.

6. *trifolia*. V. fol. ternatis; foliol. subrotund. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Folium &c. *Rumph. amb. 3. tab. 166. f. 2.*

In India h.

Sarmentosa. Rami breves, nodosi. Cirrhi spirales. Racemi corymbosi, subumbell. Baccæ turbinatæ.

7. *laciniosa*. V. fol. quinatis; foliol. multifidis. *Syst. veg. ed. 14. Corn. Canad. tab. 183.*

In Canada h.

Sarmentosa. Flores evanidi. Bacca grano min. albida.

8. *japonica*. V. fol. quinatis, subpedatis, glabris; foliol. crenatis, crenis aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Japon.*

In Japonia u.

Caul. decumbens, herbac. parum ramosus, angulatus, glaber. Fol. alterna, petiol. 5-part. potentia: foliol. petiol. glabra, nervosa, supra viridia, subtus pallidiora; intermedium maius, longius, petiolatum, acutius: infer. duplo min. semipollic. obtusiora, petiolo 2-fido infidentia. Cirrhi oppositifol. angulati, 2-fidi. Fl. axill. paniculati. Panicul. fastigiata, supradecomposita, primo trichotoma, dein dichotoma, tandem racemosa. Petal. 4. viridia.

9. *pentaphylla*. V. fol. quinatis; foliol. indivisis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. scandens, herbac. filiform. sulcatus, glaber. Fol. alterna, petiol. foliol. ovalia, acuminata, tenuia, glabra; lateralibus min. subpollicar. Racemi axillar. fol. longiores, flosculis remotis, minimis.

10. *heptaphyl*- V. fol. septenat. ovatis, integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In India Orient. h.

Smil. Hederæ quinquefol. Caul. scandens. Fol. alterna, longe petiolat. Foliol. 5-8. petiolul. elliptica, glabra, consistent. mucronata. Racem. terminal. maximus e spicis alternis. Spicæ simplic. subimentosæ; fl. verticillis remotis.

11. *arboresc.* V. fol. supra decompositis; foliol. lateralibus pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Bon. 3. part. 2. tab. 24.*

Frutex &c. Pluk. mant. tab. 412. f. 2.

In Carolina, Virginia h.

Frutex ramis remotis. Fol. alterna, petiol. capreolata. Corymbi parvi, & rari. Bacca parum acumin. rubra.

344. *LAGÆCIA.* Involuc. univers. & partiale. Petal. 2-fid. Sem. 2. infera; nuda.

1. *Cuminoides.* L. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 55.*

In Creta, Lemno, Lycia, Galatia ☉.

Fol. impari-pinn. basi dilatata, vaginantia; foliol. profunde incis, & veluti spinosis. Capitula glomerata, e villosis, candidis pedicell. quibus sem. adhærent. Petal. bicornia.

345. *RORIDULA.* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. Anth. basi scrotiform. Caps. 3-valv.

1. *dentata.* R. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spec. h.

Habitus Droseræ. Caul. fruticos. Fol. subulata, dentibus filiform. ciliata. Scapus ramosus in pedunculos.

- tetrandra.* R. fol. orbiculatis, tetoso--clavatis: flaminibus inæqualibus. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Caul. fruticos. diffusus, ramosus, teres. Petiol. & calyc. hispidi setis albidis, apice capitulo flavo, ut in Drosera rotundifol. Fol. vix remota, alterna, patentia, nervis 3. profundis. Pedunc. axillar. filiform. 1-fl. hispidi, ruf. scent. Cor. 4-fid. flava. Stam. 4. rubra. Anth. flavæ. Spectat ad aliud genus.

346. *SAUVA-GEŒIA.* Cal. 5-phyll. Cor. 5-petal. limbriata. Nectar. 5-phyllum cum petal. alternans. Caps. 1-locul. erecta.

- x. erecta.** S. fol. oblong. angustis: fl. solitar. brevi pedunc. infidentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 31. 1. 3. ed. 2. pic. tab. 77.*
Ireon &c. Brown. Jam. tab. 19. f. 2.
In Domingo, Jamaica, Surinamo ☉.
Habitus Hyperici, vel Corchori. Caul. herbac. erecti, subpedal. teretes. Fol. alterna, ovato-lanceol. obtuse ferrata. Pedunc. lateral. Fl. albi. Stipul. ciliatæ.

- adima.** S. fol. oblong. ferratis: fl. longe peduncul. *Aubl. Guian. tab. 100. f. 2.*
In Guiana 24.

Caul. pl. 2-pedal. ramosi, angulati. Fol. alterna, ovato-lanceol. denticulis rubris ferrata, glabra, nuda, venosa. Stipul. 2. oblong. cursu ciliis rufescentibus. Fl. axillar. solitarii, vel gemini.

347. **CAROXYLON.** Cor. 5-petal. Nectar. 5-phyll. connivens, cor. infertum. Sem. tunica vestitum.

1. **Salsosa.** C. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Diff. nov. plant. gen.*

348. **CLAYTONIA.** Cal. 2-valv. Cor. 5-petal. Stigm. 3-fid. Caps. 3-valv. 1-locul. 3-sper.

1. **virginica.** C. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ornithogalo &c. Pluk. alm. tab. 102. f. 3. Rudb. Obs. 2. f. 6.

In Virginia, Sibiria 24.

Caul. dodrant-palm. inferne rubent. Fol. radicalia, multa, *Chamanerii* vulg. similia: caulina 1-2. par. breviora, & angusta. Pedunc. tam e summo caule, quam secundum longitudinem. Fl. albi, rubro lineati.

2. **sibirica.** C. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. ed. 14.*

Limnia. Ad. Stock. 1746. tab. 5.

In Sibiria 24.

Cauliculi 1-pl. declinati, cubital. teretes, succulenti, flexiles, pallide virent. Fol. radicalia petiol. nervosa, glaberrima: caulina duo, opposita, sessil. Racemi axillar. duo, secundi, altero 2-phyll. Fl. rubri. Stam. unguibus petal. inserta.

3. **Portulacaria.** C. caul. arbore erecto. *Syst. veg. ed. 14.*

Crassula &c. Dill. elth. tab. 101. f. 120.

In Æthiopia h.

Caul. 1-2-cubital. ramis oppositis, ramulosis.

Tom. II.

D

Fol. opposita, obverse ovata, crassa, læte virent. nitida, avenia, succosa.

349. HELI- Spatha universal. partialesque. Cal. o. Cor. 3-
CONIA. petal. Nectar. 2-phyl. Capsul. 3-cocca.

1. *Bihai*. H. fol. nervosis, reticulat. basi attenuatis; nectar. hastato, libero. *Syst. veg. ed. 14.*

Folium &c. *Rumph. amb. 5. tab. 62. f. 2.*

b. *Bihai* &c. *Flum. gen. 50. ic. 59.*

γ. *Bihai* &c. *Plum. gen. 50.*

In Amer. calidiore h.

Habitus Musa, Herba 8-10-ped. Fol. ampliss. radical. oblong. utrimque acuta, longitud. petiolor. Scap. erectus. Spath. membranac. rubellæ. Petal. 2. superius simplex, intra quod petal. minutum, acuminat: inferius apice 3-fido. Cor. crocea, macula cœrul.

2. *alba*, H. folior. nervis simpliciss. glaberrim. basi ovat-rotundata: nectar. hastato, libero. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Rumph. amb. 5. tab. 63. f. 2.*

Ad cap. b. *Spei 24.*

3. *psittacorum*, H. fol. glaberr. nervosis, basi rotundat: inflorescent. glaberrima: spadice erecto, ebracteato: nectar. lanceol. adnato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Surinamo 24.

Caul. simpl. teres, lævis. Fol. radical. pedat. statura *Cannæ*, petiol. lanceol. caulina parva, remota, alternis, sessil. conduplicata, *Tradeschantiæ*, 3-4-lanceol. Pedunc. 4-5. axill. breves, 1-fl. Fl. col. luteo, & roseo variegati. Petal. lanceol. triquetra; superius æqual. triplo latius, dorso plano, utrimq. carinato, apice 2-fido: inferius angustius, carinatum, apice macula fusca. Nectar. intra petalum superius, longitudine petali, ovat-lanceol. dorso fere ad apicem petalo adnatum.

4. *hirsuta*, H. fol. basi rotundatis, simplicissime nervosis, glaberr: inflorescentia hirsuta: spadice flexuoso: nectar. lanceol. adnato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Amer. meridi 24.

Habitus cæterarum specierum. Spadix spitham. hirsutus, articulis versus proximam spatham incrassatis. Spathæ alternæ, lanceol-subul. ca-

rina hispida. Pedunc. 9-12. in alis spatharum, breves, aphylli, hirsutiss. Cor. curva. Petal. superius complicatum, hispidum, apice 2-fid. Inferius latius, complicatum, hispidum, oblong: interius apice macula fusca notatum. Nectar. lanceol. Peric. hispidum.

350. ACHY- Cal. 5-phyll. Cor. o. Stigm. 2-fid. Sem. so-
RANTHES. litar.

1. *aspera*. A. caul. fruticoso, erecto: calycibus reflexis, spicæ adpressis. *Syst. veg. ed. 14.*

b. *A. ficula*.

Amaranthus &c. *Bocc. Sic. tab. 9. Pluk. phyt. 260. f. 2.*

y. *A. indica*.

Amaranthus &c. *Burm. Zeyl. tab. 5. f. 3. Pluk. alm. tab. 10. f. 4.*

Auricula &c. *Rumph. amb. 6. tab. 12. f. 1.*

Cedeli. *H. Mal. 10. tab. 78.*

In *Sicilia, Zeylona, Jamaica* h.

Altitudo humana. Rami patentes. Fol. cuneiformi-acumin. subtus lanugine argentea. Spicæ pedal. Fl. maturi contra caulem reflexi. *Arabica* var. fol. utrimq. glabris, viridibus; similibus *Plumbaginis Zeylanicæ*, quam *Sicula* latioribus, subtus punctatis.

2. *lappacea*. A. caul. fruticoso, diffuso, prostrato: spicis interruptis, floscul. lateralibus utrimque fasciculo setarum uncinato. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. *Burm. Zeyl. tab. 18. f. 1.*

Centaurium &c. *Pluk. alm. tab. 82. f. 2.*

Wellia-codiveli. *Hort. mal. 10. tab. 59.*

In *India*.

Caul. 4-goni, obtusi, inermes. Fol. opposita, lanceol-ovata, acuta, integerr. Rami axill. longi, strictissimi. Spicæ longæ, solitar. Fl. 3. transverse positi. Ad latera fl. lateralium utrimq. penicillus purpur. e setis rigidis uncinatis, sensim se pendentibus in pilulam lappaceam.

3. *muricata*. A. caul. fruticoso, parulo: fol. alternis: fl. spicatis, remotis, ovatis; calyc. squarrosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. *Rumph. amb. 5. tab. 83. f. 2.*

In *Ægypto, Arabia* & b. ☉.

Planta erecta, facie *Celastræ*. Fol. alternæ, ped ij

- tiol. ovata, seu cordata, lævia, petiolis subciliatis. Pedunc. axill. 5-goni, fol. longiores. Pet. 3. interiora erecta, purpur: super. & inferius patent. pallidiora. Corpus breve, truncatum, callosum, viride, 3-dent.
4. *patula*. A. caul. fruticos. patulo, pubescent: fl. spicis orbiculat. echinato-uncinatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In India Orient. h.
 Caul. erecti, 3-pedal. brachiati. Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, pubescent. Spica terminal. Fl. distantes, bracteati, albid.
5. *alternifolia*. A. caul. herbac. erecto: fl. echinis subglobosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. alm. tab. 200. f. 1. Burm. Zeyl. tab. 4. f. 2.*
In India Orient.
 Caul. flexuosus, ramosus, angulatus, purpurasc. Fol. remota, alterna, petiolat. subflexuosa, lanceol. lævia, consilientia, desinentia in petiolos longos, purpurasc. Capitul. solitar. subsessil. oppositifolia.
6. *corymbosa*. A. tol. subquatern. linearibus: panicula dichotomo-corymbosa. *Syst. veg. ed. 14.*
Parorychia &c. Burm. Zeyl. tab. 65. f. 2.
Amaranthus &c. Boec. Musf. tab. 39.
Elchryso &c. Pluk. alm. tab. 86. f. 6.
In Zeylona.
 Caul. pedal. teres, pubescens, articulatus. Stipul. paleaceæ. Fol. *Linaria*, aut *Molluginis*. Cal. albus, nitidus. Petal. vix conspicua.
7. *dichotoma*. A. caulibus suffrutic. fol. opposit. linearibus, acutis, planis; cyma dichotoma. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
 Caul. diffusi. Fol. margine scabra, stricta, patula. Stipul. oppositæ, membranac. lanceol. fol. latiores, intrafoliaceæ. Cyma 4-part. *Simil. priori.*
8. *prostrata*. A. caulibus prostratis, fruticosis: spicis oblongis; floscul. binatis, utrumque fasciculo setarum uncinato. *Syst. veg. ed. 14.*
Auris &c. Rumph. amb. 6. tab. 11.
Verbena indica Bont. iav. tab. 150.
In India 24.
 Caul. sæpe repent. sesquipedal. divaricati, atro-

purpur. pilōsi. Fol. opposita, subpetiol. obovata, acuta, subpilosa, margine purpurasc. Spicæ solitar. peduncul. virides, apice purpurasc. Fl. minuti. Fruct. reflexi, ovati, obtuli,

polygonoides. A. caul. decumben. 4-gono: fol. ovat-cordati: spicis laxis, lævibus. *Retz. Obs. fasc. 2.*

Digera arvensis. Forsk. Æg.

In Arabia.

Similis Polygono Orient. foliis, & spicis; licet minus compadis. Diversa ab Illecebro sanguineo.

altissima. A. caul. scandente. *Jacq. amer. Sloan. Jam. 2. tab. 91. f. 2.*

In sylvis Domingensibus h.

Caul. 20-ped. Fol. semiped. alterna, petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra. Spicæ axill-terminal. paniculatæ: partiales sub 2-fl. Cor. e viridi albicans.

decumbens. A. caul. decumben: panicul. axillaribus, terminalibus. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. angulati, rubentes. Rami erectiusc. spitham. Fol. remota, alterna, petiolat. ovat-lanceol. integerr. glabra. Panicula: sæpe 2-pollic. fl. conglomerat. albido-membranaceis.

polystachia. A. spicul. axillaribus, confertis, brevibus, albis: caul. decumbente. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Fl. capitati. Spicæ alternæ. Stam. rubro-violac.

papposa. A. fol. alternis, crassiuscul. lineari-cuneatis, obtusis. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Caul. fruticos. spicis axillaribus. *E longinquam speciem habet papporum, ob fl. fasciculos utrimq. lanatos.*

capitata. A. fol. oppositis, petiolat. ovat-oblong. capitul. terminalibus, confertis, inermibus. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

paniculata. A. capitul. lateralibus, paniculatis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Fol. alterna, petiolat. Stipulæ binæ, lunatæ. Peduncul. longiss. Filam. basi lata.

351. **CELO-SIA.** Cal. 3-phyll. cor. 5-petalæ facie. Stam. basi
nectario plicato coniuncta. Caps. horizontaliter
dehiscens.

1. *argentea.* C. fol. lanceol: stipul. subfalcat: pedunc. angu-
latis: spicis scariosis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr.*
del. 1. tab. H. 7.

Amaranthus &c. *Mart. cent. 7. tab. 7. Pluk.*
phyt. tab. 118. f. 1.

Thiera-belurta &c. *Hort. mal. 10. tab. 39.*
In China ☉.

Caul. sesquiped. Fol. basi attenuat-petiol. gla-
bra. Spica oval-oblon. erecta, densa, parte
florifera carnea; fructifera pallescens.

2. *margaritacea.* C. fol. ovat. stipul. falcatis: pedunc. angulat. spic-
is scariosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthus &c. *Mart. cent. 7. tab. 7.*

Belutta &c. *Hort. Mal. 10. tab. 38.*

In Malabar ☉.

Simil. priori, ut forte variet. sed fol. fere ova-
ta. Stam. purpur.

3. *cristata.* C. fol. oblong-ovat. pedunc. teretibus, substriat-
is: spicis oblong. *Syst. veg. ed. 14. Knorr.*
del. 1. tab. H. 5. 6.

In Asia ☉.

Fl. rubri, & flavi. *Var. fol. angustis, & latis.*

4. *paniculata.* C. caul. adfurgente, paniculato: fol. ovat-oblong:
spicis terminalibus, remotis, alternis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Blitum &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 91. f. 2.*

In Jamaica.

Caul. prostrat. ramifus, teres. Fol. alterna. Spi-
cæ terminal. saepe ramosæ. Fl. alterni, di-
stincti.

5. *coccinea.* C. caul. sulcato: fol. ovatis, strictis, inauriculat.
spicis multiplicibus, cristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthus &c. *Bauh. hist. 2. p. 969.*

In India.

Differt a *C. cristata*, fol. triplo crassioribus, fra-
gilibus: fl. penitus purpur. non rubicundis,
carina purpur. staminibus cor. brevioribus,
nec longioribus.

6. *castrensis.* C. fol. lanceol-ovat. acuminatiss. lineatis: stipul.
falcat. spicis cristatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthus &c. *Barr. rar. tab. 1195. Bosc. mus.*
2. tab. 66. Rumph. amb. 5. tab. 84.

In India ☉.

Caul. 2-ped. ex viridi, & purpur. col. mixtus.
Rami lateral. ex singulis alis. Fol. subtus ven-
is rubris striata; infer. sæpe terna. Stipul.
dimidiatæ, tateatæ. Spic. maximæ, palmam
latæ, coccineæ. *Monstrositas C. cristata.*

7. *trigyna*. C. fol. ovat-oblong. racemo laxo; pithil. 3-fido.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 15.
In Senegallia ☉.

Caul. erectus, 3-5-ped. herbac. simplex, suban-
gulat. striatus, strictus. Fol. alterna, petiol.
acuta, lævia. Stipul. 2. amplexantes, horizon-
tal. lunatæ. Racemus longus, terminal. fl. a-
liquot passim congestis, subpedicellat. albis.
Bract. distantes, ovatæ, scariosæ, argenteæ.
Pet. alba, vel carnea.

8. *lanata*. C. fol. lanceol. obtus. tomentosis: spicis confer-
tis; ramibus lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Herba tomentosa. *Forsk. Æg. Vahl.*

In Zeylona.

Facies Halimi. Planta tomentosa, incana. Rami
lignosi. Fol. alterna, sessilibus, alternis, ovatis.

9. *Gnaphalodes*. C. fratic. lanata; fol. oppositis, ovatis, subtus
albis: capitulo globoso, peduncul. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.

In Brasilia.

Simil. ob lanatam superficiem albam, *Celosia*,
& *Illecebris lanatis*: sed differt fol. opposit. &
capitul. solitar. terminal. peduncul. globoso.

10. *nodiflora*. C. fol. cuneiform. acutiuse: spicis lateralibus glo-
bosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 93.*
Amaranthoides &c. *Burm. Zeyl. tab. 5. f. 2.*
Pluk. alm. tab. 133. f. 2.

In Zeylona.

Caul. sesquiped. flexuos. punctul. albis adpersus.
Rami alterni, horizontaliter patentes. Fol. su-
bundul. integerr. glabra, glauco-viridia. Pe-
dunc. axillar. breves. Spicæ solitar. peduncul.
Fl. ex albo-virent. Calyc. loco bract. 1-3-li-
near. *Var. fol. oblong. capitulis peduncul. & fol.*
brevibus, subrotund. capitul. sessilibus.

11. *procumbens*. C. Vid. *Gomphren. interrupt.* Herit.

- polygonoides*. C. caul. hispido: fol. cordat. racemo spicato, laxo;
fl. trigynis. *Retz. Obs. fasc. 2.*

In Tranquebaria.

- Caul. herbac. erectiusc. striatus. Fol. alternæ, petiol. obtusa, scabra. Racemi simpl. glomerul. remotis, alternis, sessilibus, sub 2-fl. lævibus. Cal. scariosus. Caps. urceol. opercul.
- munsonia*. C. caul. prostrato, divaric. tomentoso; fol. filiformibus: spicis cylindricis. *Reiz. Obs. fasc. 2. Pluk. phyt. tab. 334. 4.*
Habitat
Habitus Ach ranthes. Radix lignosa, subramosa. Caul. ramis brachiatis. Fol. nuda. Stipul. si quæ, fol. similes. Spicæ numerosæ, solitar. plerumq. peduncul. albæ, rubore sæpius tinctæ. Flosc. imbricati, extus lanati.
- pyramidalis*. C. fol. infer. lanceol. undulat. superior. linearibus: spicis pyramidalibus. *Burm. Ind. tab. 25. f. 1. In Java.*
 Caul. orgyal.
352. CHENOLEA. Cal. 1-phyll. globosus. Caps. 1-sper. 1-valv.
1. *diffusa*. C. *Thunb. nov. pl. gen. pag. 19.*
353. ILLECEBRUM. Cal. 5-phyll. cartil. gineus. Cor. nulla. Stigm.
1. *brachiatum*. I. caul. erect. herbac. brachiat. fol. oppositis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Amaranthus &c. Pluk. alm. tab. 334. f. 5. In India Orient. ☉.
 Caul. ped. nudus, obsolete angulat. Fol. petiol. lanceol. ovata. Spicæ pl. parvæ, villosæ, albæ, glomeratæ.
2. *sanguinolentum*. I. frutesc. fol. opposit. spic. composit. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*
Verbena &c. Rumph. amb. 7. tab. 27. f. 2. In India 24.
 Caul. sæpe prostrat. ramosiss. Fol. utrinq. rubra, supra obscuriora. Spic. laxæ, alternæ, sessiles, tomentosæ. Cal. virid. pubesc. Anth. luteæ. Pistil. purpur.
3. *canariense*. I. fruticos. fol. elliptic. acutis: stipul. bracteisque ovat. brevioribus: panicul. terminalibus, dichotom. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Tanariffa h.
4. *lanatum*. I. caul. subherbac. erecto: fol. altern. fl. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. app. tab. 85.*
Achyranthes &c. Mill. dict. tab. 11. f. 1.
Chenopodium &c. Burm. Zeyl. tab. 26. f. 1.
Amaranthus &c. Pluk. alm. tab. 75. f. 8.

Scherubala. *Hort. mal.* 10. tab. 29.

Achyranthes villosa. *Forsk. Æg. Vahl.*

In India.

Caul. rigidus, subpilos. basi tantum ramosus.

Fol. petiol. acutiusc. integerr. nuda, subtus pubescent. Pedunc. breviss. spicis 3-4-fessilibus, parvis, inæqualibus, cum foliolo, villosis, albis. Sem. reniform. atrum, nitidum. *Var. caul. erecto; spicis erectis, ramosis, pl. & caul. prostrato, spicis subsolitar. breviss. simplicibus.*

5. *javanicum*. I. caul. herbac. erecto, albo, tomentoso: fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Irefine &c. Burm. Ind. tab. 65. f. 2.

Amaranthus &c. Pluk. alm. tab. 10. f. 1.

In Juva.

Caul. orgyal. Fol. (*Mercurialis tomentosa*) obovat-lanceol. ut caulis albo-tomentosa, supra cinerea. Spicæ terminal. adproximatæ. Cal. hyalinus, viridi carinatus. Cor. alb-d., pilis ex sericeo-splendentibus. Germ. globosum. Stigm. 2. rubra.

6. *Monsonia*. I. caulibus prostrat. fol. subulat. spicis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. alm. tab. 334. f. 2.*

In India Orient. 24.

Caul. ramosi, terminati ramis magis elongatis, spitham. canescentibus. Fol. infer. fere in cespitem conferta; reliqua verticillata. Spicæ opposit. cylindricæ, subincarnatæ, albicant. pulcherrimæ.

7. *verticillatum*. I. fl. verticillat. nudis: caulibus procumbentibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 335.*

Paronychia &c. Vaill. paris. tab. 15. f. 1.

In Europa pascuis udit.

Habitus Herniarie. Fol. *Serpylli*. Cal. albus, nitidus.

8. *suffruticosum*. I. caul. suffrutic. fl. lateralibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania h.

9. *cymosum*. I. spicis cymosis, secundis: caul. diffuso. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 2. f. 5. tab. 29.*

Polygonum &c. Bocc. Sic. tab. 20. f. 3.

Monspeli, in Lusitania ☉.

Planta facie *Sedi*, aut *Polygoni*. Caul. filiform. brachiatus. Fol. subquaterna, linear. crassu-

scula. Calyces colorati, apice fornicati, aristati.

10. *Paronychia*. I. caulibus procumbentibus: fol. lævibus: floribus bract. nitidis obvallatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Paronychia &c. *Clus. hist. 2. p. 183.*

In Hispania, Narbona &c. locis sterilibus 24.

Caul. valde ramosus. Fol. minima, opposita, sessil. ovat-acuta, integerrima.

11. *capitatum*. I. caulibus erectiusc: fol. ciliatis, subtus villosis: fl. bract. nitidis occulrantibus capitula terminalia. *Syst. veg. ed. 14.*

Polygonum &c. *Lab. ic. 420.*

In Gallia narbon. agro Niceensi &c. locis arenosis montosis 24.

Differt a priore caulibus brevioribus, erectis: capitul. ma.

12. *bengalense*. I. caul. erecto, herbac: fol. alternis, oppositisq: lanceol. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ind. Orient. Bengala, Java &c. ☉.

Caul. 1-fesquiped. subpubesc. Fol. subsessil. lato-lanceol. acumin. utrinq: virid. Spicæ parvæ, hirsutæ, albæ, axillar. & terminales, ubi absque fol. glomeratæ.

13. *arabicum*. I. caulibus procumbentibus: fl. sparsis, congestis, bractæas nitidas æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Arabia.

Simillim. I. Paronychiæ; at fl. non in capitula terminal. sed hæc per totum caulem sparsa; bract. non fl. longiores. Fol. *Paronychiæ*, sed angustiora.

14. *Achyrantha*. I. caulibus repentibus, pilosis: fol. ovat, mucronat. opposito minore: capitul. subglobofo, subspinofo. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 7. f. 7.*

In Turcomannia ☉.

Caul. pedal-cubital. Capitul. axillar. paleac. Fl. minutiss. vix conspicui.

15. *polygonoides*. I. caulibus repentibus, hirtis: fol. petiolat. lato-lanceol: capitul. orbiculat. nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthoides &c. *Herm. Parad. tab. 17. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 86. f. 2.*

b. Amaranthoides &c. *Plum. ic. tab. 21. f. 2.*

In America littoribus maris.

Simill. sequenti, sed caul. non fl. villosa.

Caul. dichotom. Fol. opposita, acuta, integerr.
lævia, venosissima. Fl. axill. albi.

16. *ficoides*. I. caulibus repentibus, glabris: fol. petiol. (cuneiformi-obovat.) capitul. orbicular. pubescent.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 60. f. 4. ed. 2. pict. tab. 90.

In marinis littoribus Americae, nunc Hispaniae 24.

Planta radicans. Fol. sessil. acuta. Capitul. plur.
ra, parva, sessil. subrotunda. Cor. acutis oculis pubescent. sunt. Nectar. radiis 5. apice laceris.

17. *sessile*. I. caulibus repentibus, bifarie tomentosis: fol. subsessilibus, lanceolat: capitul. oblong. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthus &c. Burm. Zeyl. tab. 4. f. 2.

Amaranthoides &c. Pluk. alm. tab. 133. f. 1. phyt. tab. 132. f. 6.

Olus squillarum. Rumph. amb. 6. tab. 15. f. 1.

Coluppa. Hort. Mal. 10. tab. 9.

Alternanthera. Forsk. Æg. Vahl.

In India Orient.

Caul. procumb. radicans, purpur. bifariam an-
ceps, linea villosa (ut in *Veron. Chamædry*).
Fol. lævia; tenella ferrata, adulta vix mani-
feste. Spicæ alternæ.

Mire variat magnitudine totius plantæ: caul. ere-
ctiusc: fol. ovat. lanceolat. oblong: elliptic. ses-
silibus, petiolat: capitul. solitar. & compositis.

18. *vermicula-* I. caulibus repentibus, glabris: fol. subtereti-
tum. bus, carnosis: capitul. terminalibus, oblong.
glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

Amaranthoides &c. Herm. par. tab. 15. Pluk. alm. tab. 75. f. 9.

In Brasilia, Curaçao.

Caul. semiped. & ultra, rufescent. Ad singulos
nodos fol. 2-4. *Hyssopi æmula*, opposita. Ca-
pitul. album.

19. *alfræfo-* I. caulibus diffusis: fol. ovat: fl. congestis: bra-
lium. cheis nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Scop: Delic. Inf. fasc. 3. tab. 13.*

In India ☉.

Caul. primo erectus, dein a ramorum, florumq.
pondere depressus, teres, pilosus, a terra
ramosus, 2-3-ped. Rami primi oppositi, pa-

tuli; cæteri alterni. Fol. opposita, brevipe-
tiol: deflexa, ima acutiora, ramea obrusiora;
omnia in senio luteo-rubra. Capitula latera-
lia, parva, sessilia, ovata, obtusa, bracteis
oblongis, villosis, albis; ex quorum sinu fl.
parvi, involucri ex foliol. quinis, cartilagi-
neis, supra medium luteis, apice truncatis,
aut inciso-dentat.

Kapela.

I. *Hacq. pl. alp. Carn. tab. 2. f. 1.*

In Carniola 24.

Caul. repent. 2-pollic. ramosi, verrucosi. Fol.
2-3. linear. alterna, sessil. ovata, lanceol.
integerr. Stipul. cum fol. alternantes, inte-
gerr. glabræ, albissimæ, pellucidæ. Fl. ter-
minal. capitati, ovati, bract. nitidis occultati.
Simil. I. *Paronychiæ*, & *capitato*.

frutescens.

I. caule fruticoso, diffuso, dichotomo: fol. op-
positis, pulverulentis. *Herit. Stirp. nov. fasc.*
4. tab. 37.

In aridis Linnæ 5.

Planta prostrata, tota pulverulenta. Rad. fibro-
sa, ramosa, grisea. Caul. ramis undiq. al-
ternis quasi dichotomus, teres, cinereus. Ra-
mi flexuosi, anulati, nodis purpurascensibus.
Fol. breviter petiolata, ovalia, seu subrotun-
da, obtusa, vix manifeste acuminata, in pe-
tiolum brevissimum desinentia, subnervosa,
subtus cinerea, patentia, demum dependen-
tia, 1. poll. long. 8-lin. lata. Spicæ solita-
riæ, dichotomales, axillaresq. sessiles, dum
fructiferæ pedunculatæ, ovatæ, imbricatæ, 3
lin. longæ. Fl. imbricati, confertissimi, ses-
siles, ex herbaceo-albicantes, 2. lin. longi.

354. GLAUX. Cal. 5-fid. coloratus. Caps. 1-locul. 5-valv. 5-
sperm.

I. *maritima*. G. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 543. Sabb.*
hort. 1. tab. 31.

Alpine &c. Loeßl. pruss. tab. 3.

In Europæ maritimis, salis 24.

Rad. geniculata. Caul. erect. digital. ramis op-
posit. Fol. sessil. lineari-lanceol. obtusiusc. in-
tegerr. subcarnosa, læte virid. glabra: infer.
opposita; floralia alterna. Fl. axill. sessiles,
solitar. ex albido-dilute purpur.

355. THE-
SIUM. Sem. unicum calyci adnascitur, itaut segmenta cal.
ex summo sem. nasci videantur. Segmenta cal.
triangularia, 5-4. intus colorata. Stam. tot,
quot segmenta floris. Tuba simpl. apice glo-
boso.

1. *linophyllum*. T. caul. erecto, paniculato; fol. lineari-lanceol.
T. panicul. foliac. fol. linearibus. *Syst. veg.*
ed. 14. Mont. in Zann. tab. 34. f. 1.
Sesamoides &c. *Murif. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 3.*
Anonymos &c. *Clus. hist. 1. p. 324.*
In Europæ siccis montosis, cretaceis; & in Oriente
24.

Caul. sesquiped. Gemmæ radical. Fol. sparsa; ra-
dical. longe petiolat. elliptica, circumferrata,
trinervia, ad caulem frequentia, *Lini* simil
mucronata. Panicula sparsa. Cal. extus viri-
dis, intus albicans. Sem. oblong. Flos sæpe
5-fid.

2. *alpinum*. T. caul. diffuso: fol. linearibus: fl. axillaribus.
T. racemo foliato: fol. linearibus. *Syst. veg. ed.*
14. Jacq: Austr. 3. tab. 416. Ger. prov. tab.
17. f. 1.

In alpinis Italix, & in Germania &c. collibus ☉.
Habitus prioris. Planta tota glabra. Caul. 3-9-
unc. Gemmæ ex antiquis stipitibus prodeunt.
Fol. sparsa, sessil. integerr. enervia, paucio-
ra, potentiora, rigida. Panicula heteromæl.
Fl. subsessil. sæpe 4-quandoq. 3-fid: Sem.
oval.

3. *Frifca*. T. floribus subspicat. secundis, ciliato-lanat: fol.
subulat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spci.

Caul. palm. simpl. duriusc. Fol. alterna, paten-
tia. Fl. alterni, sessil. adproximati. Bract. pro-
priae 2. lateral. Cal. 5-fid. Sem. ovat. valde
rugosum, magnitudine sem. *Coriandri*, apice
calyce persistente, intus villoso.

4. *spicatum*. T. fl. spicat. lævibus: fol. subulatis, breviss. re-
motissim. *Syst. veg. ed. 14.*

In cap. b. Spci. montibus.

Caul. erect. 3-ped. crassitie pennæ, strictus, sub-
angulat. prolifer. Fol. minutissima, ut fere
nulla. Spic. oblong. crassitie digiti tenuioris.
Fl. distincti bract. 3. acumin. margine mem-
branac.

62 PENTANDRIA MONOGYNIA.

3. *capitatum*. T. fl. capitat. terminalibus, sessilibus: fol. triquetris, lævibus: bract. ovat. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.
 Caul. dur. Rami alterni, remoti, super. sensim longior. Fol. parva, alterna, subulata, mucronata. Sub capitul. ramus excrefcit. Fl. lacinia valde acumin. & interne villola.
6. *fridum*. T. fl. umbellat. fol. linearibus, decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
 Caul. ramosus, angulat. Fol. alterna, remota. Umbellæ peduncul. composita, involuocrata. Cal. intus lævis.
7. *umbellatum*. T. fl. umbellat. fol. oblong. *Syst. veg. ed. 14.*
Centaurium &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 1.
In Virginia, Pensilvania pascuis siccis 24.
 Fol. alterna, ovali-lanceol. integerr. Rami alterni, in apice caul. Umbellæ terminal. racemosa, involuc. 4-phyl. parvo; fl. 3-3.
8. *scabrum*. T. capitul. pedunculat. fol. triquetris, margine, carinaq. scaberrimis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
 Simil. T. *capitato*, sed capitula longo pedunc. nudo: fl. obrutiusc. tantum ad apices interne villosi.
9. *paniculatum*. T. totum paniculatum. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. pedal. sublignos. Fol. minuta, alterna, linear. suprema subulata. Fl. minuti, peduncul. Cal. 3-4-5-fid. spatio remotus. Fruct. facie *Coriandri*.
10. *amplexicaule*. T. fl. subspicat. secund. ciliato-lanatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei montibus altis h.
 Caul. 4-ped. erect. sublignos. sub-angulat. lævis. Fol. alterna, sessili-ampexicaul. cordata, acutiusc. integer. lævia, crassiusc. pollic. Fl. minuti, mixti bract. ma. ovatis.
11. *euphorbioides*. T. pedunc. terminalibus, 3-fl. fol. subovat. carnotis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
Facies Euphorbia. Rami superne dichotomi. Fol. alterna, rotundata-ovata, carnosa, lævia. Fl. pedicellati.
12. *Colpoon*. T. fol. opposit. petiolat. obovat. planis, inte-

PENTANDRIA MONOGYNIA. 63

gerr. corymb. terminal. aphyll. *Syst. veg. ed.*

14. *Lin. Suppl. Berg. Fl. cap. tab. 1. f. 1.*

Ad cap. b. Spei h.

Arb. ramulis compressis; ancipitibusq. Fol. glabra.

13. *spinosum*. T. fol. subulat. mucronat: fl. axillar. solitar.

Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Dignoscitur fol. patentibus, subulat. canaliculat. apice spina terminatis.

14. *triflorum*. T. caul. angulato: fol. lanceol. pedunc. axillar.

trichotom. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

15. *fragile*. T. caul. angulato: fol. ovatis, triquetris, de-

currentibus, carinatis: fl. axillar. sessilibus.

Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Habitus Salsolæ. Fol. brevissima, ut nulla appareant.

16. *squarrosum*. T. caul. tereti: fol. lineari-subulat. recurvato-

reflexis: fl. axillar. sessilibus. *Syst. veg. ed.*

14. *Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. recurvatis valde squarrosâ.

17. *lineatum*. T. caul. tereti, angulat. inferne aphyll: fol. li-

nearibus: ramis rectis, divaricatis: fl. axillar.

pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

356. RAUFOLFIA. Contorta. Bacca succulenta, 2-sperm.

1. *nitida*. R. glaberrima, nitidissima. *Syst. veg. ed. 14.*

Plum. ic. 236. f. 1.

In Amer. merid. h.

Arbut. 12-ped. lacte candido, & glutinoso sca-
tens. Fol. ad nodos quaterna, petiol. lanceol.
utrinq. acuta, integerr. quorum proxima duo
5-pollic. reliquis 2. duplo longiora. Racemi
terminal. Fl. parvi, albi. Fruct. maturi atro-
purpur.

2. *canescens*. R. subpubescens. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer.*

ed. 2. piç. tab. 259. f. 17. quoad. florem.

Plum. ic. tab. 236. f. 2.

Solani &c. Sloan. *Jam. hist. 2. tab. 211. f. 1.*

Arbor &c. *Pluk. phyt. 266. f. 1.*

In Jamaica h.

Frutex 1-8-ped. lactescens. Rami subtoment.
Fol. ut in priore, sed obovat. acuta, subrus
potius toment. quam hirsuta. Pedunc. terminal.
ramosi, quaterni. Fl. parvi, subrubent.
Fruct. obsolete 2-fid. ruber, dein ater. Nucleus 2.

3. *tomentosa*. R. *tomentosa*. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 2. tab. 35. amer. ed. 2. pict. tab. 46.

In *Carthagenæ rupestribus* h.

Frutex 3-ped. lactescens. Fol. ut in prioribus, sed lanceol. acuta, utrimq; tomentosa. Racem. axill. & terminal. Fl. parvi, candidi. Fruct. pisiform. ruber, dein niger.

357. *PÆDERIA*. Contorta. Styl. 2-fid. Bacca vacua, fragilis, 2-sperm.

1. *fœtida*. P. Syst. veg. ed. 14.

Convulvulus fœtid. Rumph. amb. 3. tab. 160.

In *India* 24.

Caul. volubil. lævis. Fol. opposita, petiolat. cordata, oblong. integerr. lævia, fœtida, subtus tomentosa. Panicul. axill. brachiata. Fl. parvi, extus pallide ciner; intus purpur. vel fusci, lanuginosi. Baccæ maturæ flavescent.

Var. vel species distincta ramis striat. fol. oblong. lineari-lanceol. obtusis, glabris; panicula densiore. Retz. Obs. fasc. 1.

358. *CARISSA*. Contorta. Baccæ 2. polysperm.

1. *Carandas*. C. fol. elliptic. obtusis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 7. tab. 25.

Lycium &c. Pluk. alm. 305. f. 4. sed cordata, non 4-fid.

Antura Forsk. Æg. Vahl.

In *India* h.

Arb. ramis dichotom. Fol. opposita, petiol. integerr. lævia. Spinæ axillar. opposit. fol. breviores, patent. Pedunc. subterminal. gemini, 3-fl. Fl. *Jasmini* facie, albi.

2. *spinarum*. C. fol. ovat. acutis. Syst. veg. ed. 14.

Spina spinarum. Rumph. amb. 7. tab. 19. f. 1.

In *Ind. Orient.* h.

Arb. ramis horizontalibus. Spinæ 2. ad singulas ramificat. oppositæ, altera supra, altera infra ramum, pollic. patentiss. robustæ, teretes, apice rubræ, nitidæq; ut in priore. Fol. opposita, subsessil. coriacea, integerr. lævia, pari

puri unico ad singulam dichotomiam; pariq. unico inter singulas dichotomias. Pedunc. terminal. breviss. Fl. 5-6. parvi.

359. CERBERA. Contorta. Drupa 1-spermi.

1. Ahovai. C. fol. ovatis *Syst. veg. ed. 14.*

Ahovai. *Pis. Bras. 49.*

In Brasilia h.

Arbor altitud. Pyri. Fol. 2-3. pollic. longa, 2. lata, *Mato vulg.* similia. Rami amputati humanum stercus olent. Fruct. magnitudine mediocri *Castaneæ*, triquetri, deltoidei superficie inæquali. In summo apice, in quo foramen pervium, 4. ducuntur sulci, in totidem quadrantes fructum dividentes. *Planta venenata.*

2. Manghas. C. fol. lanceolat. nervis transversalibus. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 9. Petiv. gaz. tab. 16. f. 4. Burm. Zeyl. tab. 70. f. 1.*

Arbor lactaria. *Rumph. amb. 2. tab. 81.*

Ocellum. *Hort. Mab. 1. tab. 39.*

In Indiis, ad aquas h.

Arb. lactescens. Fol. alterna, sparsa ad apices ramorum, petiolat. laeviss. glabra, integerr. pedat. Racemi terminali. ramosi, inæqual. Cor. alba. Drupa ovata, magnitud. ovi anserini, viridis, punct. albis, minutiss. adspersa. Sem. 2. veluti 2. *Castaneæ* magnæ. *Planta venenata, vomitoria.*

3. Thevetia. C. fol. linearibus, longissim. confertis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 34. ed. 2. pict. tab. 47.*

Ahovai &c. *Plum. ic. 18. Pis. bras. l. 3. ad finem.*

Nerio &c. *Pluk. alm. tab. 207. f. 3.*

In Cuba; & Martinicæ rarius h.

Planta succo venenata. Arbuse. 12-ped. Fol. sub 4-pollic. integerr. glabra. Pedunc. axill. 1-multiss. Fl. magni, lutei, odoratiss. Drupa oblong. virid.

360. GARDE-Contorta. Bacca infera, 2-4-locul. polysperm. NIA. Cor. 1-petal. Anth. tubo cor. absq. filament. intertæ.

* *Inermes.*

1. radicans. G. inermis; caul. radicante: fol. elliptic: cal. Tom. II. E

angulato; cor, obtus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 20.*

Djuped. Dissert. de Gardenia. Ups. 1780. tab. 1. f. 1. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 11. f. 1.

Kutsinas &c. Kæmph. am. exot. p. 808.

In Japonia 24.

Dissert. a G. florida, quod multoties minor sit; caul. tenui, frutesc. decumbent. radicante; foliisq. angustis, ellipticis.

Caul. subped. glaber. Rami oppositi, erecti, sexuosi. Fol. in apice ramorum confluentia, 1-2-pollic. erecta, subsessil. integerr. parallelonervosa, glabra. Stipul. intratoliac. vaginant. membranac. Fl. terminal. solitar. subsessil. Cor. sæpius plena, coriacea, alba: limbi laciniæ oblong. obtusæ, planæ.

2. *florida, G. inermis*; fol. ovat. acutis: cal. angulato: cor. obtusis, *Syst. veg. ed. 14. Ellif. Ad. angl. Vol. 51. tab. 23.*

Jasminum &c. Ehret. piñ. tab. 15. optime. Burm. Zeyl. tab. 59.

Jasminum capense. Mill. ic. tab. 180. Rumph. Amh. 7. tab. 14. f. 2.

In Ind. Orient. Suratte, Amboina, cap. b. Spei h.

Caul. 3-4-ped. valde frondosus, glaber. Rami oppositi, incurvi. Fol. subsessil. 2-poll. longa, poll. lata opposita, nitida, glabra. Fl. diametro sub 5-digit. odori, albi. Petal. 22. rosacea. Cor. raro simpl. sæpe plena.

3. *Thumbergia, G. inerm.* fol. ovat. utrimq. acutis: cal. terti: cor, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb.*

Diss. de Garden. tab. 2. f. 7. quoad fructum.

Thumbergia capensis. Ad. Stock. 1773. tab. 11. Sonner. Guin. tab. 17. 18.

Ad cap. b. Spei, & in Guinea h.

Caul. arboresc. orgyal. ramosiss. Fol. (brevit. petiol. verticillata 3-4. integerr. glabra, oblique striata, concava, subundulata, inæqualia, poris secretoriis pilosis in axill. nervorum pag: infer. Fl. terminal. solitar. erecti, sessil. longi, albi, speciosi, suaveolent. numero partium variantes 5-10. Cal. coronatus foliol. 4-6, petiolat. Cor. tubo longo, limbo plano, 7-9-10 part. *Simill. priori.*

4. *gummifera*. *G. inerm.* fol. oblong. obtusis; cal. hirtio: cor. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. f. 3. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 3.*

In Zeylona 24.

Refert *G. floridam* magnitudine, & fig. limbi cor. sed cor. tubus longior, magis filiform. pilis tenuioribus testus.

Ex rimis corticis caul: & ex fol. sudat Gummi resina, Gummi Elimi simillima.

5. *Mussaenda*. *G. inerm.*, fol. ovat. acutis; cal. hirtio: cor. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c.*

Mussaenda formosa. Syst. veg. ed. 13. Jacq. amer. pic. tab. 70.

In Amer. australi, & Guiana h.

Frutex 6-ped. ramis teretibus, hirtis. Fol. pollic. breviss. petiolat. opposita, glabra. Stipul. interfoliaceæ. Fl. axill. & terminal. soliar. sessil. Cor. alba, tubo elongato, filiformi, basi sursum curvo, dein recto; limbo 5-part. laciniis carnosis.

6. *Rothmannia*. *G. inerm.*, fol. oblong. acutis: cal. glabro: cor. subcampanulat. acuta. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c.*

Rothmannia capensis. Ad. Stock. 1776. tab. 2.

Ad cap. b. Spei h.

Lignum durissimum. Fl. albi, suaveolent. præcipue nocte, terminales, solitar. sessiles.

** *Spinosa*.

7. *spinosa*. *G. spinosa*; fl. sessilibus, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. f. 4. Pluk. phyt. tab. 304. f. 4. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 4.*

In Madrag. h.

Frutex spinis horridus, ramis rigidiss. glabris. Fol. parva, opposita, glaberr. ovata, obtusa, inæqual. pollicar. Ramuli axill. breviss. 1-fl. Spinæ pollic. horizontal. decussatæ, rectæ, rigidissimæ. Fl. in apice ramorum solitar. Cor. vix calyce mai: extus hirsuta, 5-part. alba.

8. *micranthus*. *G. spinosa*; fl. sessilibus, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 1. f. 2. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 11. f. 2.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, ramosus. Rami villosi, parum ramulosi, spinosi. Spinæ suprafoliac. oppositæ,

F ij

acutæ, semiunguicul. Fol. e gemmis intra spinas opposita, petiolat. ovata, acuta, integerr. glabra, nervosa, patentia, unguiculat. Fl. axill. 2-3, magnitudine f.m. *Oryzæ*. Cor. subcampanul. 5-part. laciniis ovatis, acutis, reflexis.

9. *scandens*. G. spinosa, scandens; fl. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c. tab. 2. t. 5. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 12. f. 6.*

Ad cap. 6. Spei h.

Ad hoc genus spectat Tocozena longist. Aublet. Guian. tab. 50.

- jasminoides*. G. Retz. *Obs. fasc. 2. In China.*

Frutex opposita, alterneque ramosiss. spinis supraxillaribus, brevibus. Fol. opposita, parva, ovata, integerr. Fl. terminal. subfoliar. peduncul. omnino *Jasmini* odorat. sed flamm. & pist. *Gardeniæ*.

- dumetorum*. G. Retz. *Obs. fasc. 2. In Ind. Orient.*

Frutex ramis teretibus: spinis pollic. oppositis, simplicibus, subaxillar. Fol. *Buxi* paulo minus, ovata, integerr. Fl. parvi, solitar. breviter peduncul. Cor. limbo 5-part. lacin. rotundat. utrimq. hirsuta. Bacca exsucca, umbilic. 3-locul. 1-valv.

- uliginosa*. G. Retz. *Obs. fasc. 2. In Inatæ paludosis.*

Frutex ramis sub 4-gon. fuscis; ramulis brevibus, oppositis, apice foliosis, & bipinosis. Fol. elliptica, obtusa, glabra. Cor. tubo brevi, intus hirsuto; laciniis rotundatis, cavis.

361. AILAMANDA. Contorta. Caps. lentiform. erecta, echinata, 1-locul. 2-valv. polysper.

1. *cathartica*. A. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Plum. ic. 29.

Orelia grandiflora. Aubl. Guian. tab. 106. f. bona. In Guiana, Surinami, iuxta fluvios h.

Planta frutesc. scandens, lætescens. Caul. pl. sarmentosi, ramosi, nodosi. Fol. verticill. subquaterna, subsessil. ovat-oblong. obtusa cum acumine, integerr. nitida. Fl. corymb. Flos magnus, luteus, lunatus. Cor. infundibul. limb.

patent. 5-fid. lacin. amplis, subrotund. acut.
Capf. ovata.

Ad Colicam pifionum infufum fol.

362. VINCA. Contorta. Folliculi 2-erecti. Sem. nuda, remota.
Cor. hypocrateritor. 5-fida, lacin. extrorfum
latioribus.

1. *minor.* V. caulibus procumbentibus: fol. lanceol-ovat. fl.
pedunculat. *Syft. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 75.*
Black. tab. 59. Dod. Pempt. 405.

Clematis 1. Maith.

Ad Europæ fepes ubique vulgatiffima 24.

Fol. oppofita, integerr. pulchre virent, nitida,
glabra; min. obtufiora, margine lævia. Pe-
dunc. curvati. Cal. breves. *Var. fl. albis, cœ-
rul. rubentibus; & pleno, rubente; necnon fol.
variegat.*

2. *maior.* V. caulibus erectis: fol. ovatis: fl. pedunculat.
Syft. veg. ed. 14.

Pervinca &c. Garid. Aix. tab. 81.

In Europa 24.

Var. prioris. Caul. cubital. Fol. petiolat. ovato-
cordata, acumin. margine tenui tomento ci-
liata, glabra, tenera, læte virent. Cor. ma-
gna, amæne cœrul.

3. *lutea.* V. caul. volub. fol. oblong. *Syft. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Catesb. Car. 2. tab. 53.

In Carolina h.

Caul. 10--15--ped. Fol. oppofita, petiol. Salici-
form. rudia, dilute virid. Fl. terminal. race-
mofi, 6-8. lutei.

4. *rofea.* V. caul. frutefc. erecto: fol. ovato-oblong. petiolis
bafi bidentat. fl. geminis. *Syft. veg. ed. 14.*
Mill. dict. tab. 186.

In Madagafcar, Java h.

Caul. rigidulus, teres, lævis. Fol. oppofita,
coriacea, rachi alba. Fl. axill. fefsil. Cal. in
feras 5. fubulatas. Cor. rofea, pulcherrima,
plana, umbil. arro-purpur.

5. *pufilla.* V. caul. herbac. fl. geminis pedunculat. *Syft. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl. Conum. Götting. 1776. tab.
2. f. 1.

In Tranquebariæ hortis ☉.

Simil. priori, ut vix fp. d'verfa. Caul. fpatham.
4-gon. Fol. ad latera, & fæpe ad apicem.
Cor. magnitud. & col. *Lithospermi officin.*

363. NERI- Contorta. Follic. 2. erecti. Sem. plumosa. Cal.
UM. parvus, 5-fidus. Cor. tubus terminatus corona lacera, villosa; laciniis magnis, profundis.
1. *Oleander*. N. fol. ternis, lineari-lanceol. cor. coronatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 53. Burm. Zeyl. tab. 77. Lob. ic. 364.*
Areli. Hort. mal. 9. tab. 1. 2.
Nerio. Mutk.
- b. *N. latifolium*. *Herm. Lugd. tab. 449.*
In Ind. Orient. locis subhumidis; Italiae &c. collibus h.
Arbuse. ramis, & furcul. dichotom. Fol. petiol. integerr. nervosa, rigida. Fl. terminal. racemosi. Cor. alba, rosea, quandoque duplex.
2. *zeylanicum*. N. fol. oppositis, lanceol. ramis rectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Burm. Zeyl. tab. 12. f. 2.
In India h.
Arbuse. ramis longis, purpurascentibus. Fol. subpetiol. acumin. lævia.
3. *divaricatum*. N. ramis divaricat. fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed. 14.*
In India h.
Arbuse. ramis crassis, rugosis. Fol. petiolat. utrimq. acumin. integerr. glabra. Fl. candidi.
4. *antidyfentericum*. N. fol. petiolat. ovatis, acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 77.*
Codaga pala. Hort. mal. 1. tab. 47.
In Malabar, Zeylona, Russia h.
Arbuse. fol. suboppositis, latis. Fl. terminal. Petal. alba, odora. Follic. longiss. angusti.
- obesum*. N. fol. sparsis, oblongis: ramis loriformibus. *Forsk. Suppl. Æg.*
In Arabia h.
Caudex mollis, bulbum referens supra terram, volumine caput. humani.
364. ECHI- Contorta. Follic. 2. longi, recti. Sem. papposa.
TES. Cor. infundibulif. fauce nuda.
1. *biflora*. E. pedunc. (plerumq.) biflor. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 21. ed. 2. piñ. tab. 28.*
Apocynum &c. Plum. amer. tab. 96.
In America h.
Frutex etiam 20-pedal. Caul. partim volub. partim erecti, lacte niveo scatentes. Fol. 3-pol-

lic. oblong. basi attenuata, obtusa cum exiguo acumine. Fl. speciosi, candidi, fauce lutea. Cor. limbo truncato.

2. *3-angulata*. E. fol. ovat. acutis? pedunc. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. piñ. tab. 32.*

In Amer. meridion. h.

Planta non lactescens. Caul. fruticos. volub. scabriusc. Fol. 3-pollic. Racemi simpl. Fl. sub 16. magni, virentes, limbo flaviusc. margine tubi 5-gon. albo. Cor. anulo elevato circa umbilicum.

3. *suberecta*. E. fol. subovat. obtusis, mucronatis: pedunc. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 26. ed. 2. piñ. tab. 33.*

Apocynum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 130. f. 2. In Jamaica h.

Habitu a congeneribus differt. Planta in fruticetis 10-ped. in pratis 3-vix 1-ped. lacte candido scatens. Fol. quandoque subtus scabra. Fl. pauci, magni, speciosi, flavi, tubo hirsuto. Follicul. fusci.

4. *adglutinata*. E. fol. ovat. emarginat. cum acum. pedunc. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 23. ed. piñ. tab. 30. Berm. Ind. tab. 27. f. 1.*

In Domingo fruticetis montosis h.

Caul. volub. Fol. 4-pollic. Pedunc. sæpe difform. quandoq. 2-fidi. Fl. parvi, candidi. Cor. laciniis acuminat.

5. *torulosa*. E. fol. lanceol. acuminat: pedunc. subracemosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 27. ed. piñ. tab. 34.*

Nerium &c. Brown. Jam. tab. 16. f. 2.

In Jamaica h.

Tota planta glutine lacteo scatet. Caul. frutic. volub. teretes. Fol. 2-pollic. Pedunc. sub 6-fl. Fl. parvi, flavi. Follic. filiform. longiss. torulosi.

6. *umbellata*. E. pedunc. umbellat. caul. volub. fol. ovat. obtusis, mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 22. ed. piñ. tab. 29.*

Apocynum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 131. f. 2.

In Jamaica h.

Caul. fruticosi, volubil. 15-ped. sacco glutinoso scatentes. Fol. 3-pollic. subcord. Stipul. non-

- nullæ. Fl. 4 7. magni, pulchri, tubo extus virid. limbo candido.
7. *trifida*. E. pedunc. trifid. multifi: fol. ovat-oblong: acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 24. ed. piñ. tab. 31.*
In America h.
Tota planta lactescit. Caul. fruticos. volub. 12-ped. Fol. 3-pollic. Pedunc. breves, pedicell. difformibus. Fl. magni, pulchri. Cor. tubo sordide purpur. limbo sordide virenti.
8. *repens*. E. pedunc. multifi. divisi: fol. lanceol-oblong. *Syst. veg. ed. 14 Jacq. amer. tab. 28. ed. piñ. tab. 35.*
In Domingo, locis rupestribus h.
 Planta elegans, fruticosa. Caul. sarmentosi, iuniores subereciti, ad folia in nodos discoideos incrassati. Pedunc. sæpè 2-âd. Fl. elegantes, rubri.
9. *corymbosa*. E. racemis corymbos. fol. lanceol-ovat. flaminibus eminentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 30. ed. piñ. tab. 37.*
In Sylvaticis Domingo h.
 Caul. fruticos. volub. 10-ped. lacte candido scattens. Fol. multa, varia, ovat. oval. obovat. acuta, 2-pollic. Fl. multi, parvi, rubri.
10. *spicata*. E. spicis axillar. brevibus: fol. subovat. flaminibus eminentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 29. ed. piñ. tab. 36.*
In sylvis Carthagenæ h.
 Caul. volub. sarmentos. etiam 60-ped. Fol. semiped. disticha, oblong. glabriusc. venosi. Spicæ oppositæ, densæ. Fl. multi, parvi, candidi, subfæfil. vix odori.
11. *caudata*. E. cor. infundibulifor. apicibus eminentibus. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 26.*
In India h.
 Arbor caul. volub. striato. Fol. opposita, petiol. lanceol-ellipt. integerr. nulli. Fl. axill. peduncul. erecti, magnitudine *Nerii*.
12. *scholaris*. E. fol. subverticillat. oblong: umbellis compositis: follicul. filiformibus, longiss. *Syst. veg. ed. 14.*
Lignum scholare. Rumph. umb. 2. tab. 82.
In India h.
 Arb. ramis ad genicula tantum foliatis. Fol. ad

genicula 5-7. ovali-lanceol. coriacea, transverse striata, integerr. petiolat. Pedunc. aliquot interfolijcei. Fl. parvi. Follicul. bini, sesquiped.

13. *anularis*. E. caul. volub. cor. hypocraterifor: tubo anulo elevato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Surinamo.

Fol. pedic. opposita, petiol. Racem. axill. peduncul. 2-fidi.

14. *siphilitica*. E. fol. subpetiol. ovatis, g'aberrim. costatis: panicul. dichotom. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Surinamo h.

Fol. magna, dodrant. & ultra, opposita, acuta. Pedunc. axill. Cor. magna, alba, siml. reliquis speciebus; limbo magno, plano.

Decodum herbæ in siphilitude usitatissimum Surinamensis.

15. *succulenta*. E. aculeis 2. extrafoliac: fol. linearibus, subtus tomentosi: cor. infundibulifor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. 6. Spei h.

Filamenta barbata.

16. *bispinosa*. E. aculeis 2. extrafoliac: fol. lanceol. gl'bris: cor. hypocraterifor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. 6. Spei h.

- nummularia*. E. fol. cordat. acuminat: pedunc. 2-fl. *Burm. Ind. tab. 28. f. 1.*

In India h.

365. PLUME-Contorta. Folliculi 2. reflexi. Sem. membranæ propriæ inserta.

1. *rubra*. P. fol. ovat oblong: periolis biglandulosis. *Syst. veg. ed. 14. Ehret. pict. tab. 10. Trew. Ehret. tab. 40. Catesb. Carol. 2. tab. 92.*

Nerium &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 185. f. 1. & tab. 186. f. 1.

Jasminum &c. Merian. Surin. tab. 8.

Clematis &c. Pluk. alm. tab. 207. f. 2.

In Jamaica, Surinamo h.

Arbor. procera, coma ampla, sed rara. Fl. multi, speciosi, rubri, suaveolent. *Lact. niveo scati.*

2. *alba*. P. fol. lanceolat. revolutis: peduncul. superne

tuberosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 174. f. 12. ed. piñ. tab. 38. Plum. ic. 231.*

Apocynum &c. Comm. hort. 2. tab. 24.

In Jamaica.

Arb. sub 15-ped. parum ramosa, lacte candido scatens. Fol. longe petiol. decidua. Pedunc. vertical. longissi. superne 3-fid. Fl. magni, candidi, fauce flavesc. odore suavi. Folliculi acinacifor.

3. *obtusa.* P. fol. ovali-lanceol. petiolat. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. Cor. 2. tab. 93. Plum. ic. 232.*

In Amer. calidiore h.

Caudex cicatrizatus. Fol. in orbem posita, subsessil. integerr. Pedunc. ramosi. Fl. 2-3. pulchri, nivei.

4. *pudica.* P. fl. limbo clausis. *Syst. veg. ed. 14.*

In America h?

Arbuse. 5-ped. lactescens. Fol. frondosa, oblong. plana, venosa. Fl. multi. Cor. flavesc. odora.

- inodora.* P. arborescens, caudice vix diviso. *Jacq. amer. In Carthagenæ sylvaticis h.*

Arbuse. 8-ped. erecta, in paucos, brevesq. ramos divisa. Fol. P. rubræ. Fl. albi, inodori, congeneribus duplo ma.

366. CAME- Contorta. Follic 2. horizontal. Sem. membranæ propriæ inserta.

RARIA.

1. *latifolia.* C. fol. ovat. utrimq. acut. transverse striatis. *Syst. veg. ed. 04. Jacq. amer. tab. 181. f. 86. ed. piñ. tab. 39. Plum. ic. 71. f. 1.*

In Amer. calidiore h.

Arb. procera, elegans, ramosa, comosa, lacteo niveo scatens, ramul. plerumq. dichotomis. Fol. multa, opposita, petiol. integerr. nitidiss. rigidiusc. Pedunc. axill. aut in ramorum dichotomiis, longi, 1-multifl. Petal. candida. Follic. fufci.

2. *angustifolia.* C. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 72. f. 2.*

In Amer. calidiore h.

Caul. frutesc. ramosus. Fol. opposita, integerr. nervo medio decurrente. Fl. & fructus ut in priore, sed min. ut tota planta.

Tumaguarina. C. fol. ovat-oblong. acuminat: fl. amplis, luteis, odoratis. *Aubl. Guian. tab. 102.*

In Caribæis.

- Frutex 4-5-ped. superne ramosus. Fol. opposita, breviter petiol. longe acumin. integerr. glabra. Fl. terminal. & intra bifurcationem ramulorum, racemosi.

guianensis. C. fol. ovat-acumin. fl. axillar. parvis, odoratis. *Aubl. Guian.*

In Guiana h.

Differt a priore fol. & fl. min. axillar.

zeylanica. C. fol. ovat-lanceolat. transverse venosis. *Retz. Obs. fasc. 4.*

Apocyno-Nerium. Lin. Fl. Zeyl. 404.

In Zeylona h.

Arb. Fol. opposita, petiol. acuminata, integerr. Pedunc. axillar. brevis.

367. TABER-Contorta. Follic. 2. horizont. Sem. pulpæ immemontana. mersa.

1. *citrifolia*. T. fol. opposit. ovat-lanceol. fl. lateralibus, glomerato-umbellatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 175. f. 13. ed. pic. tab. 40. Plum. ic. 248. f. 2.*

In America h.

Arb. 8-ped. erecta, ramosa, tota lactesc. Fol. integerr. nitidiss. per venas contrahentes undulata, virent. quidem, sed ita ut lac, quibus scatent, transperere videantur. Racem. floriferi, axill. oppositi. Cor. candida, suaveolens. Follic. acuti, semper virid. Pulpa mollis, aurantiaca.

2. *laurifolia*. T. fol. opposit. ovalibus, obtusiusc. *Syst. veg. ed. 14.*

Nerium &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 186. f. 2.

In Jamaica, ad ripas fluviorum h.

Arb. 5-ped. erecta, ramosa, lactescens, habitu prioris. Cor. lutea, odora. Follic. virides.

3. *grandiflora*. T. caul. dichotomo; fol. oppositis; calycibus inæqualibus, latissim. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 31. ed. pic. tab. 41.*

In Cortogena h.

Arb. 8-ped. erecta, lactescens. Fol. petiol. ovalia, acuta, integerr. nitida. Pedunc. sub 3-8. Fl. congenerum maximi, inodori. Calyc.

foliol. f.ariofa, alba, exter. 2. cordata; reliqua angufta. Cor. limbo ampliff. tubo con-
torto.

4. *cymofa*. T. fol. oppofit. fl. cymofis. *Syft. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 14. ed. pic. tab. 259. f. 10.*

Habitat Carthagenæ h.

Arbufe. 12-15-ped. Fol. ovat-linc. acuta, integerr: fubundulata, femiped. Cymæ axill. amplæ, denfæ, convexæ. Fl. fordide albefcent. aut rufefcent. Follic. magni, rubefcent. pulpa aurantiaca.

5. *amygdalifolia*. T. flaminibus extra tubum cor. eminentibus. *Syft. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 15. ed. pic. tab. 259. f. 11.*

In Guiana h.

Arbufe. 6-ped. ranofo, lactefcens. Fol. oppofita, ovali-lanceol. acuta, plana, nitidiff. Pedunc. pauciff. Cor. candida, odora. Follic. acumin. virid. nitentes, pulpa aurantiaca.

6. *alternifolia*. T. fol. alternis: caul. arborefcence. *Syft. veg. ed. 14.*

Curutu-pala. Hort. mal. 1. tab. 43.

In Malabar h.

Frutex 1-2-orgyal. Fol. breviter petiol. ovalia, folida, fupra fature, fubtus dilute virent. Fl. terminal. grandes, albi. Fruct. aggregati, oblongo-rotundi, cuspidati, inflexi, flavo-aurei.

7. *Amfonia*. T. caulibus fubherbaceis: fol. alternis. *Syft. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Pluk. phyt. tab. 115. f. 3.

In Virginia 24.

Adfinis Camerariæ, & Tabernemontanæ. Fol. fubfiffil. lato-lanceol. lævia. Rami alterni. Racem. terminal. compofitus. Petal. pallide cœrul. Follic. 2. longi, acumin. teretes, reflexi. Stigm. capit. fupra orbiculum membranac. Sem. cylindrica, fœabra.

8. *elliptica*. T. herbacea: fol. fubternis, lanceol. *Syft. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia 24.

Adfinis priori: differt fol. anguftioribus, elliptic. caul. tereti, nec angulato.

Caul. ped. & ultra, fimpl. fenfim attenuatus, teres, glaber. Fol. inferior. fparfa, bina-ter-

na-quaterna, subpetiol. elliptica, integerr. nervosa, glabra, subtus parum pallida. Petiol. breviss. sensim dilatati in folium, subverticillato-quaterni. Fl. terminal. racemosi, bracteati. Cor. vix unguicul. corul.

- echinata*. T. fol. opposit. ovat-oblong. acuminati. Involucri echinato. *Aubl. Guian. tab. 163.*
In Guiana h.
 Caul. pl. lignosi, 5-6-ped. ramosi, nodosi. Fol. subsessil. undulata, supra glabra, virid. subtus tomentosa, alba. Fl. terminal. & intra bifurcationem ramulor. corymbosi. Corymb. breviter peduncul. ad basin membranula involuti. Cor. flavesce. odora.
368. CERO- Contorta. Folliculi 2. erecti. Sem. plumosa. Cor.
 PEGIA. limbus connivens.
1. *candelabrum*. C. umbell. pendulis; fl. erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Niots &c. Hort. mal. 9. tab. 16.
In Malabar 24.
 Caul. volub. genicul. rubentibus. Fol. opposita, petiol. ovat-acut. crassa, solida, glabra, subtus costa media. Fl. pl. aggregati, instar candelabri pentilis, collo oblong. rubro-purpureo-fusco, & nitente; ventre inflato, albicante. Follic. oblong. angusti.
2. *biflora*. C. pedunc. (plerumq.) bifloris. *Syst. veg. ed. 14.*
In Zeylona 24.
 Caul. volub. Fol. opposita, ovata, integerr. Pedunc. axill. Fl. recta extensi.
3. *sagittata*. C. fol. sagittat. umbell. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Cynanchum &c. Burm. Afric. tab. 15.?
In cap. b. Spei arenosis 24.
 Caul. volub. filifor. tomentosus. Fol. opposita, breviss. petiolat. sagittata, seu cordato-linear. margine revoluta, utrimq. tomentosa, subtus pallidiora. Umbell. axill. multifi. Cal. 5-part. linear. tomentos. acutus. Cor. subcylind. coccinea, lacin. breviss. mucronat. conniventibus.
4. *tenuifolia*. C. fol. lineari-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Pluk. mant. tab. 335. f. 5.
Naru nindi. Hort. Mal. 10. tab. 34.
Ad cap. b. Spei.
 Planta repens. Caul. tenues, primum virid. dein

rubri, seu spadiceo-rubri. Fol. opposita, breviter petiol. in cuspidem longum, angustum terminata, viridi-fusca. Fl. 2-3-4. extus viridi-flavescent. intus ex rufo-rubent. dein magis rufi, orificio rubro, subcœrul.

DIGYNIA.

269. **PERGULARIA.** **C**ontorta. Nectarium ambiens genitalia cuspidibus 5. sagittat. Cor. hypocraterif.
1. *glabra*. P. fol. ovatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Flos &c. *Amb. 5. tab. 29. f. 2.*
In India.
Frutex Syringam albam referens. Caul. volub. lævis. Fol. opposita, petiol. acuta, integerr. Pedunc. axill. alterni, subdivisi. Cor. alba.
2. *tomentosa*. P. fol. cordat. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Asclepias cordata. Burm. Ind. tab. 27. f. 2. Forsk.
Æg. Vahl.
In Arabia b.
Caul. volub. lignosus, teres, tomentos. Fol. opposita, petiol. acuta, integerr. Umbell. axill. alternæ, peduncul. Cor. fig. *Kalmia*, purpur.
3. *japonica*. P. fol. cordat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb.*
Japon.
In Japonia.
Caul. volub. simpl. teres, glaber. Fol. pollic. opposita, petiol. acuta, integerr. patula, nervosa. Fl. axill. umbellati, erecti, peduncul. Umbel. simplex.
270. **MELODINUS.** Contorta. Faux cor. coronata. Nectar. in medio tubi stellatum. Bacca 2-locul. polysperm.
1. *scandens*. M. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*
In nova Caledonia.
Adfinitas magna cum Rauwolfiis. Frutex glaberrim. Caul. scandens. Fol. opposita, oblong-ovat. integerr. glaberr. venosa.
371. **PERIPLOCA.** Contorta. Nectar. ambiens genital. filam. 5. exferens.
1. *græca*. P. fl. terminalibus, interne hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. tab. 1. f. 2. Duham. arb. tab. 11.*
Apocynum 2. Clus. hist. 1. pag. 125.
In Syria, Sibiria 24.

Caul. longus, sarmentosus, geniculat. fuscus, Fol. opposita, lanceol-ovat. venosa. Fl. in extremis ramulis lateralibus, sub-5. Cor. lacin. expansis, intus luteo-virescent. supra obsolete purpur. cum macula viridi.

2. *Sesamone*. P. fol. lanceol-elliptic. fl. paniculat. interne hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Alp. Ægyp. tab. 134.*

In Ægypto h.

Differt a priore primo intuitu fl. copiosis, minutis.

Caul. volub. truticof. lævis. Fol. opposita, petiol. lævia, subtus pallidiora, transverse venosa, Panicul. axill. alternæ, dichotomæ, fol. breviores. Fl. minuti, albi.

3. *indica*. P. spicis imbricat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 83. f. 1.*

Apocyni &c. Pluk. mant. tab. 359. f. 2.

In Zeylona h.

Caul. volub. teres, tuberculat. cinereus. Fol. opposita, breviter petiol. ovata, acuta, glabra, integerr. venosa, supra læte virid. subrus pallida. Spicæ axill. simplic.

4. *africana*. P. caul. hirsuto. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Comm. rar. tab. 18. Pluk. alm. tab. 137. f. 4. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 62.

- b. *Cynanchum* &c. *Burm. afric. tab. 14. f. 2.*

In Africa h.

Caulic. pl. humifusi. Fol. opposita, breviter petiol. subovata cum acumine. Pedunc. axill. 7-8-fl. Fl. multifidi, & inversi. Cor. rubens.

5. *esculenta*. P. glabra; fol. lineari-subulat. racem. elongatis, simplicibus; fl. interne nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lin. Suppl.

In Zeylona, & Malaburia.

Caul. volub. Fol. opposita, longa, basi rotundata. Racemi paucifl. Fl. pedicellati. Cor. lutea, striis ferrugin. a centro excurrentibus. Genital. lutea. Follic. inflati.

Indigenis esculenta.

- emetica*. P. caul. frutic. diffuso: fol. linear-lanceol. *Retz. Obs. fasc. 2.*

In Tranquebaria h.

Fol. opposita, breviter petiol. integerr. glabra, Pedunc. breves, multifl. squamoli bracteolis. Fl. parvi, glabri. *Radix adhibetur loco Ipecacuanæ.*

- tunicata*. P. fol. cordat. fl. umbellatis. *Retz. Obs. fæsc. 2. In Tranquebaria*.
Caul. volub. lævis. Fol. opposita, petiol. obcordat-acumin. utrumq. glabra. Singul. petiol. cordatæ. Umbel. axill. pauciss. 2-5.
- sylvestris*. P. fol. ovat. fl. umbellat. *Retz. Obs. fæsc. 2.*
Caul. fruticos. tomentos. Fol. integerr. utrumque hirsutula. Umbel. axill. oppositæ. Fl. parvi, intus læves. Cal. tomentos. iacin. ovatis, obtusis.
- 372. CYNANCHUM.** Contorta. Nectar. cylindric. 5-dentato differt ab ACLEPIADE.
- 1. viminalc.** C. caul. volub. perenni, aphyll. *Syst. veg. ed. 14. Felsel Tauil. Alp. Æg. tab. 190. In Africa maritima h.*
Caul. 3-6-ped. crassitie pennæ anserinæ, viridis, ramis raris, longissim. Cal. minimus, 5-part. Cor. rotata *Aclepiadis*, alba, odora. Nectar. 5. petaloid. erecta, intus grano luteo, perforato cum unguiculo, in orbem posita. Styl. cylindr. capitatus. Anth. minutæ, fuscæ, insidentes capitulo.
- 2. acutum.** C. caul. volub. herbac. fol. cordat-oblon. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum 3. latitol. *Clus. hist. 1. pag. 125. In Sicilia, Hispania &c. 24.*
Sarmenta longa, geniculata. Fol. opposita, petiolat. subalbida. Fl. axill. subumbell. parvi, albi.
- 3. planiflorum.** C. caul. volub. fol. cordat. glabris, subtus tomentos. pedunc. subracemos. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 55. ed. 2. pict. tab. 81. In Carthageria 24.*
Fol. sub-4-pollic. opposita, petiol. ad petiolor. ortum ciliis ferrugineis. Pedunc. lateral. vix pollicar. sub 5-fl. Fl. plani. Cal. ex albo-virens. Cor. venosa, æruginea.
- 4. racemosum.** C. caul. volub. fol. cordat. acut. glabris: racemis simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 54. ed. pict. tab. 80. In Carthageria 24.*
Fol. 4-pollic. opposita, petiolat. subundul. supra læte virent. subtus æruginea. Fl. parvi, albi, inodori.
- 5. maritimum.** C. caul. volub. fol. cordat. hirsut. subtus tomentos.

tos: pedunc. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 36. ed. piñ. tab. 82.*

In Terra Bomba h.

Planta hirsuta. Fol. opposita, petiolat. acumin. Pedunc. pl. Cor. atro-purpur.

6. *suberosum*. C. caul. volub. inferne suberoso, fisso: fol. cordat. acumin. *Syst. veg. ed. 14.*

Periploca &c. Dill. elth. tab. 229. f. 296.

In Amer. calidiore.

Caul. sub. 3-ped. vix hirsutus. Fol. opposita, lobis ad basin fere incumbens, subtus pallidiora, nitida, & fere argentea; si terantur, foetida.

7. *hirtum*. C. caul. volub. fruticoso, inferne suberoso, fisso: fol. ovat-cordat. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 3. f. 61.

In America h.

Tota planta teterrime olet. Caul. villosus. Fol. acumin. pendula, integerr. Fl. ampli, pulli.

8. *monspeliacum*. C. caul. volub. herbac: fol. reniformi-cordat. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum 4. &c. Clus. hist. 1. p. 126.

In Hispania, Narbonæ maritimis &c. 24.

Radix, & caul. lactiferi. Fol. opposita, longe petiol. integerr. crassa, subalbida. Fl. axill. fasciculat. parvi, albi.

9. *extensum*. C. caul. volub. herbac. fol. reniformi-cordatis, acutis: petal. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. ic. rarior.*

Habitat . . .

Caul. 12-ped. valde ramosus, teres, villosus, asper, glaucus, adultior purpurasc. sicuti rami. Fol. opposita, longe petiolat. integerr. utrimq. fere glabra. Peduncul. inter petiolos oppositos, semi-etiam pedat. teretes, patentes, aphylli, scabri, villosi. Pedicelli fuscuncial. Fl. penduli, odori, cum virore pallentes. Tota planta lacte niveo scater.

10. *undulatum*. C. caul. volub: fol. lanceol-ovatis, glabris: umbell. globosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 38. ed. piñ. tab. 84.*

In Carthagera h.

Planta glabra. Fol. 4-pollic. opposita, petiol. utrimque acumin. undulata, pinguia. Umbella parva, densa. Cor. intus fordide purpur.

Tom. II.

F

11. *capense*. C. caul. volub. undique conformi: fol. subcordato-ovat. pedunc. multifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Caul. altus, minime suberosus. Fol. opposita, petiol. lævia; iuniora ovata, adultiora emarginata cum mucrone. Pedunc. axill. simpl. denticulati. Cal. breviss.

12. *obtusifolium*. C. caul. volub. herbac: fol. oblongis, apice rotundatis cum acumine: umbell. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

13. *tenellum*. C. caul. subvolub. herbac: fol. ovat-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Granada.

Caul. filiform. ramis alternis. Fol. opposita, petiol. mucronata, lævia, magnitudine *Alfines*. Umbel. irregul. sessil. fol. breviores. Fl. magnitudine *Gulii*. Follic. longitudine digiti, subulati.

14. *erectum*. C. caul. erecto, divaricato: fol. cordatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 38. Apocynum 1. &c. Clus. hist. 1. p. 124.*

In Syria &c.

Frutex 5-6 ped. lacte niveo scatens, ramosus, glaber. Fol. opposita, breviter petiol: acuta, integerr. glauca. Cymæ axill. compositæ. Cor. alba, odora.

15. *filiforme*. C. caul. erecto, simpliciss. fol. linearibus: fl. axillar. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Diffinendum a C. filiformi Jacq. cuius pl. sp. in Hist. Stirp. amer.

- cordifolium*. C. caul. volub. hirtio: fol. cordat. acutis, utrimque glabris: fl. cymotis. *Reiz. Obs. fasc. 2.*

Caul. ramosus. Fol. opposita, longe petiol. subrotundo-cordata, raro subangul. Cyma longe petiol.

- reticulatum*. C. caul. volub. inferne suberoso, rimoso: fol. ovat. acutis. *Reiz. Obs. fasc. 2.*

Caul. lignosus, corice albo, ramis volubilibus. Fol. longe distita, petiol. glabra, apice lanceol. Pedunc. axill. Fl. parvi, extus hirti.

- altissimum*. C. caul. volub: fol. cordatis, utrimq. tomentosis: fl. umbellatis. Jacq. amer. tab. 57. ed. piñ. tab. 83.
In Carthagenæ sylvaticis h.
 Planta 50-ped. scandens, fruticosa, lactesc. Fol. primum 2-pollic. tandem semiped. opposita, petiol. acumin. integerr. crassula. Umbel. lateral. solitariae, densae, hemisphaericæ, involuc. polyphyl. inæquali. Fl. crassi, inodori. Cal. cinereo-virens. Cor. sordide purpur.
- longiflorum*. C. caul. volub: fol. obovat. oblong. acutis, villosis: fl. umbellat. Jacq. amer. tab. 59. ed. piñ. tab. 85.
In Carthagenæ sylvis h.
 Planta lactesc. Caul. 15-ped. scandens. Fol. semiped: petiolis brevibus, & pilosis innixa, opposita, cordata, integerr. crassula, venis, nervisq. pilosis. Umbel. lateral. solitar. plerumq. 7-fl. involuc. polyphyl. inæquali. Fl. 2-pollic. inamæni, inodori. Cal. pallide virens. Petal. extus pallent. intus pilis fuligineis argenteis.
- filiforme*. C. caul. volub: fol. ovat. acumin. planis, nitidis: umbell. globosis. Jacq. amer. tab. 60. f. 1. ed. piñ. tab. 86.
In Carthagenæ sylvaticis h.
 Planta lactescens. Caul. numerosi, filiform. ramosi. Fol. vix sesquipollic. opposita, petiolat. integerr. plana. Umbel. lateral. erectæ, alternæ, parvæ. Fl. exigui, inodori. Petal. & nectar. nivea. *Diversum a C. filifor. Lin. Suppl.*
- clausum*. C. caul. volub: fol. lanceol-oblong: revolutis: fl. umbellatis. Jacq. amer. tab. 60. f. 2. ed. piñ. tab. 87.
In Carthagenæ fruticosis h.
 Planta lactescens. Caul. numerosi, glabri. Fol. 2-3-pollic. opposita, breviss. petiol. integerr. venosa, nitida. Umbel. lateral. solitar. Fl. inodori. Petal. & nectar. nivea.
- Pyrotechnicum*. C. caul. frutic. nudo: pedunc. axill. solitar. tuberculosis: fl. capitat. pedicellat. Forsk. Æg.
In Arabia h.
 Caul. numerosi, alti, brachiati, articulati, glabri. Pedunc. ad basin articuli, 1-2-3. semipollic. Fl. subdeni. Cor. supra flava, basi, &

- subtus viridis . Nectar. campanulat. viride .
Follic. curvi , basi adtenuati .
- arborescens* . C. caul. volub. cor. rotata . *Forsk. Æg.*
In Arabia h .
Arb. procera . Fol. variantia in eodem subiecto ,
sæpe ovata , vel lineari-lanc. aut subhastata .
Cor. virid. *Planta non lædescens* .
373. APOCY- Cor. campanulata . Filam. 5. utpote crassata cum
NUM . flaminibus alterna .
1. *sibiricum* . A. caul. erecto , herbaceo : fol. oblong: umbell.
terminalibus . *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3.*
tab. 66.
Simil. A. cannabino . - Planta , glabra , lædescens .
Caul. sesquiped. ramosi . Fol. opposita , sub-
fessil. acutiusc. integerrima , ore non revolu-
to . Pedunc. umbellati . Fl. parvi . Cor. alba ,
inodora , limb. 5-fid. obtuso .
2. *androsæmi-* A. caul. erectiusc. herbac: fol. ovat. utrimq.
folium . glabris : cymis terminalibus . *Syst. veg. ed. 14.*
Dodart. hiem. 4. tab. 59. Morif. hist. 3. f.
15. tab. 3. f. 16.
In Virginia , Canada u .
Caul. ramis purpurasc. maculis nigris adspersi .
Fol. opposita , breviter petiol. supra satore
virid. subtus albicantia . Fl. Liliiconvall. rosei ,
odori .
3. *cannabi-* A. caul. erectiusc. herbac: fol. oblong: panicu-
num . lis terminalibus . *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist.*
3. f. 11. tab. 3. f. 14. Pluk. alm. tab. 13. f.
1. & tab. 260. f. 4.
In Canada , Virginia u .
Caul. sublignosi . rubri . Fol. pollicar. opposita ,
breviter petiol. integerr. glabra . Cor. albida .
Follic. linear. oblong.
4. *venetum* . A. caul. erectiusc. herbac: fol. ovat-lanceol. *Syst.*
veg. ed. 14.
Esula &c. Lob. hist. 201.
In Adriatici maris insulis , & in Sibiria u .
Fl. purpurei .
5. *minutum* . A. caul. prostrato : fol. hastatis . *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.
Ad cap. h. Spei .
Caul. filiform. vix spitham. raro scandentes . Fol.
unguicul. opposita , vix petiol. lanceol. utrimq:
dente laterali . Umbel. simpl: sub. 6-fl.

6. *filiforme*. A. caul. prostrato, herbac. fol. filiformibus: fl. umbellat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
7. *frutescens*. A. caul. erect. frutesc. fol. lanceol-ovalibus: cor. acutis, fauce villosa. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Zeyl. tab. 12. f. 1. Pluk. phyt. tab. 96. f. 7. & tab. 421. f. 6.*
In Zeylona h.
 Fol. opposita, breviter petiol. utrimq. acuta, subtus pallescens, integerr. glabra, lucida. Pedunc. axillar. longi, oppositi ramosi. Cor. purpur. limbo magno.
8. *reticulatum*. A. caul. volub. perenni: fol. ovat. venosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Olus crudum. Rumph. amb. 3. tab. 40.
In India h.
 Fol. opposita, petiol. rara, 3-4. poll. longa, 3. lata, atrovirent. nitida, reticulata, venis laetis prædita, subtus nervosa. Racemi axill. Petal. reflexa, albida.
9. *lineare*. A. caul. volub. herbac. fol. linearibus, planis: umbell. axillar. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
10. *triflorum*. A. caul. volub. herbac. fol. lanceol. umbell. axill. 2-3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

-
- Acouci*. A. fol. oblong-ovat. acuminat. fl. minim. albis. *Aubl. Guian. tab. 107.*
In Guiana h.
 Frutex caulibus pl. sarmentosis, nodosis, supra arbores sparsis. Fol. opposita, breviter petiol. longe acumin. petiolis amplexicaulibus, integerr. glabra, fl. axillar. & terminal. paniculati. Corymb. oppositi.
- umbellatum*. A. fol. ovat-acuminat. subtus tomentosis: fl. purpurescentibus. *Aubl. Guian. tab. 108.*
In Guiana.
 Frutex ramis pl. volubilibus, supra arbores scandentibus. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. supra glabra, viridia. Fl. terminal. corymbosi: pedunculi partiales bracteis binis muniti.

374. ASCLE- Contorta. Cor. plana, vel reflexa, 5-fida. Ne-
PIAS. ctar. 5 ovata, concava, corniculum exseren-
tia. Folliculi bini. Sem. papposa.

* *Fol. oppositis, planis.*

1. *undulata*. A. fol. sessilibus, oblong. lanceol. undulat. gla-
bris: petal. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Comm. rar. tab. 16:
In Africa 24.
Caulic. pl. Fol. opposita, vix spithamam longa,
viridia, costa albicante. Fl. terminal. virid.
margine pilis albicantibus.
2. *crispa*. A. fol. cord to-lanceol. undulatis, scabris, op-
positis: umbel. terminali. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Comm. rar. tab. 17.
Ad cap. b. Spei.
Caul. erectus, inferne ramosus, pubescens. Fol.
2-pollic. breviter petiol. acuta. Umbel. termi-
nal. simpl. hirsuta, purpur. Cor. reflexa, fla-
vesceos.
3. *pubescens*. A. fol. ovatis, venosis, nudis: caul. fruticos. pe-
dunculisque villosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 3. f. 35.
Pluk. phyt. 139. f. 1.
Ad cap. b. Spei h.
Caul. erectus, simpl. Fol. opposita, breviss. pe-
tiol. confertiuscula, mucronata, venosiss. vil-
losa. Umbel. villosæ. Fl. purpurasc.
4. *volubilis*. A. caul. arbor. volub. fol. ovat. acuminat. inte-
gerrim. planis: umbell. erectis. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.
In Zeylona.
Umbell. simplic. peduncul. Fl. viridescent.
5. *asthmatica*. A. caul. fruticos. volub. hirsuto: fol. opposit. pe-
tiolat. cordat-ovat. integerr. supra glabris: um-
bell. paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Zeylona.
Tota planta villosa, excepta pagina super. fol.
Fol. adproximata, magnitudine, & fig. *Lauri*
nobilis, acuta. Umbel. axill. sæpe proliferae.
Fl. parvi.
Radix egregia in asthma seroso.
6. *gigantea*. A. fol. amplexicaulibus, oblong-ovalibus, basi
pilosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 89.*
amer. ed. piç. tab. 88.

Apocynum &c. *Pluk. alm. tab. 175. f. 3.*

Beidel offar. *Alp. Æg. tab. 86.*

Ericu. Hort. mal. 2. tab. 31. Seb. thes. 1. tab. 26. f. 1.

Zia rack. Brun. it. tab. 184.

In India, Ægypto 24.

Arbut. homine duplo altior. Rami pauci, longi, crassi, inferne nodosi. Fol. molli lanugine obsita. Batis petiol. supra barbata. Pedunc. axill. racemosi. Cal. ex flavo-albicans. Cor. alba cum inacula purpur. Nectar. alba prominent non coriacula subulata, sed laminas solidas conniventes.

Occidit inadjueta Pecora, ut Anemone nemorosa.

7. *syriaca.* A. caul. simplicif. fol. ovalibus, subtus tomentof. umbell. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 521.*

Apocynum syriac. Clus. hist. 2. pag. 87.

In Virginia, & circa Astracan. 24.

Altitudo humana. Fol. lata. Fl. parvi, obsolete purpurasc. odori.

8. *amæna.* A. caul. simplici: fol. ovatis, subtus pilosiuscul. umbellis, nectariisque erectis. *Syst. veg. ed. 14. Apocynum &c. Dill. elth. tab. 27. f. 30.*

In Amer. septentrion. 24.

Caul. pl. 2-cubital. & ultra, glabri. Fol. 3-4. unc. longa, 2-3. lata, opposita, mucrone obtusiore, inferior. min. & rotundiora, crassiusc. rigida, supra glabra, & subnitent. quandoq. luteo-virid. subtus albicant. nervo medio purpur. Fl. terminal. amæne purpur.

9. *purpurascens.* A. caul. simpl. fol. ovatis, subtus villosis: umbell. erectis: nectariis resupinatis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 28. f. 1.*

In Carolina 24.

Adfinis valde *A. syriacæ*. A. priore vero differt fol. longioribus: petal. obsolete herbaceis; cornicul. colore palidior, & horizontaliter sitis.

10. *variegata.* A. caul. simpl. fol. ovatis, rugosis, nudis: umbell. subfessilibus; pedicell. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Apocynum &c. Pluk. alm. tab. 77. f. 1.

In Amer. boreali 24.

Adfinis *A. syriacæ*. Radix tuberosa. Caul. obscure purpur. Fol. lata, rigidiora, excavata. Fl. terminal. albi, intus purpur.

11. *curassavica*. A. caul. simplic. fol. lanceolat. glabris, nitidis: umbell. lateralibus erectis, solitar. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. *Dill. elth. tab. 30. f. 33. Hermapar. tab. 36.*
In Curassao 24. 1.
 Caul. 2-3-ped. Fol. subtus pallidiora. Petal. coccinea, corniculis erectis, croceis. Folliculi ad latera quandoque denticulati.
12. *nivea*. A. caul. simplici: fol. ovat-lanceol. glabriuscul. umbell. lateralibus, erectis, solitar. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. *Dill. elth. tab. 29. f. 32. Plum. sp. ic. 30.*
In Virginia, & Amer. calidiore ♂.
 Fol. opposita, vix petiol. venosa. Fl. reflexi. Cor. virid. nectariis niveis.
Differt a priore fol. minime nitidis, parumper scabris, sed basi magis rotundatis, nec perfecte lanceolat. Follic. edentuli.
13. *insarnata*. A. caul. superne diviso: fol. lanceol. umbell. erectis, geminis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 107.*
Apocynum &c. *Barr. rar. tab. 72.*
In Canada, Virginia 24.
 Tota planta lacte niveo scatet. Caul. pl. 3-ped. basi cœrul-purpur. ubi dividuntur, fol. e regione 3. producunt. Fol. opposita, petiol. integerr. Rami florigeri terminal. Umbell. densæ. Involuc. foliolis subulat. constans. Petal. reflexa, purpuro-rubent. Nectar. purpuro-pallens. Fl. Vanillam parumper olent.
14. *decumbens*. A. caul. decumbente, fol. villosis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia 24.
 Caul. hirsutus. Fol. subsessil. ovat. obtusa.
15. *lactifera*. A. caul. erecto: fol. ovatis: umbell. breviss. proliferis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Zeylona 24.
Simil. A. Vincetoxico. Differt fol. minus cordatis: corymb. compositis, vix petiolis longioribus).
16. *Vincetoxicum*. A. caul. erecto: fol. (cordato-acuminat. basi barbatis: umbell. proliferis. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 25. Mill. ic. tab. 53. Black. tab. 96. Fl. Dan. tab. 849. Lœb. ic. p. 630.*
Vincetossico. Martk.
In Europæ glareosis 24.

- Caul. sublnos. articul. teres, subhirsut. Fol. opposita, petiol. integerr. dura, oris, nervisq. tomentol. Racem. axil. Petal. alba. *Var. fol. ternis; & fl. flavescentibus.*
17. *nigra*. A. caul. superne subvolub. fol. cordatis (nudis).
Syst. veg. ed. 14.
Vincetoxicum &c. Camer. epit. 360.
Habitat Monspelii &c. in collibus 24.
Fl. conferti, patentiss. Petal. nigra.
*** Fol. lateralibus, revolutis.*
18. *arbore-
scens*. A. fol. ovat. revolutis: caul. fruticoso, subvillo-
so. Syst. veg. ed. 14.
Apocynum &c. Burm. afric. tab. 13. Pluk. phyt.
tab. 320. f. 1.
In cap. b. Spei montibus h.
Caul. erectus, hirtus, crassitie digiti. Fol. op-
posita, breviss. petiol. obrutiusc. mucrone mi-
nuto, lævia. Pedunc. e summitate caul. um-
bellif. villosi. Cor. alba. Fl. & fruct. sequentis.
19. *fruticosa*. A. caul. fruticoso: fol. lineari-lanceol. revolutis.
Syst. veg. ed. 14.
Apocynum &c. Herm. parad. tab. 24. Mill. dict.
tab. 45. Pluk. alm. tab. 138. f. 2.
b. A. crassifolia huic adfinis.
In Æthiopia ♂.
Altitudo humana. Fol. sæpe terni. Petal. alba.
b. Differt latitudine fol. & hirsutie.
20. *undulata*. A. fol. revoluti-repandis, pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Comm. rar. tab. 17.
Habitat . . .
Caulic. pl. 2-3—ped. quandoque lanuginosi. Fol.
opposita, breviter petiol. digitum longa, acu-
tata, margine subsinuato. Fl. terminal. umbel-
lati, reflexi, e viridi-flavescent.
21. *sibirica*. A. caul. decumbente: fol. opposit. ternisq. li-
neari-lanceolat. revolutis. Syst. veg. ed. 14.
Comm. Gotting. tab. 7.
In Sibiria 24.
Planta albido-tomentosa, succo lacteo turgens.
Radix repens. Caul. spitham. ascendens, ra-
mis patentibus, ultra caulem elongatis. Fol.
multa. Racemi 2-fidi. Bract. exiguae, seta-
ceæ. Cor. patens; adulta contorta, viridi-
alba, odore Tiliæ. Nectar. cor. quadruplo
brevius.

22. *verticillata*. A. caul. erecto: fol. verticillat. linearibus, revolutis. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Pluk. mant. tab. 336. f. 4.
In Virginia 24.
 Fol. sæpe quaterna. Peduncul. umbellif. sunt oppositifolii. Fl. albi.

*** *Fol. alternis.*

23. *rubra*. A. fol. alternis, ovati: umbellis ex eodem pedunc. comm. pl. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
 Caul. erectus, simplex. Fol. acuminata. Fl. rubri.
24. *tuberosa*. A. fol. (inferior.) alternis, lanceol. caul. divaricato, piloso. *Syst. veg. ed. 14.*
Apocynum &c. Herm. Lugd. tab. 647. Dill. elch. tab. 30. f. 34.
In Amer. boreali 24.
 Radix tuberosa. Caul. sub 2-ped. obscure rufi, superne ramosi. Fol. super. bina-quaterna, longa, arcte circumdata. Fl. umbellati, aurantiaci. Folliculi longi.

**** —

25. *filiformis*. A. caul. erecto: fol. filiformibus: umbellis lateralibus, elongato-peduncul. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Obs. A. filiform. & Cynanchum filiform. primo visu simill. eadem planta saltem fol. fig. diversis fl.
26. *grandiflora*. A. caul. erecto, simpl. hirtio: fol. petiolat. oblongi: pilosis: fl. axillar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Umbella nulla. Flos maximus, col. *Fritillaria meleagroidis* tessellato.
27. *carnosa*. A. fol. ovatis, carnosis, glaberrim. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In China.
 Fol. vix palmar. petiol. avenia. Umbella simpl. solitaria. Cal. minutus. Cor. minus divisa, vix sem. 5-fid. plana. *Valde a reliquis diversa.*

- quadrifolia*. A. caul. simpl. fol. quaternis, ternisq; infimis oppositis. *Jacq. Obs. 2. tab. 33.*
In Virginia 24.
An A. sibir. vel verticillata? Fol. oblong. utrimque acumin. Fl. dilute rubentes, odori.
- spiralis*. A. caul. fruticoso: fol. petiolat. ovali-oblong: fl. axillar. solitar: petal. linearibus, spiralibus, introitum hirsutis. *Forsk. Æg.*
In Arabia h.
 Fruticul. non lactescens. Fol. brevia, opposita, quandoq. verticillata. Pedunc. axill. vel lateral. 1-fl. Cor. viridi-flava. Fruct. edulis.
- radians*. A. fol. petiol. cordat. acutis, undulatis: umbellis terminalibus: cor. limbo erecto, spirali. *Forsk. Æg.*
In Arabia 24.
 Caul. erect. spitham. simpl. villosus. Fol. brachiatim opposita, patentia. Fol. lamina vix pollic. villosa, obscure virid. venis albidis. Pedunc. interfoliacei. Fl. bracteati. Cal. ferrugin. villosus. Cor. tubo fusco-violaceo: laciniis extus violaceo, intus obscure flavis. Nectar. cylindr. album. Folliculi ovati, villosi.
- aphylla*. A. caul. aphyll. volub. racemis coniugatis, globosis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Caul. articulati, carnos; ramis ad genicula oppositis. Peduncul. ad genicula corymbosi. Cor. alba.
- sipitacea*. A. caulibus fruticos. diffusis, aphyll. articulatis: umbellis ramulorum terminalibus. *Forsk. Æg.*
In Arabia h.
Tota planta lactescens. Frutex 2-cubital. erecto-diffus. ramosiss. Caul. obscure cœrul. farina tenui albicante: articul. ramosi, non volubili. ramis oppositis. Pedunc. ramuli breves, adpositi vel ad genicula, vel ad apicem caulium, undique floriferi. Cal. parvus. Cor. patens, marginibus reflexis, viridibus. Nectar. album. Follic. 3-pollic. subulati.
- setosa*. A. fol. margine revolutis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Caul. erectus. Fol. opposita, linearia. Umbell. lateral-terminal. Cor. virid. Follic. inflati, setiferi.

laniflora.A. fol. lineari-lanceolat. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Valde laefcit. Fol. opposita, plana, nitida.
 Pedunc. axill. lateral. umbellati. Cor. intus
 hirsuta. Follic. nec inflati, nec hispidi, sed
 striati, subrugosi.

Succus cum butyro mixtus, in unguento contra
 scabiem.

375. STAPE-Contorra. Nectar. duplici stellula tegente geni-
 LIA. talia. Planta carnosa, succosa.

1. *variegata*. S. denticul. ramorum parentibus. *Syst. veg. ed.*

14. Knorr. del. 1. tab. F. 4.

Asclepias &c. *Bradl. succ. tab. 22. Moris. hist.*
 3. f. 15. tab. 3. f. 4.

Apocynum &c. *Herm. Lugd. tab. 53.*

Ad cap. b. *Spei h.*

Caul. tereti-4-gon. fuscus, nebulis albis, car-
 nosis, farinosis. Fol. nulla. Cal. albo-viresc.
 punctis ferrugin. Cor. grisea, rugosa, punctis
 purpureis picta. Fruct. flavus.

2. *hirsuta*. S. denticul. ramorum erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Mill. ic. 258.

Asclepias &c. *Comm. var. tab. 19. Bradl. succ.*
tab. 23.

Ad cap. b. *Spei h.*

Scapi maiores, & erectiores priore, per æta-
 tem subpurpur. Cor. col. sordidiore, purpura
 lanugine ornata.

3. *mammilla-* S. denticul. ramorum obtusis, mucronatis. *Syst.*
ris. veg. ed. 14. Burm. afric. tab. 11.

Ad cap. b. *Spei h.*

Scap. crassus, ramosus, aphyllus, variegat. ex
 meris nodis subrotundis, sibi invicem arcte
 iunctis constans. Loco folior. squamæ oblong.
 acutæ, ex albo-rubentes. Fl. e medio tuber-
 culorum, pusilli, purpuræ-rubri. Follic. digi-
 tum longi, crassi, cinerei.

4. *piliifera*. S. caul. tereti, mammoso tuberculato; mam-
 millis apice piliferis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.

Ad cap. b. *Spei.*

Caul. simpl. raro ramosus. Fl. inter tubercula,
 parvi, purpur.

5. *incarnata*. S. quadrangul. dentibus horizontaliter truncatis,

callosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Burm. Dec. tab. 7. f. 1.*

Ad cap. b. Spei.

Fl. parvi, incarnati. *Editur ab Afris.*

quadrangula. S. foliol. subulat. coniugaris. *Forsk. Æg. tab. 6. In Arabia.*

Caul. cubital. 4-gon. ramofus, obscure virid. angul. subdentat. Fl. terminal. conferti, parvi, sessil. viridi-flavescent. sem. papposa. *Succus non lacteus, sed aqueus.*

376. LINCO- Petal. 5. foveolæ nectarii basi insculpta. Capf. NIA. seminifera, 2-locul.

1. *alopécuroidea*. L. *Syst. veg. ed. 14.*

Coridis folio &c. *Burm. afr. 7.*

In cap. b. Spei montosis aquosis h.

Frutex ramis virgat. inæqualibus, a basi deciduorum fol. omnino ut in *Abiete*. Rami pauci, determinati. Fol. sparsa, subverticillata, 5-6, subpetiol. linear. triquetra, rigidula, nitida, pollic. angulis scabra, suprema ciliata. Fl. ad apices ramorum, lateral. sessil. longitudine folior. Calyc. foliola non in orbem, sed per paria alternatim opposita, digesta, margine villosa. Cor. tenaces, incarnatæ, aut albæ.

377. HER- Cal. 5-part. Cor. o. Stam. 5. sterilia. Tuba bi- NIARIA. fida. Capf. 1-sperm.

1. *glabra*. H. glabra (glomerulis multifl.). *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 529. Black. tab. 320. Bauh. hist. 3. p. 378.*

Anthyllis &c. Lob. ic. 421.

Poligono minore. Mauh.

In Europæ apricis, glareosis, siccis ☉.

Planta minima, vix semiped. Caul. procumb. Fol. opposita, sessil. integerr. ovat-lanc. e viridi-flavescent. Glomeruli axill. sessil. virentes. Bractea fl. minor, ovat-lanceol. sicca.

2. *hirsuta*. H. hirsuta (glomerul. paucifloris). *Syst. veg. ed. 14. Zanichel. ii. 284. Bauh. hist. 3. p. 379.*

In agris glareosis Italiae &c. 24.

Differt a priore rad. perenni; & fol. hirsutis.

3. *fruticosa*. H. caul. frutic. fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Polygonum &c. Bauh. hist. 3. p. 378. Lob. ic. 85. In Hispania h.*

Radix crassa. Caul. erecti, vel proscumbent. tortuosi, etiam spitham. ramosiss. ramis patentibus, fol. acervatim onustis. Fol. opposita, brevia, minutiss. oblong. obtusa, plana, glabra: fol. min. axillar. stipul. interfoliac. parvæ, oppositæ, subalbæ. Fl. copiosi, terminal. glomerati, conferti, sessil.

4. *lenticulata*. H. *Syst. veg. ed. 14. Est Cressa cretica, monente Vahl.*

378. CHENO-
PODIUM. Cal. 5-phyll. 5-gonus. Cor. o. Sem. 1. lenticulare, superum, calyce sicco involutum. Fl. glomerato-racemosi.

* *Fol. angulosi.*

1. *Bonus Henricus*. C. fol. triangulari-sagittat. integerr. spicis axill. compositis, aphyll. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 579. Ludwig. ed. tab. 185.*

Mercurialis. Black. tab. 311.

Bonus Henricus. Bauh. hist. 2. p. 965. Trag. 317.

In Europæ montium ruderalis 24.

Caul. 2-ped. ad terram foliosus, superne floriger. Fol. longe petiol. petiolo basi dilatato-amplexicaul. ora undulata, subtus albo farinaceo polline adpersa. Spicæ alternæ, sessil.

2. *urbicum*. C. fol. triangular. subdentat: racemis confertis, strictissim. cauli adproximatis, longiss. *Syst. veg. ed. 14. Buxb. hüll. 69. tab. 1.*

In Europæ borealis plateis ☉.

Caul. erect. 2-3--ped. glaber, ramis alternis. Fol. alterna, petiol. sæpe flavo-virid.

3. *Atriplicis*. C. caul. erecto: fol. (*inferioribus*) deltoideis, subtus coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Juss. in demonstr. H. R. P.*

C. purpurasc. Jacq. H. 3. tab. 80.

In China, & Sibiria ☉.

Altitudo humana. Tota planta col. sanguineo notata. Fol. adulta lividum virorem induunt. Caul. medullosus. Fol. alterna, longe petiol. plerumq. obtusa, sinuato--dentata, utrimque glabra; superior. ovata. Fl. racemosi, in pl. glomerulos collecti.

4. *rubrum*. C. fol. cordato-triangularibus, obtusiusc. dentat. racemis erectis, compositis, subfolios. caul. brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Atriplex &c. *Morif. 2. tab. 31.*

Pes anserinus. Dalech. tab. 542. Fuchf. hist. 653.

Bauh. hist. 2. pag. 975. Dod. 616.

In Europæ cultis, ruderatis ☉.

Caul. cubital. & ultra, decumbens, ramosiss. striis rubris. Fol. firmiusc. nitida; iuniora subtus farinosa, adulta utrimq. viridia; dentibus alterne maioribus, acutis.

5. *murale.* C. fol. (subtriangularibus) acutis, dentat. nitidis: racemis ramosis, nudis. *Syst. veg. ed. 14.*

C. 1. *Tabernem. hist. f. 1.*

Atriplex &c. *Bauh. hist. 2. pag. 975.*

In Europæ muris, aggeribusque ☉.

Caul. erecti, 2-pedali. ramosiss. patuli, angulati, striis purpur. Fol. alterna, petiol. crassiusc. glabra. Fl. subpaniculati. *Color viridis.*

6. *serotinum.* C. fol. deltoideis, sinuato-dentat. rugosis, glabris, uniformibus: racemis terminalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Blitum &c. *Petiv. tab. 8.*

In Europæ ruderatis, & cultis ☉.

7. *album.* C. fol. rhomboideo-triangularibus, erosis, postice integris; summis oblong. racem. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 553.*

Atriplex &c. *Fuchf. hist. tab. 119. Bauh. hist. 3. pag. 972.*

In agris Europæ ☉.

Planta matura albicat. Caul. etiam seped. erectus, minus sparsus. Fol. petiol. subtus farinacea; summa simplic. lingulata. Racem. axill. recti, conglobati; spicis alternis, sessilibus, confertis. Calyc. farinosi.

8. *viride.* C. fol. rhomboideis, dentato-sinuatis: racemis ramosis, subfoliatis. *Syst. veg. ed. 14. Vuill. parif. tab. 7. f. 1.*

Atriplex &c. *Bauh. hist. 2. pag. 972.*

In Europæ cultis oleraceis ☉.

Caul. erect. viridis, angulis purpurascens. Fol. ramea lanceol. integerr. vix uno, alterove dente. Racemi filiform. longi. *Difficile a prære seiungi potest.*

9. *hybridum.* C. fol. cordat. angulato-acuminat. racemis ramosis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Vuill. parif. tab. 7. f. 2. Tabern. 428.*

Solanum IV. Trag. 304.

Atriplex &c. *Barr. ic.* 340.

In Europæ cultis ☉.

Planta odore Stramonii, noxia. Caul. cubital.

Fol. satore virid. absq. polline, venosa, dentibus 7-9. magnis. Racemi valde ramosi. Cal. albus, ore virente. Glomeris maturi purpurasc.

10. *Botrys*. *C. fol. oblong. sinuatis: racem. nudis, multifid. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 314. Ludw. ed. tab. 32.*

Botrys. Matth. Fuchf. Camer.

In Europæ australis arenosis ☉.

Planta viscida, odore aromatico. Caul. ped. Fol. longe petiol. hirsuta, venis rubris.

11. *ambrosioides*. *C. fol. lanceol. dentatis: racem. simplicibus, foliatis. Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 50.*

Botrys &c. Morif. hist. 3. f. 5. tab. 35. f. 8.

In Mexico, Lusitania ☉.

Caul. 2-ped. subrubus. Fol. inordinata. Odor aromaticus ad Cuminum accedens.

12. *multifidum*. *C. fol. multifid. segment. linearibus: fl. axillar. sessilibus. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 66. f. 77.*

In Bonaria ☿.

Caul. 2-ped. toti ramosi. Fol. alterna, læte virent.

13. *anthelminthicum*. *C. fol. ovat-obl. dentat. racem. aphyll. Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 66. f. 76.*

In Pennsylvania, Bonaria ☿.

Simil. C. ambrosioidi. Caul. erectus, 3-cubit. ad medium ramis paucis, aliunde multis. Fol. utrimq. virid.

Planta odora, contra vermes.

14. *glaucum*. *C. fol. oblong. sinuat. subtus incanis. C. fol. ovat. oblongis, repandis: racem. nudis, simplicibus, glomerat. Syst. veg. ed. 14.*

Atriplex &c. Bauh. hist. 2. tab. 473. Tabern. ic. 427. Ad Europæ finem ☉.

Caul. humifusi, pedal. & ultra. Fol. ex viridiglaucum, subtus incana, petiol. 3. utrimq. denticul. obtusis. Pedunc. axillar. breves. Variæ fol. integerr. & quandoq. subulatis.

** *Fol. integris.*

15. *Vulvaria*. *C. fol. integerr. rhomboideo-ovat. fl. axillaribus, glomeratis. Syst. veg. ed. 14.*

Atriplex

PENTANDRIA DIGYNIA. 97

- Atriplex* &c. *Bauh. hist.* 2. p. 974. *Morif. hist.* 3. tab. 31. f. 6.
Vulvaria. *Black. tab.* 100. *Dalech. hist.* 343. *Tabern. hist.* pag. 438.
In Europæ cultis oleraceis, & ad muros, locis meridiano sole percussis ☉.
 Caul. procumb. Fol. alterna, fœtida, polline farinaceo adspersa.
16. *polyspermum*. C. fol. integerr. ovat. caul. decumben. cymis axillaribus, dichot. aphyll. *Syst. veg. ed.* 14.
Blitum &c. *Morif. hist.* 2. tab. 30. f. 6. *Camer. epit.* pag. 237.
In Europæ cultis, & ruderatis ☉.
 Caul. erectus, & decumb. cubital. Fol. alterna, petiol. ovata, sensim obtuse mucronata, subhirsuta. Racem. axillar. ramosi, nudi; iuniores cylindrici, adulti paniculato-divaricati.
17. *scoparia*. C. fol. linearilanceolat. integerr. planis. *Syst. veg. ed.* 14.
Linaria &c. *Bauh. hist.* 3. pag. 462.
Olyris. *Dod. pempt.* 151.
In Græcia, Japonia, China, Carniolia, Comitatu Nicaensi ☉.
 Altitudo humana. Caul. glaberrimus, albicans. Fol. villis ciliata, subtus nervosa.
18. *maritimum*. C. fol. subulat. semicylindric. *Syst. veg. ed.* 14.
Fl. Dan. tab. 489.
Kali &c. *Morif. hist.* 3. f. 3. tab. 33. f. 3. *Lob. ic.* 394.
In Europæ maritimis ☉.
 Fol. alterna, glauca. Rami alterni. Fl. in alis superioribus, conferti, sessil.
19. *aristatum*. C. fol. linearilanceol. subcarnof. integerr. corymb. dichotom. aristat. axillaribus. *Syst. veg. ed.* 14.
Gmel. Sib. 3. tab. 15. f. 1.
In Sibiria ☉.
 Caul. subpalm. ramosi, expansi, raro rubri. Fol. sessil. late viridia, quandoq. rubra. Panicul. magna, divaricatiss. cessante dichotomia fl. alterni, sessil. subiecta his aristis.
20. *oppositifolium*. C. fol. opposit. breviss. lanceol-subulat. *Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl.*
 Salsola oppositifol. *Pall. it.* 2. tab. O.
In Dauuria, & Sibiria.
Facies Kali vulg. Caul. diffusus, ramosissim. sed
Tom. II. G

tamen erectior, sublignesc. Rami oppositi, rubicundo-striati. Fol. ad genicula opposita, subcarnosa, pungentia. Spicul. floriferæ axillar. Calyc. squamæ griseo-pellucidæ, vel rubentes.

triangulare. C. fol. triangularibus, æquilateris, postice integris; racem. axillaribus, & terminalibus, decomposit. subnuis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Ægypto.

Fol. tetraquipollic. subtus subfarinosa, latiora magis quam longiora, erosa, sæpe integra, petiol. Racemi raro subultri bractea lanceol. ramis compositis.

(*sericeum*.) C. fol. subulat. sericeis; fl. glomerulis geminis. *Hall. Hist. n. 1575.*

In Helvetia.

Differt a C. maritimo, fol. & cal. sericeis; fl. maiore.

punctulatum. C. fol. albo-punctulatis; imis rhombeo-ovatis, sinuatis; supremis ellipticis; racemis lateraliibus, spicatis, foliosis. *Scop. Delic. Insul. fasc. 1. tab. 11.*

Habitat . . . ☉.

Caul. erectus, 2-ped. & ultra, teres, striatus, rigidus, ruber, basi flavescens, ubique adspersus punctulis albis. Fol. alterna, remota, petiolis brevibus, rubris, rariter obiterque sinuata; tumma minime sinuata. Racemuli inferiores foliosi, supremi aphylli. Cal. rubens, albo polline adspersus. Sem. lucidum, tenui membrana tectum. *An C. Atriplicis? sed fol. & aliæ notæ non conveniunt.*

379. BETA. Cal. 3-phyll. Cor. o. Sem. reniforme, intra substantiam baseos calycis.

1. *vulgaris*. B. fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*

B. rubra. *Black. tab. 235.*

Ad Europæ australior, maritima ♂.

Fol. alterna, magna, subcordata, integerr. dilute viridia, petiol. & costa alba, nitida. Fl. axillar. & terminal. glomerato-ramosi. Calyc. foliol. basi dentata.

2. *Cicla*. B. fl. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Lusitania ad Tagum ☉.

Fol. radical. petiol. caulina sessilia. Spicæ lateral.
longiss. Calycis foliol. b. si inermia.

3. *maritima*. B. fl. geminis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Angliæ, Belgii &c. littoribus maris ♂.
Differt a B. vulg. quoa primo anno floreat: quod
fol. obliqua, seu verticali: quod calyc. foliol. sua
curina æqualia, nec unidentata.

380. *SALSO-* Cal. 5-phyll. quodammodo coloratus. Cor. o. Caps.
LA. 1-sperma, globosa. Sem. 1. cochleatum.

1. *Kali*. S. herbac. decumb. fol. subulat. spinosis, scabris;
calycibus axillar. marginatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 818.

Kali &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 33. f. 11.

Tragum. Cam. epit. 779.

Trago Matth.

In Europæ littoribus maris ☉.

Planta spinosa. Fol. crassa. Cal. cinctus margine
foliac. Styl. 3-fidus.

2. *Tragus*. S. herbac. erecta: fol. subulat. spinosis, lævibus:
calycibus ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Drypis &c. Tabern. hist. 423.

Var. prioris. Planta 3-pedal.

3. *rosea*. S. herbac. fol. subulatis, mucronatis: calycibus
explanatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Kali. Buxb. cent. 1. tab. 14. f. 2.

Ad Asiæ septentr. salinas ☉.

Caul. subped. Fol. teretia, acuta, crassa, pleraq.
apice infra flexa. Sem. magnum. Calyc. pur-
pur. fl. rosaceum mentientes.

4. *Soda*. S. herbac. patula: fol. inermibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. hort. tab. 68. Lob. ic. 394.

Kali Matth.

In Europæ australis salinis ☉.

Planta nitida. Caul. ped. subruber. Fol. infer.
opposita; super. alterna, primum longa, &
angusta, dein brevia; carnosia, subulata, su-
pra plana, subtus teretia, leviter sulcata, cum
spinula innocua, cinerescens. supra lineis 3.
viridibus, angustis exarata.

5. *sativa*. S. herbac. diffusa: fol. teretibus, glabris: fl. con-
glomeratis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispaniæ australis maritimis ☉.

Caul. undiq. diffusi, ramosiss. ramis, & ramulis
alternis. Fol. alterna, carnosia, supra linea

- longitudinali fusca picta, vix ungue longiora; plano-concava; infima basi lateſcunt. Bractæ fol. longiores, ſucculentæ. Fl. axillar. ſeſſil. Glomeruli breves, craſſi, ſaſtigiaro-truncati.
6. *altiffima*. S. herbac. erecta, ramiſſiſſ. fol. filiformibus, acumuſcul. baſi pedunculiſeris. *Syſt. veg. ed. 14.* Chenopodium &c. *Buxb. cent. 1. tab. 31. f. 2.* Surda fruticoſa. *Forsk. Vahl.*
Ad ſalinas Italiæ, Saxoniz, Aſtracani ☉.
 Altitudo quandoq. humana. Fol. uncial. & longiora, ſucculenta, glauca. Pedunc. 3-fl. lateraliſus ad baſin intermediis enatis, ex baſi fol. ipte enatus, ut in *Theſto*, & *Turnera*. Styli 3.
7. *Salfa*. S. herbac. erectiſc. fol. linearibus, ſubcarnoliſis, mutiſis: calyc. ſucculentis, diaphanis. *Syſt. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 83.*
 Chenopodium &c. *Buxb. cent. 1. tab. 31. f. 1.*
Ad Aſtracanium ☉.
 Caul. baſi adſcendens, pedal. purpureſc. Fol. ſparſa, ſupra plana. Fl. axill. ſeſſil. terni. Calyc. foliola maxime fornicata, convexa, clauſa, in fructu hyalina. Styli 3. apice 2-fid.
8. *hirsuta*. S. herbac. diſſuſa: fol. teretibus, obruſ. tomentoliſis. *Syſt. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 187.*
 Kali parvum &c. *Bauh. Hiſt. 3. p. 702.*
In Dania, Monſtrelii mariimisi ☉.
 Planta ſucculenta, ramis incurvis.
9. *polyclonos*. S. ſublignola, diſſuſa: fol. oblong. calyc. marginat. glomeratiſis, colorat. *Syſt. veg. ed. 14.*
 Anthylloides &c. *Bocc. muſ. 2. tab. 34.*
 Pedicularis &c. *Barr. rar. tab. 275.*
In Sicilia, Hiſpaniæ mariimisi.
 Caul. ramiſſiſſ. diſſuſus. Fol. mutica, carnoſa. Fl. axill. & terminal. glomerati, ſeſſil. Cal. infundibuliſ. 5-part. membranac. limbo parvo, plano, colorato.
10. *proſtrata*. S. fruteſc. fol. linearibus, piloliſis, inermibus. *Syſt. veg. ed. 14. Jacq. Auſtr. 3. tab. 294. Pall. it. 1. tab. C. Gmel. Sib. 3. tab. 18. f. 2. & 19. f. 1. & tab. 20. Buxb. cent. 1. tab. 15. & tab. 11. f. 2.*
 Chenopodium *Auguſtanum*. *Allion. Fl. Ped. tab. 38. f. 4.*
In Aſia boreali, Hiſpania, Sibiria, Auſtria, Helvetia &c. h.

Ad Chenopodium spectat. Caul. pl. sub 2-ped. prostrati, vel ascendent. inferne virent. superne sanguinei. Fol. sessil. crassula, molli, glauco-virentia. Fl. parvi, pauciq. aggregati, axillar. longe spicati. Cal. hirsutus.

11. *vermiculata*. S. frutesc. fol. ovatis, acutis, carnosus. *Syst. veg. ed. 14.*

Kali geniculatum &c. *Barr. rar. tab. 215.*

In Hispania h.

Caul. multi, breves, basi varie divisi, tortuosi, depressi. Rami confusiles. Fol. sparsa, breviora, linear. inermia. Fasciculi fol. axillar. Bract. sub singulo fl. 3. Fl. spicati, sparsi, alterni, sessil.

12. *fruticosa*. S. fruticosa, erecta: fol. filiformibus, obtusiuscul. *Syst. veg. ed. 14.*

Chenopodium &c. *Duham. arb. 1. tab. 62.*

Kali species &c. *Bauh. hist. 3. p. 704.*

Chamaepithis &c. *Lob. ic. 381.*

In maritimis Gallix, Hispania, Persia &c. h.

Ad Chenopodii genus spectat. Caul. erecti. Fol. teretia, supra planiusc. carnosia, glabra. Fl. axillar. 3. sessil. Cal. subrusesc. concavus. Anth. flavæ. Styl. 3. purpur.

13. *muricata*. S. fruticosa, parula; ramulis hirsutis: calyc. spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

S. monobracea. *Forsk. Æg. Vahl.*

Bassia muricata. *Allion. aliis 177. tab. 4. f. 2.*

Chenopodium &c. *Buxb. cent. 3. tab. 49.*

In Europa australi, Ægypto h.

Planta valde ramosa. Caul. erectus, pilosus, cinereus. Fol. sessil. linearia, compressa, subcarnosa, hirsuta, cinerea. Fl. axillar. sessil. Calyc. bini, congesti.

14. *laniflora*. S. suffrutic. erecta: fol. obtus. carnosus: anth. coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

S. sedoides. *Pallas. it. 1. tab. M. f. 1. 2.*

S. lanata. *Pall. it. 2. tab. P.*

In Dauria humidis salsis.

Caul. 2-ped. iunior lanuginos. sed circa fructificationem nudus. Fol. teretia, parcius lanata. Fl. axill. terni, flavi. Anth. rosæ, qua nota statim dignoscitur.

15. *arborescens*. S. frutescens: fol. semicylindric; inferioribus coniugatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Sibiria h.

G iij

- Caul. ascendent. albi. Fol. lævia; *super. alterna. Spica terminalis. Calyc. scariolo-rosacei.
16. *aphylla*. S. fruticosa, subaphyll. ramis florulorum rudimento coopertis. *Syst. veg. ed. 14 Lin. Suppl. Ad cap. 5. Spei h.*
 Altitudo humana. Frutex valde inæqual. Fl. sessil. limbo expanso, membranac.
-
- arbuscula*. S. *Pall. it. 1. tab. G. f. 1.*
In Dauria h.
 Frutex sub-ped. diffusus, asperrimus, rigidus, valde ramosus. Fol. fasciculata, obtusa, inferne attenuata, teretia, carnosæ, decidua. Fl. 1-2. ex una gemma. Calyc. fructus flavescens, raro rubicundus.
- hyssopifolia*. S. *Pall. it. 1. tab. H. f. 1.*
In Dauria ☉.
 Caul. cubital. & ultra, erecti, parum lanuginosi. Rami crebri, alterni, patentes, subsimpl. magis lanuginosi. Fol. alterna, oblongo-linear. plana, lanuginosa. Fl. axill. glomerati, lanuginosi.
- monandra*. S. *Pall. it. 3. tab. 1. f. 1. A. B. C. D. d.*
In Dauria ☉.
Facie, & fl. triglumis, monandris a congeneribus differt.
 Caul. digital-cubital. erectus; in planta min. subsimpl: in maiore ramosissim. Fol. radical. bina, obtusa, cylindrica, carnosæ; reliqua teretia, *Sulicornis* instar, succulenta, glauca, alterne ramosa. Maturescente semine tota planta evadit pallida, & exsucca.
- longifolia*. S. fruticosa, prostrata: fol. teretibus, inermibus, glabris, farinosis. *Forskul. Æg.*
In Ægypto h.
 Fol. opposita, longa, linear. tereti-subtrigona, aculeata, carnosæ. Fl. conferti, sessil. tribracteati, limbo lato, atro-rubente.
- articulata*. S. caul. fruticoso, decumben. aphyll: ramis floriferis, articulatis: fl. opposit. ad apicem articulorum. *Forsk. Æg. tab. 8. A.*
In Ægypto h.
 Caul. olivaceo-cinereus, teres, inæqual. Rami, & ramuli oppositi. Fl. sessil. Cor. pallide rufa.

mucronata. S. fruticosa, ramulis mucronatis: fol. subulatis, inermibus. Forsk. *Æg.*

In Ægypto.

Caul. antitufus. Rami patentes, mucronato-albidi. Fl. axillar. & ramei, conferti, alterni, sessil. tribracteati. Cal. corolliform. limbo magno, violac.

inermis. S. fruticosa, aphylla, ramis inermibus: bracteis farinoso-villosis. Forsk. *Æg. tab. 8. B.*

In Ægypto h.

Caul. procumbens. Rami diffusi, conferti, alterni, villosi. Fl. lateral. sessil. in ramis viridibus alterni, tribracteati. Bractæ orbiculato-acumin. Fl. plurimi. Petal. viridia.

imbricata. S. fruticosa, diffusa, inermis; ramis villosis, ramulis imbricat: bracteis obtusis, nudis. Forsk. *Æg. tab. 8. C.*

In Ægypto h.

Differt a priore caul. diffuso: ramis ripidis, tomentosis: bracteis obtusis, nudis, imbricatis: fl. rosaceis.

tetrandra. S. fruticosa, decumb. inermis: fl. opposit. brachiatis, tetrandris. Forsk. *Æg.*

In Ægypto.

Fol. tomentosa, opposita, sicuti & rami. Fl. omnes tetrandri.

381. ANABASIS. Cal. 3-phyll. Cor. 5-petal. Bacca 1-sperm. calyce cincta.

1. *aphylla*. A. aphylla, articulis emarginatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Salsola &c. *Gmel. Sib. 3. tab. 18.*

Kali &c. *Buxb. cent. 1. tab. 18.*

Ad maris Caspii litora, & circa Tripolin. h.

Simil. Ephedra. Caul. semiulnar. brachiati: rami, & ramuli binati, articulati. Fl. oppositi, sessil.

2. *foliosa*. A. fol. subclavatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Kali &c. *Buxb. cent. 1. tab. 19. f. 1.*

Ad maris Caspii litora ☉.

Caul. semiped. plus, minus ramosi. Fol. apice obtruso, & quasi abscisso parvam clavam referentia, succulenta, subglauca, alterna, & ternata; quorum duo lateralia min. cincta floscul. luteis. Bacca rubra.

3. *Tamarisci-folia*. A. fol. subulatis: pericarpis exsuccis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania h.

Frutex ramulis albis, glaberrim. Fol. triquetra, Tamarisci. Fl. axillar. subspicati, solitarii.

4. *Spinosissima*. A. frutescens; ramis nudis, spinosissim. , *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Habitat

Caul. lævis, ramosiss. Fl. circum spinas pl. conferti, sessiles, tenaciter adhærentes. Petala hyalina, vix calyce longiora. Semen cochleatum, vesica peliucida cinctum.

cretica.

A. *Pall. it. 1. tab. K.*

In Dauuria h.

Caudex curiosissim. crassus, strigosus, per ætatem multipartitus, furculis deciduis verrucosus, acetabulis albidis. Surculi sesquipollic. conferti, simplic. erecti. Articuli oblongo-cylindrici, succulenti, virides, per ætatem rubri. Surculi raro fr. fructificantes, & tunc 1-fl.

382. *CRESSA*. Cal. 5-phyll. Cor. tubulosa, inferne ventricosa, 5-fida. Filam. tubo insidentia. Caps. 2-valv. 1-sperma.

1. *cretica*. C. (cor. imberbibus: capsul. 1-spermis). *Syst. veg. ed. 14.*

Anthyllis. Alp. exo. tab. 156.

Lyfimachia &c. Pl. k. alm. tab. 43. f. 6.

C. indica *Retz. Obs. fasc. 4. differt cor. niveis, extus pilosis. Cc. 3f. 4-sperm.*

In Cretæ litoribus salsis; Romæ ad ostia, & in agro Nicæensi ☉.

Planta parva, humifusa, incana. Caulic. dorant. ramosi, subrubentes. Fol. minima, alterna, sessil. ovata, vel lanceol. Fl. inter fol. pusilli, ex albo-purpureo.

arabica.

C. fol. ovato-oblong: sessilibus, villosis: caul. fruticoso. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Caul. spitham. glaber. Fol. semipollic. alterna, obtusa cum mucronulo, patentia, plana. Peduncul. axill. filiform. solitarii, patentes, 1-fl. Cor. diametro semipollic.

383. *STERIS*. Cal. 5-part. Cor. rotata. Bacca 1-locul. polysperma.

1. *javana*. *S. Syst. veg. ed. 14.*
Nama zeylanica. Syst. veg. ed. 13.
In India 24.
Facies Capsici minoris. Caul. herbac. ramosiss.
 lævis. Fol. alterna, petiol. ovali-oblong. acu-
 tiuscul. integerr. lævia. Pedunc. nunc opposi-
 tifol. nunc axillar. nunc terminal. subdivis.
 aut 1-fl. Cor. cœrul. magnitudine *Capsici*.
384. GOM-
 PHRENA. Cal. coloratus, exterior 3-phyll: foliol. 2. con-
 niventibus, carinatis. Petal. 5. rudia, villo-
 sa. Nectar. cylindric. 5-dent. Styl. semi-2-fid.
 Caps. 1-sperm.
1. *globosa*. *G.* caul. erecto: fol. ovat-lanceol: capitul. foli-
 tar. pedunc. 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14.*
Amaranto &c. Breyn. Cent. tab. 51. Comm. hort.
1. tab. 45.
Flos globosus. Rumph. amb. 3. tab. 100. f. 2.
Wadapu. H. mal. 10. tab. 37.
In India ☉.
 Caul. 2-ped. ramosus, pilis brevibus obsitus,
 genicul. purpur. longioribus. Fol. opposita,
 quandoq. plura simul ad ramorum divaricatio-
 nes, superior. brevius petiol. subtus dilute
 virescentia. Fl. terminal. in summis ramulis,
 squamis bicomposit. nitentibus, albis, purpu-
 reis, variegatis: floscul. stelliform. albicant.
2. *perennis*. *G.* fol. lanceolat: capitul. diphyll: flosculis peri-
 anth. proprio distinctis. *Syst. veg. ed. 14.*
Amaranthoides. Dill. elth. tab. 20. f. 22.
In Bonaria h.
 Caul. sub 2-ped. sublignosus, incani, ramul. axil-
 laribus. Fol. opposita, col. prioris. Fl. ter-
 minal. verticillati, pallide flavescent. Cal. al-
 bus. Petal. 2-fid. Nectar. coccineum.
3. *hispida*. *G.* caul. erecto: fol. crenat. capitul. 2-phyll.
Syst. veg. ed. 14.
Nin-angani. H. Mal. 9. tab. 72.
 Caul. sesquicub. lignosus, pilis albidis obsiti,
 ramis decussat. Fol. parva, opposita, oblong.
 angusta, mollia, tenuia, pilis raris obsita.
 Capitul. terminal. oblongo-rotunda. Fl. pri-
 mum candidi, dein cœrulescent. Sem. albo-ni-
 gricant.
4. *brasiliensis*. *G.* caul. erecto: fol. ovat-oblong: capitul. pe-
 dunculat. globosis, aphyllis. *Syst. veg. ed. 14.*

Amarantho &c. *Breyn. cent. tab. 52.*

In Brasilia.

Fol. sessilia. Capitul. terminal. parva.

5. *ferrata*. G. caul. erecto, brachiato: capitul. terminalibus, solitariis, sessilibus: calycibus ferratis. *Syst. veg. ed. 14.*

In America.

6. *interrupta*. G. caul. erecto: spica interrupta. *Syst. veg. ed. 14. Murray. Comm. Gott. 1782. tab. 5. Heritier. Stirp. nov. tab. 3.*

Celosiâ procumbens. *Jacq. fascic. 2. tab. 60. moment. Heritier. l. c.*

In America.

Caul. nonnulli, a basi ramosi, prostrati, mox erecti, flexuosi, articulati, nodis gibbosis, superne sensim remotis, 1-fesquicubital. Rami oppositi. Fol. opposita, inferne adproximata, superne sensim remota, tandem remotissima, subsessil. ovat-lanceol. argute acumin. integra, nervosa, 1½ pollic. longa, 10. lineas lata, sericeo-tomentosa, præsertim subtus. Infera valde min: caulina sensim ma: summa interdiu duplo longiora. Spica terminal. erecta, longe peduncul: 6. pollic. longa, composita, articulata, lanata. Spicul. opposit. sessil. inferne remotæ, superne sensim adproxinatæ, 6-8. lin. longæ, 4-fariæ, lanatæ, bracteatæ.

7. *flava*. G. pedunc. oppositis, 2-fid. tricapitatis; capitulo intermedio sessili. *Syst. veg. ed. 14.*

In vera Cruce.

Planta scandens. Fol. *Lychnidis*, glabra. Capitul. globosa, flavescentia.

8. *arborescens*. G. arboresc. subvolub. pilosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Granada.

Planta a congeneribus valde diversa, tamen genuina. Caul. simpl. Fol. opposita, breviter petiol. ovalia, obtusa, coriacea, integerr. Capitulum bracteatum, magnitudine fructus *Juglandis*. Floscul. innumeri, sessil.

385. BOSEA. Ad polygamas est relata.

386. ULMUS. Cal. 5-fid. Cor. o. Bacca exsucca, compresso-membranac. ovalis. Sem. 1.

1. *campestris*. U. fol. duplicato-ferrat. basi inæqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 632. Lob. ic. 2. p. 89. Dod. pempt. 837.*

Olmo. *Matth.*

In Europa h.

Arb. procera. Fol. alterna, petiol. oblonga, scabruſc. vel glabra; interdum variegata, longiora, lata, anguloſa, calyculata.

Ulmum campeſtre, *ſcabram*, *ſativam*, *hollandicam*, & *min.* *Mill.* ſub *Uimo campeſtri* comprehendit *Linn.* ſed ut ſpecies diſtinctæ conſiderandæ ſunt, cum cultura non mutant faciem.

Du Roi. harph. 2. pag. 495.

2. *americana*. U. fol. æqualiter ſerratis, baſi inæqualibus. *Syſt. veg. ed.* 14.

In Virginia h.

Differt a priore fol. ſimpliciter ſerratis; & fructu margine pubeſcent.

3. *pumila*. U. fol. æqualiter ſerratis, baſi æqualibus. *Syſt. veg. ed.* 14.

In Sibiria h.

Arbuſc. pumila, Fol. parva. *Var. caulibus erectis, & procumbentibus.*

387. NAMA. Cal. 5-phyll. Cor. 5-part. Capſ. 1-locul. 2-valv.

1. *zeilanica*. N. caul. erecto, glabro: fol. linearibus: fl. racemoſis. *Syſt. v.g. ed.* 14. *Linn. Fl. Zeyl. tab.* 2. *Alline &c. Pluk. alm. tab.* 130. f. 2.

In India ☉.

Caul. ſemiped. herbac. ramoſus. Fol. alterna, petiol. integerr. glabra. Racem. axill. ſimpl. erecti. Fl. alterni.

2. *jamaicensis*. N. caul. decumbent. fol. ovat. fl. ſolitar. *Syſt. veg. ed.* 14. *Brown. Jam. tab.* 18. f. 2.

In Jamaica.

Planta villoſa. Fol. petiol. apice ſubrotun. Fl. axillar. Cor. 1-pet. cylindrica, 5-crenata; longitudine calyc.

388. HYDRO- Cal. 5-phyll. Cor. rotata. Filam. baſi cordata. LFA. Capſ. 2-locul. 2-valv.

1. *ſpinosa*. H. *Syſt. veg. ed.* 14. *Aubl. Guian. tab.* 110.

In Amer. merid. 24.

Caul. lignoſi, erecti, 3-ped. ramis alternis, Fol. alterna, ſubſeſſil. lanceol. ſubundul. pubeſcent. viſcoſa. Spinæ axillar. patent. Fl. terminal. pauci, ſubſeſſil. corymboli, conferti. Cor. cœrul.

389. SCHRE- Cal. 5-part. Cor. infundibuliſ. Filam. in fauce cor. BERA. ſquamis totidem bifeis.

1. *ſchinoides*. S. *Syſt. veg. ed.* 14. *Nov. ad. Uſſ. 1. tab.* 5. f. 1. *Ad cap. b. Spei* h.

Caul. suffruticos. ramis determinate ramosis, teretiuscul. tomentos. nodosis, cicatricibus a casu foliorum. Fol. conferta, alterna, lanceol. nitidiusc. serraturis ad apicem 3-5. petiol. brevissim. subtomentos. Pedunc. conferti, plurimi ex eodem puncto ad basin ramorum, filiform. longiss. ramosi. Fl. albi.

390. HEUCHERA. Petal. 5. Caps. 2-rostris, 2-locul.

1. *americana*. H. scapis subnudis: thyrsis elongato: fol. radicalibus longe petiolat. bis acute crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cortusa &c. *Herm. parad. tab. 131.*

Sanicula &c. *Pluk. alm. tab. 58. f. 3.*

In Virginia 24.

Scapus sesquiped. Fol. lobata; quandoq. fol. caulinum, etiam lobatum. Racemus ramis dichotomis, alternis. Cor. squallide purpur.

2. *dichotoma*. H. caul. ramoso: fol. opposit. linearilanceol. integris, caulinis: pedunc. axillaribus 2-fl. *Syst. veg. ed. 14. Comment. Gottin. 1772. tab. 1.*

391. VELEZIA. Cal. filiform. cylindric. 5-dent. Cor. parva, 5-petal. Stam. etiam. 6. Caps. 1-locul. cylindrica, polysper. Sem. serie simpl.

1. *rigida*. V. *Syst. veg. ed. 14.*

Knave. *Buxb. cent. 2. tab. 47.*

Lychnis &c. *Barr. rar. tab. 1018. 1017. Bocc. mus. 2. tab. 43.*

In Europa australi ☉.

Caul. sesquipalm. ramosiss. duri. Fol. connata, subulata, integerr. pilosa. Fl. axillar. solitar. sessiles. Cor. limbus minimus, ad basin notatus lunula purpur. ut in Caryophyllæis. Stam. quandoque 6.

392. SWERTIA. Cor. rotata. Nectariferi pori ad basin lacin. cor. Caps. 1-locul. 2-valv.

1. *perennis*. S. cor. sfid. fol. radicalibus ovalibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 243.*

Gentiana &c. *Barrel. ic. 91.*

Gentiana XII. *Clus. hist. 1. pag. 316.*

In alpinis Italiae, Helvetiae, Germaniae &c. 24.

Caul. subped. subpaniculat. rufescens. Fol. nervosa, integerr. glabra, nitide virent. inferior. obverse ovata, obtusa, petiol. super. opposita, sessil. acuta. Fl. racemosi. Cor. plana, patens, caerulea punctulis nigris adpersa.

2. *difformis*. S. cor. 5-fid. terminali 6-fid. pedunc. longissim. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
 Pedunc. oppositi, nudi, 1-fl. Cor. alba.
3. *rotata*. S. cor. 5-fid. fol. lanceol.—linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 52. f. 2.*
In Sibiria, Islandia.
 Caul. 2-unc-femiped. ramosi, genicul., multifi. 4-goni. Fol. remota, sessil. utrimq. glabra. Fl. cœrul. speciosi.
4. *carinthiaea*. S. cor. 5-fid. caulibus 1-fl. basi foliolosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 2. tab. 6.*
In Carinthia.
 Planta glabra, subnitens. Caulicul. 1-pl. Fol. ad radicem per binas coniugationes opposita, sessil. ovat-obl. aut lanceol. & obrusa, integerr. patentia. Caul. 2-3-pollic. ex tereti-subancipites, supra fol. atrocœrulei. Flos terminalis, magnus ratione plantæ, aure efflorescentiam globosus. Cor. patens, laciniis lanceol. integerr. supra cœlestino-cœrul. extus primo sature violac. tum ex cœrul-virentibus, fauce nectarifera. *Raro una pars num. in fl. deficit.*
5. *corniculata*. S. cor. 4-fid. quadricornibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 4.*
In Sibiria, Canada ☉.
 Caul. dodrant-ped. angulosi, striati, non raro intorti. Fol. sessil. 3-nervia, læte virid. extremo caul. plerumq. 6. Fl. axillar. peduncul. pyramidis quadratæ forma, e viridi, & luteo-albent. subclausi, singula lacinia non procul a fundo calcarata. Interdum planta ramosa.
6. *dichotoma*. S. cor. 4-fid. ecornibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 3.*
In Sibiria ☉.
 Caulic. pl. ad exortum rubentes, sæpe erecti, 2-3-geniculati. Fol. oblonga, lariuscula, longitudinaliter venis distincta. Pedunc. axillar. ramosi, pedicell. incurvis. Petal. sæpe albo-lutescent.
393. GEN-
 TIANA. Cor. 1-petal. (varia). Caps. oblonga, conica 2-valv. 1-locul. Receptaculis 2. longitudinalibus. *Fol. simplicia, opposita, glabra.*

* Cor. 5-fid. & sub 5-fid. campaniformibus.

1. *lutea*. G. cor. sub 5-fid. rotatis, verticillat. calycibus spathaceis. *Syst. veg. ed. 14. Subb. hort. 1. tab. 12. Burr. ic. 63.*
Asterias. Renal. tab. 63.
Genziana maggiore. Menth.
In alpinis Helveticis, Norvegicis, Apenninis &c. 24.
Radix extus nigra, intus flavescens. Caul. 2-cubital. Fol. Planaginea, amplexicaul. ovata, nitida, subtrus nervosa. Fl. dense verticill. peduncul. Cor. rotata, flava, punctis sparsis, creberrimis.
2. *purpurea*. G. cor. sub 5-fid. campanulat. verticillat. calyc. truncatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 50. Jacq. Obs. 2. tab. 39. Mont. in Zann. tab. 82.*
In alpinis Helveticis, Pyreneis, Norvegicis &c. 24.
Radix flava. Caul. vix 2-ped. Fol. palmat. ovata, lanceol. nervosa. Verticilli 2. in supremis alis. Cor. tubo viridi-luteo; limbo purpur. rubent. albo, aut obsoleto col.
3. *campanulata*. G. cor. campanulat. 7-fid. striatis, immaculat. calyc. 7-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 29.*
In alpinis Carniolæ 24.
Caul. 2-spitham. atro-cœrul. Fol. similia G. pannonicæ; magis acumin. quam in G. punctata, nervis subtrus 5-7. Fl. verticilli 2-3. Fl. axill. subsessil. 1-3. Cor. magna, sulphur. col. Gut-tigummæ, tota nitens.
4. *punctata*. G. cor. sub 5-fid. campanulat. punctatis; calyc. 5-dentat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 28. Obs. 2. tab. 39.*
In Helvetiæ, Italiæ, Austriæ &c. alpinis 24.
Differt a G. pannonica fol. magis ovatis, stric-tioribus; calyc. magis pelvisformi; cor. subtiliss. ex viride straminea.
Petala purpur. punctis sparsis, vel lutea. Solo fl. col. differt a purpur. Var. cor. 6-fid.
5. *pannonica*. G. cor. campanulat. 6-7-fid. punctatis; calyc. sub 6-fid. fol. caulinis lanceol. acuminat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 136. Fl. Carn. cum fig.*
In subalpinis, & alpinis. 24.
Simil. G. purpureæ, sed flos min. & diversi col. fol. caulina ovata, & acutiuscula, numquam in acumen elongata.

Cor. magna, atro-purpur. punctis saturationibus.

6. *asclepiadea*. G. cor. 5-fid. campanulat. oppositis, sessilibus: fol. amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 328. Knorr. del. 1. tab. E. 4. Barr. ic. 70.*

Dafylephana, Reneal. tab. 68.

In Helvetiæ, Italiæ &c. alpinis 24.

Caul. 1-2-ped. Fol. cruciatim posita, ovat-lanceol. Fl. axillar. Cor. cœrul. vel alba. *Var. cor. 6-fid.*

7. *pneumonanthe*. G. cor. 5-fid. campanulat. opposit. pedunculat. fol. linear-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 269. Lob. ic. 309. G. IV. Clus. hist. p. 313. Barr. ic. 51. 52.*

In Europæ pascuis humidiuscul. 24.

Caul. cubital. vix ramosus, fuscus. Fol. quandoq. ellipt. vel obrusa, pallide virent. Fl. axillar. sessil. solitar. Cor. magna, cœrul.

8. *saponaria*. G. cor. 5-fid. campanul. ventricos. verticillat. fol. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 186. f. 1. Moris. hist. 3. f. 1. tab. 5. f. 4. Cutesb. car. 1. tab. 70.*

In Virginia 24.

Fol. *Saponariæ* simil. 2-unc. long. semiunc. lata. Cor. ampla, inflexa, ochroleuca.

9. *villosa*. G. cor. 5-fid. campanul. ventricos. fol. villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia 24.

Fol. oblong. acumin. leviter pilosa. Cor. extus pallida, intus lineato-varia.

10. *acaulis*. G. cor. 5-fida, campanul. caulem excedente. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 135.*

Gentianella &c. Bucc. mus. tab. 6. Lob. ic. p. 310.

Icones Barrel. 105. 106. 110.

- b. *Thylacitis, Reneal. Sp. tab. 68.*

In alpinis Italicis, Helveticis &c. 24.

Flos tota planta maior. Caul. 1-2-unc. Fol. sessil. ovat-lanceol. firma. Flos terminal. solitar. sessilis. Cal. atro-virens. Cor. satore purpur. intus pallidior.

11. *nana*. G. cor. 5-fida, campanul. in fauce barbata: fol. caulinis ovat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. misc. 1. tab. 18. f. 3.*

In Carinthiæ alpinis &c. 24.

Fol. radical. quaterna ex 2. oppositionibus, & summa in tellure in rosulam parentia oriuntur:

suntq. obovata, in petiolum veluti decurrent. integerr. glabra, plana, læte virent. Caul. subsemipollic. erecto-procumb. virid. aut nigro-cœrul. genicul. 3-4. sæpe torus veluti in cespitem absorptus, 1-2-raro 3-fl. Fol. caulina opposit. sessil. ovata, integerr. plana, viridis graminei. Cor. fature violac. seu cœrul. tubuloso-campanul. limbo 4-5-fid.

12. *exaltata*. G. cor. 5-fid. coronatis, crenatis: pedunc. terminal. longiss. dichotomo. *Syst. veg. ed. 14.* Centaurium &c. *Plum. ic. 81. f. 1.*

In America ☉.

13. *decumbens*. G. cor. 5-fid. campanulat. caul. decumbent. fol. radicalibus longiss. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.* Lin. *Suppl. Gmel. Sib. 4. tab. 51. A.*

In Sibiria ♀.

Primo intuitu similis G. pneumonant. sed caules decumbent. Fol. radical. trinervia; caulina parce linear. Caul. spitham. filiform. Fl. subverticill. sed inferiores ramulis elevatis. Cal. latere super. dehiscens. Cor. cœrul.

14. *saxosa*. G. cor. 5-fid. campanul. fol. spatulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. Holm. 1777. tab. 5.* *In nova Zeylandia.*

** Cor. 5-fid. & sub 5-fid. infundibulif.

15. *vena*. G. cor. 5-fid. infundibulif: caulem excedente: fol. radical. confertis, maioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Gentianella &c. *Clus. hist. 315. Bauh. hist. 3. p. 527.*

Ericoila. Reneal. sp. tab. 68.

In alpinis Italiae, Helvetiae &c. 24.

Primulae propior, vix amara. Caul. 2-unc. semper 1-fl. Fol. semi-amplexicaul-canalicul. opposita, & cruciata, ovat-lanceol. nervosa, ad 6-paria, in terra sibi vicina; deinde paria 3-2. caulina distantia, & supremum calyc. vicinum, sed etiam unicum. Cal. 5-tapetus. Cor. crenulata, fature cyanæa. Stigm. 1. magnum, orbiculare, scutellato-concavum.

16. *pyrenaica*. G. cor. 10-fid. infundibulif. æquali, lacin. exterioribus rudioribus. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. 7. tab. 2. f. 2.*

In Pyrenæis 24.

Simill.

Simill. G. verna, sed. cor. non 5-fid. sed æqualiter 10-fid. lacin. obtusis, exterioribus subtus viridibus: omnibus intus cœrul. Fol. linear. seu lineari-lanc. Caul. procumb. ramis erectis, 1-fl. flore longitudine rami.

17. *pumila*. G. cor. 5-fid. infundibul. subferrata: fol. lanceol-linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 302. Obs. 2. tab. 49.*

In alpinis Austriae &c. 24.

Caul. 1-fl. Cor. vix ferrata. *A G. verna non differre videtur nisi fol. angustioribus.*

18. *bavarica*. G. cor. 5-fid. infundibulif. ferrata: fol. ovat. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 71.*

Gentianella &c. Comm. rar. tab. 15. f. 2.

In alpinis Helvetiæ, Baviaræ, Sæviæ &c. 24.

Fol. obtusa, nec ut in G. verna, acuta.

Fol. radical. humifusa. Caul. triental. & ultra, sæpe prostratus. Fol. 8-10. paria. Cal. sæpe violac. Cor. limbo ovato, cœlessi, vel albo.

19. *aurea*. G. cor. 5-fid: infundibulif. acuminatiff. fauce imberbi, muticæque: ramis opposit. *Syst. veg. ed. 14. Barr. ic. tab. 104. f. 1.*

In alpinis Burdegalensibus, & Lapponiæ ☉.

Caul. erect. spitham. Rami ad radicem pl. parvi, & lateral. oppositi valde erecti. Fol. radical. parva, ovata, glabra: caulina simil. maiora, sessil. obtusiusc. Fl. terminal. pauci, in capitulum. Cal. angust, subpedunc. Cor. limbo flavo.

20. *nivalis*. G. cor. 5-fid. infundibulif. ramis alternis, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 17. Hall. helv. 1. tab. 7. f. 5. Lob. adv. ic. 310. G. V. Clus. hist. p. 315.*

In summis alpinis Helvetiæ, Pannoniæ, Pyrenæis &c. ☉.

Caul. sæpe ramosus. Fol. radical. pauca, ovata, obtuse lanceol. caulina longiora ad 8-paria, ovat-acum. Cor. extus subvirid. intus sat ure cœrul. virore mixta, etiam alba.

21. *aquatica*. G. cor. 5-fid. infundibulifor. terminal. sessilibus: fol. margine membranaceis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 4. tab. 53. f. 1. Amm. ruth. 4. tab. 1. f. 1.*

In Sibiria ☉.

Tom. II.

H

- Caulic. 2-4-pollic. Fol. radical. 2. opposita, subrotund. acuta, crassiusc. non nervosa; caulina cruciata. Fl. terminal. solitar. Cor. intus dilute cœrulesc. & alba; extus e viridi, & cœrul. alba, fimbriis in medio fl. dilute cœrul. & albis: quandoq; tota alba. *In montanis ramosiss. fol. latioribus, plicatis.*
22. *utriculosa*. G. cor. 5-fid. hypocraterifor: calyc. plicato-carinatis. *Syst. veg. ed. 14. Colum. ecphr. tab. 221. Gentianella &c. Barr. rar. tab. 48. In alpinis Italix, Helvetix, Austriæ &c. 24.*
Caul. ramis 1-1½. dodrant. Fol. in rosam 4-gonam super terram congesta, ovat-acumin. caulina 7. & ultra paria, lanceol. Cor. extus subvirid. intus cœlestis; vel tota alba.
23. *exacoides*. G. cor. 5-fid. hypocraterifor: calyc. membrana-ceo-carinatis: caul. dichotomo: fol. cordat. *Syst. veg. ed. 14. Centaurium &c. Burm. Afric. tab. 74. f. 5. Pluk. alm. tab. 275. f. 4. Seb. mus. 1. tab. 22. f. 1. Ad cap. b. Spec. ☉.*
Caul. erectus, digital. simpl. angulosus. Fol. parva, perfoliata, 2-3. paria subrotund. lata, venosa. Flos amplus. Cor. lutea.
24. *Centaureium*. G. cor. 5-fid. infundibulif. caul. dichotomo: pistil. simpl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 617. Black. tab. 542. Sabb. hort. 1. tab. 99. Knorr. del. hort. 1. tab. 9. Vail. parif. tab. 6. f. 1. Erithræa. Renteum. tab. 76. Centaurea min. Matth. In Europæ apricis ☉.*
Caul. ped. ramosiss. 4-gonus. Fol. ima humifusa, trinervia, pallide virent. glabra: caulina sessil. ovat-lanceol. Stipul. breves, triangular. Fl. fere umbellati, rubelli, aut albi.
25. *pulchella*. G. cor. 5-fid. infundibulif. tubo elongato; stylo simpl. caul. simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1783. tab. 3. f. 8. 9.*
26. *8-flora*. G. cor. 5-fid. infundibulif. verticillat. (sæpe) octonis.
G. verticillata. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In India 24.
Caul. sublignos. vix palm. teres. Rami oppositi, simpl. compressi. Fol. opposita, subsessil. lanceol. lævia. Cor. fulva facie *G. Centaurii*.

Cum adfit alia G. verticillata, hanc 8-fl. nom. triviali dicendam duximus.

27. *maritima*. G. cor. 5-fid. infundibulif: stylis geminis: caul. dichotomo, paucifl. *Syst. veg. ed. 14.*

Centaurium &c. *Bocc. mus. 2. tab. 76. Barr. ic. 468. 469.*

In Italia, Gallia maritima ☉.

Simil. G. Centaurio, sed fl. pedunculati, lutei. Fol. uni-nec trinervia.

28. *spicata*. G. cor. 5-fid. infundibulif: fl. alternis, sessil. *Syst. veg. ed. 14.*

Centaurium &c. *Bauh. prod. tab. 130. Tabern. ic. 780.*

In Italia, & Monspelii pratis humidis ☉.

Caul. plerumq. unicus, subdodrant. Fol. opposita, *Hyperici* ma. Fl. terminal. albi, vel rubelli.

29. *verticillata*. G. cor. 5-fid. infundibulif: fl. verticillat: caul. simplicifl. *Syst. veg. ed. 14.*

Centaurium &c. *Plum. sp. ic. 81. f. 2.*

In America 24.

Planta Indiarum Or. vix diversa. Rad. perenn. Caul. pl. palmar. articul. Fol. lanceol. Fl. verticill. sessil. lutei, limbo acuto. Nectar. e squama subrotund. basi singuli filamentis, intra tubum cor. annexa. Stylus stigmate capitato. Capf. semibiloc.

30. *quinqueflora*. G. cor. 5-fid. infundibulif. caul. acutangulo: fol. ovatis, amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pennsylvania.

Planta magnitudine, & statura *G. amarella*. Caul: indivisus, 4-gonus, angulis membranac. Fol. acuta, 3-nervia. Pedunc. 5-fl. oppositi, Cal. breviss. angustus. Cor. subcœrul. limbo parvo, fauce pervia.

31. *scilloides*. G. cor. 5-fid. infundibulif. bract. binis: caul. 1-fl. prostrato, ramoso: fol. obovat. obtusis, trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Insulis Azoreis.

Planta ped. tenera, glaberr. ramis paucifl. Fol. parva, opposita, subpetiol: superiora remotiora. Pedunc. terminal. longus. Cor. limbo luteo.

32. *aphylla*. G. cor. 5-fid. hypocraterif: caul. aphylo. *Syst.*

veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 60. f. 3. ed. piñ.
tab. 89.

In Martinica sylvis montosis ☉.

Caul. parvus, 4-pollic. filiform. vix ramosus,
nitidus, 1-fl. Stipul. oppositæ, breviss. Flos
pollic. erectus, flavescens.

33. *Amarcl-
la*. G. cor. 5-fid. hypocraterifor. fauce barbatis.
Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 328.

In Europa pratis ☉.

Caul. spitham. ramosus, totus foliosus, com-
pressus, ruber. Fol. amplexicaul. ovat-acumin.
dura, glabra, nervosa, flavo-virentia. Pe-
dunc. multifi. Fl. magni, expansi, purpuro-
cœrul. vel albi. Cor. tubo calyc. duplo lon-
giore, limbo barbato, sine plicis.

*** Cor. non 5-fidis.

34. *campestris*. G. cor. 4-fid. fauce barbatis. Syst. veg. ed. 14.
Column. ecphr. 1. tab. 221. Barr. ic. 97. f. 2.
b. G. cor. 4-fid. &c. Fl. Dan. tab. 318.

In Europa pratis ficis ☉.

Caul. breves, ramosi, purpur. Fol. brevica, ses-
sili-amplexicaul. venosa, glabra, sature virent.
fusco tincla. Florai. lata, ovalia. Flos ma-
gnus, purpuro-cœrul. vel albus. Priori nimis
acutis, & forte var. aut hybrida.

G. *tenella*. Ad. Hassn. Vol. X. tab. 2. f. 6.
Caul. non 4-gonus, sed 4-alarus. Fol. magis
oblonga, minime basi soluta.

35. *ciliata*. G. cor. 4-fid. margine ciliatis. Syst. veg. ed. 14.
Fl. Dan. tab. 317. Jacq. Austr. 2. tab. 113.
Gentianella &c. Column. ecphr. 1. tab. 221. f. 1.
G. detonsa. Ad. Hassn. Vol. X. tab. 1. f. 3.
In Europa montibus, & Canada 24.

Caul. 2-8-unc. subdecumb. Fol. erecta, sessil.
linearilanceol. concava, firma, infima breviora.
Flos sessil. Cal. punctul. rubris. Cor. vel
satire violac. vel cœrul. Var. angustifol.

Fl. in America maxime ciliati; in Italia medio-
crier; in Islandia, & Norvegia tantum ferrati.

36. *Cruciata*. G. cor. 4-fid. imberbibus: fl. verticillat. sessil.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 372.

Tretorrhiza. Rencalm. Sp. tab. 73.

Gentiana minore Matt.

In Helvetia, Pannonia, & Apenninis 24.

Caul. ped. Fol. connata, lanceol. trinervia.
Fl. ex alis inferior. pauciores; ex apice caul.
confertiores. Foliol. 2. ad singulos florum glo-
merul. Cal. brevis, truncatus, dentibus re-
motis, brevibus. Cor. cœruleo-purpur.

37. *sessilis*. G. cor. 4-fidis: fol. ovatis: fl. acaulibus. *Syst.*
veg. ed. 14.

Gentianoides. *Fewil. peruw. 3. tab. 14.*
In Chil.

Caul. 2-pollic. Fol. 3-4. pollic. longa, 2. lata,
crassa, 5-nervia. Cor. lutea.

38. *filiformis*. G. cor. 4-fid. imberb. caul. dichotomo, filifor-
mi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 24.*

Centaurium &c. *Vaill. parif. tab. 6. f. 3.*
In Gallia, Dania ☉.

Caul. 4-unc. fuscus. Fol. lineari-lanceol. tene-
ra, glabra, pallide virentia. Fl. parvuli, lon-
ge peduncul. flavicantes.

39. *heterocli-* G. fl. 4-fid. irregularibus: caul. brachiato. *Syst.*
ta. *veg. ed. 14.*

In Malabarâ agris ☉.

Planta facie G. Centaurii. Caul. erectus, spi-
tham. dichotom. 4-gonus. Fol. opposita, ses-
sil. ovata, integerr. subcarnosa, glabra, in-
fer. subrotun. summa breviss. subulata. Fl.
sessil. solitar. in dichotomiis caul. purpur. Cal.
subincurvus, dentibus 4. subulat. Cor. tubo
longitud. calyc. limbo 2-part. lacin. 2-fid. 2.
superioribus erectis, 2. deflexis, externe pa-
tentibus. Stam. 4. inæqual. Caps. calyce bre-
vior.

- (*fimbriata*.) G. fl. solitar. longiss. peduncul. faucibus fim-
briat. *Hall. Helv. n. 652.*

In Helvetia.

Caul. cespit. 3-unc. 1-raro 3-fl. Fol. radical:
ellipt. lanceol: caulina 2-3. paria, ovat-lan-
ceol: floralia 4. lanceol. sublivida. Pedunc.
curvuli, qua nota solum a cæteris differt.
Cor. parva, plerumq. inaperta 4-5-fid. ciliata.

- Terglovensis*. G. *Hacquet Pl. alp. Carn. tab. 2. f. 3.*

In Carniola.

Habitus G. pumilæ, & acutis.

Planta glabra; inodora. Caul. sub-nullus: fi-
dest, erect. gracilis, subrotundus, 1-fl. Fol.

radical. alterna, sessil. 2-3. lineas longa, ovalia, integerr. pinguia. Fol. 2. ad cal. opposita, lanceol. subacuta. Flos pollicar. Cal. 4-linear. acuminat. 5-gonus. Cor. laciniis 5. rotundis, integerrim. cœrul. cum interiectis squamulis semi-2-fid.

394. VAHLIA. Ad. *Ruffelliam est relata.*

395. RUSSELIA. Cal 5-phyll. Petal. 5. supera. Caps. 1-locul. polysperm.

1. *capensis.* R. Syst. veg. ed. 14. Lin Suppl.

Vahlia capensis. Thumb. Dissert. nov. pl. gen. cum fig. Vahl.

Ad cap. b. Spei.

Planta statura *Silenes*, semi-vix 1-pedal. Caul. herbac. teres, enodis, inferne brachiatis. subpubescens. Fol. opposita, sessil. angustolanceol. subpubesc. Stipul. nullæ. Fl. ex summis alis 2-3. peduncul. lutei.

396. BUMALDA. Cor. 5-petal. Styli villosi. Caps. 2-locul. 2-rostris.

1. *trifolia.* B. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia h.

Caul. fruticos. dense ramosus, glaber. Rami geniculati, teretes, purpur. Ramuli oppositi, filiform. patentiss. foliosi. Fol. opposita, petiol. ternata. Foliol. unguicul. breviter petiol. ovat-acumin. tenuissime serrata, subtus pallida. Petiol. patentiss. vel reflexi. Fl. terminal. racemosi, pedunculis capillar.

397. PHYLLIS. Fructificat. sparsæ. Stigmata hispida.

1. *Nobla.* P. stipul. dentatis. Syst. veg. ed. 14.

Valerianella &c. Dill. elth. tab. 299. f. 386.

Bupleuroides &c. Walt. hort. 2. tab. 6.

In Canariis h.

Caul. fruticos. 1-2-cubital. superne ramosus. Fol. petiol. terna, longa, ovalia, integerr. nitidiss. lævia, venosa, supra saturæ, & pulchre virid. subtus pallidiora. Pedunc. paniculato-trichot. pedicell. 1-fl. Fl. pusilli, herbac. dein fusci. Fruct. turbinat-oblon. angulati.



* UMBELLATÆ.

398. ERYNGIUM. **F** L. capitati. Cal. commun. 5-phyll. foliol. longiss. acutis, rigidis. Petala introrsum flexa. Thalamus paleac. Sem. 2. latere plano contigua.
1. *foetidum*. E. fol. radical. lanceol. ferratis: floralibus multifidis: caul. dichot. *Syst. veg. ed. 14. Herm. Lugd. tab. 237. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 156. f. 3. 4.*
In Virginia, Jamaica, Mexico, Surinamo &c.
 Fol. radical. obtusiusc. ferraturis spinos. innocuis. Caul. pedil. patens, dichotom. tubangulat. viridis, ramis ultimis flexuosis. Fol. ramea opposita, amplexicaul. subconnata, cuneata, margine dentata, semitritid. lacin. lanceol. angulis spina purpurasc. terminatis. Peduncul. e dichotomia rectus, triangulus, lateribus striatis. Involucra horizontal. sub 6-phyll. foliol. spinosis. Flos cylindric. Petal. ex albida, involuta. Olor totius plantæ valde teter. *Decoctum antifebrile.*
2. *aquaticum*. E. fol. gladiatis, ferrato-spinosis: floralibus indivisis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 175. f. 4. Morif. hist. 3. f. 7. tab. 37. f. 21.*
b. Eryngium &c. Pluk. alm. tab. 369. f. 3.
In Virginia &c.
Facies, & fol. Bromeliæ min. sed hæc ciliata spinis capillaribus, flexilibus, minutis. Paleæ fl. maiores sunt. Involucra, & paleæ integerr.
 Caul. erectus, cubital. Fol. radical. pedal. canalicul. Capitul. plura, terminal. Fl. albi.
3. *planum*. E. fol. radical. cordato-ovat. planis, crenat. capitul. peduncul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 391. Knorr. del. hort. 1. tab. M. 5. Clus. hist. 2. pag. 158.*
In Russia, Polonia, Austria &c.
 Caul. sub 2-ped. albidus, superne plerumq. 3-fide ramosus. Fol. radical. petiol. obtusa; super. sessil. lobata, incisa, spinuloso-ferrata. Involucr. sub 6-phyll. Capitula, & petal. coerul.
4. *pusillum*. E. fol. radical. oblong. incis: caul. dichot. capitul. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. p. 158.*
In Hispania, Oriente.

Caul. subped. ramofus. Fol. humifufa: caulina multifid. ferrata, aculeata.

5. *tricuspidatum*. E. fol. radical. cordatis: caulinis palmat. auriculis retroflexis: paleis tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 74. Morif. hift. 3. f. 7. tab. 37. f. 13.*

In Hispania, Sicilia, Oriente &c.

Caul. valde paniculati, toti ramofi, ramis longiff. Fol. adultiora fupra albefcent. caulina breviff. amplexicaul. Fl. primum albi, dein cœrulefc.

6. *maritimum*. E. fol. radical. fubrotund. plicatis, spinofis: capitul. pedunculat. paleis tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 875. Cluf. hift. 2. pag. 169. Cam. epit. 448. Matth.*

Ad Europæ littora arenofa maritima &c.

Fol. carnofa, glauca. Fl. cœrulefc.

7. *campeftre*. E. fol. radical. amplexicaul. pinnato lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 155. Flor. Dan. tab. 554. Black. tab. 297. Cluf. hift. 2. p. 157. Eringio montano. Matth.*

In Europæ incultis &c.

Caul. 1-2-pedal. Fol. glabra, firma, ferrato-spinofa, flavo-virent. varia per ætatem. Capitul. fubrotunda. Cal. herbifus. Cor. albida. E. fol. radical. 3-fid. bafi fubpinnat. *Syst. veg. ed. 14. Besl. cysl. 3. 11. tab. 8. f. 4. Morif. hift. 3. f. 7. tab. 25. f. 2.*

8. *amethyftinum*. *b. Eryngium &c. Barr. ic. 36. Bocc. mus. tab. 71. In Styria &c. montibus &c.*

Fol. linear. femitrifid. Involuc. lanceol. capitulo longiora, bafi obvallata fetis fubulat. interiectis.

Var. b. minor, involuc. foliol. 3-fid. diftinda.

9. *alpinum*. E. fol. fuborbicul. digitatis, laciniat. capitul. oblong. polyphylo, paleis fetac. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. M. 4. Bauh. hift. 3. P. 1. p. 88. Lob. ic. 2. p. 23.*

Spina alba Dalech. hift. 1452.

In alpinis Italia, Helvetia &c.

Pianta nitida, cœrul. Caul. erect. cubital. capitul. folitar. Fol. 5-part. lacin. fubdichotom. fparfis, planis; inferior. longe petiol. fuprema amplexicaul. Calyx cor. longior, ariftatus. Petal. alba.

- Bourgati*. E. caul. fimpl. fol. ternatis, lacin. 2-3-part. re-

troflexis; rameis oppositis: receptac. paleis lanceol. integerr. *Gouan. Illust. tab. 3. f. 1, 2, 3.*
In herbidis.

An idem cum E. alpino? Differt ab E. tricuspido fol. digitat. biernat. non vero palmatis: paleis integerr. non tricuspido.

Caul. ped. & ultra, levissime striatus, glaber, apice præsertim cærulesc. Fol. primordial. petiol. ovata, apice dilatata, fere semi-3-fid. lobis 3-dentat. margine spinosis: subsequa digitata, 3-part. foliol. 2-3-fid. lacin. divaricat. decurrentibus, paululum squarrosis, aristat. fol. summa, & ramea plerumq. opposita, palmato-3-fid. minus laciniata. Involuc. exterius minus, subulat. interiora maxima, lanceol-linear. Cor. cærul.

399. HYDRO- Umbella simpl. parva, irregular. involuc. 4-phyll. COTILE. Petal. integra. Sem. femiorbiculato-compressa.

1. *vulgaris.* H. fol. peltatis: umbell. 5-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 90. Linder. Alf. tab. 12.*

Corydon &c. Lob. ic. 387.

In Europæ inundatis 24.

Fol. radical. longe petiol. orbiculat. subplicata, glabra, nitida, læte virent. Pedunc. radical. Umbel. simpl. e centro prolifera. Fl. albid. Styl. 2. distantes.

2. *umbellata.* H. fol. peltatis: umbel. multifi. *Syst. veg. ed. 14. Acaricoba. Pis. Bras. 90.*

In America.

Differt a priori scapo foliis duplo longiore; & floscul. pl.

3. *mericana.* H. fol. reniform. sublobat. crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Loeft. ii. 281.*

In Amer. & in India Or.

Facies H. vulg. Fol. antice sinu vix hiant, ad centrum usq. dissecta, margine in 9. lobos obfoletos divisa. Umbel. 5-fl.

4. *asiatica.* H. fol. reniform. dentato-crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Valerianella &c. Herm. parad. tab. 238.*

Ranunculo &c. Pluk. alm. tab. 106. f. 5.

Pes equinus. Rumph. amb. 5. tab. 169. f. 1.

Codagam. Hort. mal. 10. tab. 46.

In Jamaica.

Differt a priori crenis æqualibus: consistentia fol. duplo crassiore, & fere incana: petiol. pl. ad genicula caul. cum in priori fol. sint solitar.

5. *chinensis*. H. fol. linear. umbell. multifi. *Syst. veg. ed. 14. In China.*
Magnitudo priorum. Caul. repens. Fol. obtusa, plana, lævia, sæpius bina ad articulos. Scap. longitud. folii.
6. *villosa*. H. tomentosa; fol. cordat. integerr. tomentof. seu villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Radix fibrosa. Fol. petiol. *Viola odorata* simil. mucronata. Caul. prostrati, apice foliosi, floriferiq. Pedunc. ex apice caulium pl. filiform. 1-fl. Fl. parvi.
7. *glabrata*. H. glaberr. fol. obovat. seu lanceol. acutis, trinerviis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Caul. serpentes. Fol. alterna, petiol. stipul. linear. acumin. Fl. axillar. peduncul.
8. *virgata*. H. glaberr. fol. linear. semiteretibus, sulco exaratis, internodiis longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
9. *linifolia*. H. canescens; fol. lineari-subspathul. internodiis brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Simil. priori, sed fol. multo longiora: pedunc. longiores, tenuiores.
10. *Solandra*. H. tomentosa; fol. cuneiform. obovat. retusis, septemdent. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Planta tota incano-tomentosa. Radix caulescens, ramosa in superficie terræ. Caul. pollic. vix ramosi. Fol. alterna, petiol. Pedunc. laterales inferiores fol. Fl. receptac. atro-purpur. Petala alba.
11. *tridentata*. H. tomentosa; fol. lineari-cuneiform. apice 3-dent. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Simil. H. Solandra, sed differt caulib. breviorib. herbac. lanatis, nec lignosis, pollicar. prostratis: fol. linear. ad basin angustioribus, apice dentib. 3. aequalib. nec ovatis, 5-7. dentat. peduncul. fol. multo brevioribus.
 Flos centralis huic certe est hermaphrod.
12. *Ranunculoidea*. H. fol. 5-partit. incis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Mexico.

Caul. repens, genicul. Fol. 1-2. omnino Ranunculi. Scapi caulini pollicar. Umbell. simpl. Petal. alba.

13. *erecta*. H. fol. cordat. crenatis: scapis pauciss. longitudine petiolor. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. In Jamaica.*

Fol. pollic. obtusa: petioli spitham. apice piloso. Scapi erecti.

400. SANCULA. Umbellæ confertæ, subcapitat. Involuc. fere 5-phyll. trilobat. aut certe dentat. involucel. ex 5. foliol. lanceol. Sem. oblonga, hirta, & aspera, calyce proprio coronata.

1. *europæa*. S. fol. radical. simplicibus, trilobat. lobis lateral. 2-part. floscul. omnibus sessil. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 283. Sabb. hort. 4. tab. 100. Black. tab. 63. Riv. tab. 30.*

In Europæ sylvis montosis 24.

Caul. erecti, cubital. nudi. Fol. palmata, crassiusc. nitida, læte virentia; radical. longe petioli. foliola quina, ovali-lanceol. Umbellæ diffusæ. Fl. albidi. Sem. lappacea.

2. *canadensis*. S. fol. radical. compositis; foliol. ovat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia 24.

Simill. priori, sed decuplo maior. Fol. radic. plerumq. ternata, ferrata; lateral. 2 3-loba, facie *Astrantiæ*. Caul. 2-ped. & ultra, fol. oppositis, sæpe ternatis, sessil. lanceol. Pedunc. intra bifurcationem caul. longi. Fl. sessil. Sem. magna, lappacea.

3. *marilandica*. S. floscul. mascul. pedunculat. hermaphrodit. sessil. *Syst. veg. ed. 14.*

In Marilandia, Virginia 24.

Caul. & ramuli dichot. Fol. 3-fid. ferrata. Ex angulis divaricationum pedunc. uncial. apice fl. gestantes. Sem. lappacea.

401. AS-TRANTIA. Involuc. magnum, polyphyll. coloratum. Sem. non alata, quinque costata, sed membrana transversim plicata testa. Sem. si hac membrana, quæ facile separabilis est, exuantur, ad *Ligustici* sem. accedunt.

1. *maior*. A. fol. 5-lobis, lobis 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 83. Dod. pempt. 37. Black. tab. 470.*

b. A. min. *Meris. umb. 2. hist. 3. f. 9. tab. 4.*

Helleborus &c. *Bocc. rar. tab. 3. f. 3.*

In alpinis Italiae, Helvetiae, Pyrenaeis &c. 24.

Caul. cubital. Fol. radical. petiol. caulina plerumq. 2. sessil. Involuc. asteriforme.

2. *carniolica*. A. fol. 3-lobis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. app. tab. 10. Scop. Carn. 1. tab. 7.*

In Carniola 24.

Rad. odore aromatico, balsamico. Caul. semiped. & ultra, teres tere aphyllus. Fol. caulinum simplex, vel 3-lobum. Umbellarum num. 26. ad 20. Bract. exiguae, ovatae, obusae, pallidae. Involuc. foliol. 2-5. integris, vel 2-3-fid. Involuc. foliol. 6-12. integris, albis, cum linea virescente. Petal. ob apicem valde inflexum cordata, alba. Sem. oval. hinc glabra, & planiuscul. cinerea; illinc convexa, & muricata, albescunt.

3. *minor*. A. fol. digitat. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Carn. 2. tab. 7.*

Helleborus &c. *Bocc. Sic. tab. 6.*

In alpinis Italiae, Helvetiae &c. 24.

Differt ab A. ma: parvitate; foliol. distinctis, senis, novenis, longis, angustis, non trilobis. Involuc. semper album.

4. *ciliaris*. A. fol. lanceol. serrato-ciliat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Jasione capensis. Nov. Act. Upsal. Vol. 3. tab. 10. Ad cap. b. Spei 24.

Caul. erectus, ped. simpl. iunceus, substriat. apice divisus. Fol. laevia; radical. petiol. caulina 4-6. semiamplexicaul. Umbel. elongata, subtriradiata. Umbellul. breviss. multiradiatae. Involuc. 2-3-phyll. Involucc. subdecaphylla, lato-lanceol. acuta.

5. *epipactis*. A. fol. 5-part. obtusis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. Austr. app. tab. 11. Scop. Fl. Carn. tab. 6.*

In Carniola 24.

Fol. radical. semiped. petiol. rotundum, glabrum, subtus purpur. Caul. glaber, terminatus involuc. plerumq. 5-phyll. Huius foliol. sessil. obverse ovata, obtusa, supra medium serrata, pallide virid. Umbel. parva, densa. Petal. sublanceol. flava.

402. BUPLEU- Involucra umbellulæ maiora, (*si adsint*) 5-
RUM. phyll. Fl. æquales, flavi. Petala involuta.
Sem. in variis speciebus varia, oblong: ovata,
ovat-acum. costata, aut simpliciter striata. Fol.
in nostris simplicia, integerrima.

* *Herbacea.*

1. *rotundifolium*. B. involucris nullis: fol. perfoliat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 78. Black. tab. 95.*
Perfoliata. *Dod. pempt. 104. Riv. tab. 45. Matth. Inter Europæ australis segetes* ☉.
Caul. diffusus, ramosiss. Fol. ovat-lanceol. obtusa, integerr. firma, glaberr. nitida. Involucel. 5. ovata, mucronata, 3.ma: 2. min.
Var. humilis.
= crispa.
2. *stellatum*. B. involucell. coadunatis: involucro sub. 3-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Hall. Helv. tab. 18.*
In alpibus Helveticis &c. 24.
Caul. ped-cubital. Fol. radical. longiss. pedal. obtusa, vel lanceol: caulina vix ulla; nisi unum sub ramo, sessile, amplexicaul. Involuc. 8-9-fid. colorata, sloscul. longiora.
3. *petræum*. B. involucell. coadunatis; involucro 5-phyll. *Syst. veg. ed. 14.*
Sedum &c. Pon. bald. 247.
In alpibus Helveticæ, Baldi; in Sibiria 24.
Var. B. Ranunculoid. Rad. tuberosa. Caul. sub-nudus. Fol. sessil. linear.
4. *angulosum*. B. involucell. orbiculat. 5-phyll: involucro ovar. 3-phyll: fol. amplexicaul. cordato-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Vill. prosp. tab. 6. f. 5.*
In Pyrenæis &c. 24.
Var. B. Ranunculoid. Dignoscitur involuc. aristatis: universali 3-phyll. ovat-lanceol: partial. 5-phyll. ovali, longitudine umbellul.
5. *longifolium*. B. involucell. ovatis, 5-phyll. involucro sub 5-phyll: fol. amplexicaulib. *Syst. veg. ed. 14.*
Perfoliata. *Cam. hort. tab. 38.*
In Germania, Helvetia &c. 24.
Caul. cubital. simplex. Fol. longa; inferior. ex gracili petiolo in ovatam figuram dilatata, modice acumin.
6. *falcatum*. B. involucell. 5-phyll. acutis: involucro sub-5-phyll: fol. caulinais apice latioribus, falcatis:

caul. flexuoso. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 158.*

B. angustifol. Tabern. ic. 872.

Auricula &c. Bauh. hist. 3. p. 200. f. 1.

In Helvetia, Vallesia, Austria &c. 24.

Caul. cubital. totus paniculat. purpureasc. Fol. radical. longe petiol. petiolis compressis, foliac. semiped. obverse ovata, vel acuta: caulina sessil. quandoq. incurva, Umbellæ sature luteæ. Umbellul. sæpius 7. Involuc. sæpe 2-phyll. inæquale. Petal. lutea.

7. *odontites*. *B. involucl. 4-5-phyll. acutis: involucro 5-phyll. stofculo centrali altiore: ramis divaricat. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. app. tab. 91.*

Perfoliata &c. Column. ceph. 1. tab. 247.

In alpinis Vallesia, Italia &c. ☉.

Maius sequenti. Planta vix palmar. Caul. ramossil. angulatus, divaricatus, ramis basi nodosis. Fol. sessil. linear. acumin. Umbellæ 4-5-6-rad: interioribus minoribus Centralis umbella sessil. Petal. oblong. apice 2-fid. lutea. Involucel. æqualia, quod non in involucro.

8. *semicompositum*. *B. umbell. compolitis, simulque simplic. Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illuf. tab. 7. f. 1.*

In Hispania, Monspelii &c. ☉.

Adfine B. Odontiti, vix tamen var. Planta media inter B. Odontitid. & tenuissimum.

Caul. a basi ramossil. ut in priore, sed minores, Fol. ex lineari principio in ovatam, aut ellipticam formam desinunt, aristata, trinervia. Umbel. axillar. duplo ma: terminalibus: in singulis umbellis 5-6. flores. Involucel. viridia, striata, non transparent. Petal. longe min. priore, albicantia.

9. *ranunculoides*. *B. involucl. 5-phyll. lanceol. longioribus: involucro 3-phyll: fol. caulinis lanceol. Syst. veg. ed. 14.*

Perfoliata minor &c. Bauh. hist. 3. p. 199.

Perfoliatum &c. Park. theatr. tab. 338.

In Helvetia, Pyrenæis &c. 24.

Rad. repens. Caul. palm. simplex. Fol. graminea, stricta. Umbell. inæqualis. Involuc. breve, ovat. acutum, quandoq. 2-4-phyll. semper inæquale. Umbellul. parvæ, æquales,

longitudine involuicelli. *Cum B. anguloso coniungit Hall.*

10. *rigidum*. B. caul. dichotom. subnudo; involuicris minimis, acutis. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 633.*

Habitat Monspelii &c. 24.

Caul. 2-ped. Fol. omnia lanceol. nervosa, rigida, petiol. Involuc. 3-phyll. subulatum; involuic. fetacea.

11. *Gerardi*. B. caul. erecto, panicul. fol. lanceol-linearibus; involuicr. & involuicel. 5-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 256. Gerar. Gallo-Prov. tab. 9.*

In lapidosis, & ad vineas ☉.

An satis differt a B. iunceo? Caul. erectus, sub 2-ped. totus ramosus, ramis patulis. Fol. graminea, alterna, sessil. acumin. integerr. Umbel. peduncul. Involucr. foliol. 5-raro 3-4. inæqualibus. Involuic. 5-phylla.

12. *tenuissimum*. B. umbell. simplic. alternis, 5-phyll. sub 3-fl. *Syst. veg. ed. 14. Column. ceph. 1. tab. 247. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 4.*

In Italia, Germania &c. ☉.

Caul. pedal. decumbens, ramosiss. ramis alternis. Fol. linear. acuta, glauca. Involuc. breve, 3-phyll. Involuicel. brevia, fetacea. Umbellul. axill. parvæ. Petal. lutea.

13. *iunceum*. B. caul. erecto, panicul. fol. linear. involuicris 3-phyll. involuicel. 5-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 474.*

In Italia, Helvetia &c. ☉.

Differt a priore involuicel. brevibus. A. B. falcat. quod. veras umbellas non producat.

Caul. 6-ped. iunceus, flexuos. lævis, ramis alternis, erectis. Fol. graminea, bifaria, lævia, lactescentia. Involucr. lanceol. longitud. umbellæ. Involuicel. min. Umbella radiis 4. Umbellul. 5-6. fl. luteis.

**** Frutescentia.**

24. *fruticosum*. B. frutesc. fol. obovat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

Seseli æthiopicum. Dod. pempt. 312.

In Gallia austral. & Orientis saxosis maritimis &c.

Caul. 2-3-cubital. Petal. ex luteo-herbac.

15. *frutescens*. B. frutesc. fol. linear. involuicris utriusq. 5-phyll.

Caul. erectus, ped. dichotom. pene nudus. Fol. caulina fissil. lanceol-linear. Involuc. 5-phyllum, lanceol-latum, mucronat. 3-carinatum. Involucel. 5-phyll. umbella duplo longius.

403. ECHINOPHORA. Involuc. paucorum folior. involuc. monophyll. multifidum. Fl. radiati, petalis inæqual. Sem. fissilia, coronata in involucrio indurato.

1. *spinosa*. E. foliol. subulato-spinosis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Turre farset. 7.*

Crithmum &c. *Dod. pempt. 705.*

Ad litora maris, præsertim mediterranei 24.

Caul. cubital. ramosus, striatus, subvillosus. Fol. alterna, 2-pinnatifida, subvillosa, lacin. linear. apice spinosis. Pedunc. lateral. subvillosi. Petal. alba, subtus purpurasc.

2. *tenuifolia*. E. foliol. incis, inermibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Pastinaca. Column. ecphr. I. tab. 101.

In Apuliæ maritimis apricis 24.

Fol. bipinnatifida, carnosæ, glauca. Petal. alba, subtus purpurasc.

404. CO-PROSMA. Flos hermaphrodit. Cal. 5-part. Cor. 5-7-fid. Stam. 5 ad 7. Styli 2. longi. Bacca disperma. Sem. planiusc. Flos femin. & mascul. ut in hermaphrodito.

2. *lucida*. C. pedunc. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

In nova Zeylandia.

Simil. Phyllidi. Planta glaberr. Fol. opposita, petiol. ovata, utrimq. acumin. integerr. stipula intersoliar. folitar. acuta, combinans fol. Pedunc. axill. folitar. oppositi, 2-phylli, divisi in pedicellis. Fl. capitati. Cal. & cor. viridesc. Pistil. longiss. extra florem.

2. *fetidissima*. C. fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*

In nova Zeylandia.

Intensissime foetens.

405. HASSELQUISTIA. Cor. radiat. cordatæ. Sem. ambitus geminata, margine crenata (ovalia, plana, medio convexa); disci folitar. urceolata, hemisphær.

1. *egyptiaca*. H. fol. pinnatis: foliol. pinnatif. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. I. tab. 87.*

Pastinaca Or. &c. Buxb. cent. 3. tab. 87.?

In Arabia ☉.

Caul. erect. sesquiped. teres, albo-hirtus, dein
Tom. II.

muricato-scaber. Rami ex axillis superior. simplic. Fol. remota, alternata, petiol. obrufa, subtus costis scabra. Vaginæ ventricosæ, basi, & margine super. albo-lanatæ, margine interior. purpur. Pedunc. terminal. muricati. Umbel. patens. Umbellul. 10. quarum 5. in ambitu. Involuc. minimum 3-phyll. subulat. reflexum. Involucel. dimidiata; exteriorum 3-phylla, subulat. nudentia, umbellula breviora. Fl. albi. Umbel. fructifera connivens.

2. *cordata*. H. fol. cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 193.*

Habitat ☉.

Caul. sesquiped. a basi ramosus, teres, striatus, cavus, pilis breviss. cæberrus. Fol. varia; plerumq. ternata, summa, & infima quædam simplic. petiolis hispidul. cum brevi vagina innixa, obtusa, crenata, utrinq. villosa: lateralialia sessil. & subovata. Involuc. foliol. sub 12. setaceis, simplic. reflexis, hirsut. Involucel. similia, sed pauciora, patentia. Umbella plana, densa. Petal. exter. ma. obverse ovata, patentiss. alba.

406. TORDY-LIUM. Cor. radiatæ, omnes hermaphrod. Fruct. suborbiculat. margine crenatus. Involuc. longa, indivisa.

1. *syriacum*. T. involuc. umbella longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 54. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 16. f. 7.*

In Syria ☉.

Tota planta pilis breviss. incanis testâ. Caul. 1-2-palm. Foliol. infima, & summa 3. reliqua 5. obtusiss. crenato-incisa, foliol. terminal. majore. Involuc. foliol. lanceol. vel spathulat. Fl. in qualibet umbella pauci. Petal. alba. Sem. magna.

2. *officinale*. T. involucell. longitudine fl. foliol. ovatis, laciniat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 2.*

Seseli creticum. Dod. pempt. 314.

In Italia, Narbona ☉.

Caul. hirsut. Fol. longe petiol. pinnata, rudia, villosa. Petal. alba.

3. *peregrinum*. T. semin. sulcatis, rugosis, plicatis: involuc. 1-phyll. sub 3-fid. *Syst. veg. ed. 14.*

Caucalis &c. Cam. hort. tab. 11.

In Oriente.

Caul. ramosus, lævis. Fol. *Cerefolii*. Umbel. radiis sub 3., umbellul. sub 7. Involucc. foliol. 5. Sem. ovata, subcompressa, sulcis 3. profundis, qui lateribus lamellato-PLICATI sunt.

4. *apulum*. T. umbell. remotis: fol. pinnat. pinnis subrotund. laciniat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 53. Col. ecph. tab. 124.*

In Italia, Apulia incultis.

Caul. sesquiped. Fol. radical. decumbent. plurima, pinnata: foliol. breviss. petiol. opposita, subpubescent. 4-iuga, cum impari: caulina acuta, glabra. Petal. alba. Umbellul. floscul. marginalibus 3. ma.

5. *maximum*. T. umbell. confertis, radiatis: foliol. lanceol. incisiferrat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 142.*

Caucalis ma. Clus. hist. 2. p. 101.

In Italia, Helvetia, Austria ruderalis ☉.

Caul. pilis rigentibus, reflexis. Foliol. 7. pubescent. impari duplo ma. Umbell. paucæ, scabræ. Umbellul. sæpius 9. Involuc. 5-phyll. subulatum, patens, umbella brevius. Involuccel. 5-phyll. subulata, longitudine umbellulæ: 2. foliol. interioribus min. Cor. alba, subtus rubra, dein ochroleuca. Sem. orbicul. compressa, hispida, margine incrassato, muricato, rubro.

6. *Anthriscus*. T. umbell. confertis: foliol. ovat-lanceol. pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 261.*

Caucalis &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 8.

In Europæ arvis ruderalis ♂.

Caul. 1-3-ped. striatus, scaber, pilis retroflexis. Fol. sub 2-pinn. hispida, obscure virid. Umbellæ radii 5-8. Petal. alba, vel pallide purpur. Sem. aspera. *Diversa a Scandice infesta.*

7. *nodosum*. T. umbell. simplic. axillar. sessil. semin. exterior. hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. App. tab. 24.*

Caucalis &c. Bauh. hist. 3. pag. 83.

In Italia, Gallia &c. ☉.

Caul. ped. plerumq. ad terram strati, parum ramosi. Fol. circumscriptione oblonga, sub 2-pinn. pinnul. laciniat. acutis, tenuiter divisa, utrimq. villosa. Umbell. exiguae, purpurasc. Sem. interiora verrucosa.

- 5-folium*. T. fol. pinnat. pinnis sessilibus, oblon. ferrat. petal. rubris, uno maximo in fl. exterioribus. Scop. Fl. Carn. tab. 3.
In Carniola.
- Caul. ped. simpl. sulcatus, fere nudus. Fol. radical. semiped. vaginantia, villosa; pinnar. paribus 2. Primum par ad basin auctum 2. lobis: folium impar cæteris maius, & semitrifid. Involuc. uno, alterove foliol. Involucc. polyphyll. linearia. Cor. rubra ut in *Caucalide grandiflora*.
407. CAUCALIS. Cor. radiatæ, disci mascul. Petal. inflexo-emargin. Fructus fetis hispidus. Involuc. integra.
1. *grandiflora*. C. involucro (plerumq. 5-phylio) foliolo unico duplo ma. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 54. Echinospora &c. Colum. ecphr. tab. 94.
Inter Europæ austr. segetes ☉.
- Caul. tubercul. brachiatis lævissim. Fol. (Dauci) pinnata, foliol. exiguis, linear. tenuiter subdivisus; supra lævia, subtus scabra. Umbella lata, radiata, plana. Fl. magni, albi. Involuc. margine alba.
2. *daucoides*. C. umbel. 3-fid. aphyll. umbellul. 3-sperm. 3-phyll. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 157. Echinospora Colum. ecphr. 1. tab. 97.
In Italia, Helvetia, Gallia, Germania ☉.
- Caul. divaricatiif. diffusus, angulat. striatus, hispidus, purpureo-virefc. Fol. Dauci rariora, multiplicato-pinn. infer. petiolo canalicul. super. vaginant. Pedunc. longiss. læves. Umbel. 3 5-fid. Umbellul. sæpius 3. sessil. Involuc. nullum. Involucc. 3-phylla. Flosc. æqual. (non radiati) rubentes, tandem albi. Fructus umbellul. plerumq. 3. divaricati, coronati periant. oblongi, aculeis uncinat. remotis, lævibus.
3. *latifolia*. C. umbel. 3-fid. umbellul. 5-sperm. fol. pinnat. ferratis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 118.
Lappula &c. Bauh. hist. 1. pag. 81.
In Germania, Gallia &c. inter segetes ☉.
- Planta sylvestris semiped. culta 2-ped. Caul. angulatus, ut tota planta, scaber. Fol. vaginæ albentes. Pinnæ usimq. 4. cum impari, oppositæ, lanceol. ferratæ. Umbel. 3-4. radiata. Umbellul. sessiles. Involucr. ovat-lanceol. radiis

æqual. Universale foliol. 3-5. partial. 5. Floscul. æqual. albi, cum rubedine mixti. Fruct. conferti. ovari, scabri, acul. purpurascens. aculeolis reflexis.

4. *mauritanica*. C. involuc. 1-phyll. involucl. 3-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Walth. hort. 127.*

In Mauritania ☉.

Caul. sub 2-ped. ramis alternis, diffusis, angulosis, pilis adpersus. Fol. alterna, semiamplexicaul. infer. petiol. super. sessil. pinnis decompositis, pinnul. linear. profunde incisis, petiol. membranac. Umbel. inæqual. patens, fere plana, radii 3-4-5. Umbellul. inæqual. Petal. dilute purpur.

5. *orientalis*. C. umbell. patentibus: foliol. partialibus supradecomposit. laciniat. lacin. linear. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 14. f. 5. Bellon. it. l. 3. tab. 200.*

In Oriente ☿.

Caul. 2-cubital. brachiis. Fol. ferulacea, palmat. & dodrant. petiol. basi lata. Umbell. amplæ, rotundæ. Fl. æquales, absque radio. Petal. alba. Sem. fetosa, pilida.

6. *leptophylla*. C. involuc. subnullo; involucl. sub 5-phyll. umbella plerumq; 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 195.*

Lappula &c. *Morif. hist. 3. f. 9. tab. 13. f. 3. Inter Italia, Helvetia, Germania &c. segetes* ☉.

Caul. diffus. semiped. teres, retrorsum scaber. Fol. nitida, venosa, pilis scabra, 2-pinn. lanceol: radical. longe petiol. superior. petiol. vaginantibus. Umbellul. 5-fl. non radiatæ, albo-purpurasc. Involucl. parva. Fruct. ovat. aculeis verticillato-hispidis apice triglochid.

7. *helvetica*. C. involuc. sub-nullo: involucl. a 3. ad 5. umbel. a 3. ad 10-fid. ramis stricte divaricat. *Syst. veg. ed. 14. Hall. helv. n. 2742. Jacq. hort. 3. tab. 16.*

In Helvetia.

Simil. Tordyllo Anthrisc. Caul. subped. teres, superne asper, ramis patentiss. Fol. 2-pinnat. petiol. membranac. canaliculata, subaspera, satore virent. Pinnul. pinnatifid. acutæ, lacin. lanceol. acutis. Umbell. planæ. Petal. inflexe cordata, parent. albo-carnea, exter. paulo

ma. Fruct. immaturus fufcefcit, dein cinereus evadit. Sem. ovat. pilis ramosis hispida.

- maritima*. C. umbella 2-fida; umbellul. 2-(spermis: involu-
cris femine brevioribus, linear. *Gouan. 1. hift.*
p. 135. n. 1. *Ger. Gallo-prov. tab. 10.*
In agro Nicænfis &c. ☉.
- glabra*. C. fol. 3-pinnat. g'abris: involucro 3-dent: fl.
omnibus pedicellat. *Forsk. Ægyp.*
In Arabia.
Villi vix manifesti in plantis. Sem. hispida.
- angustifolia*. C. fol. multifid. angustis, Chærophylliform. in-
volucris, germine, & semin. hispidis. *Forsk.*
Æg.
In Arabia.
408. ARTE- Involucra pinnatifida. Flosc. disci masculi. Fru-
DIA. ctus squamis hispidus.
1. *squamata*. A. semin. squamatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Gingidium &c. Camer. hort. tab. 16.
In Libano ☉.
Caul. pedul. parum ramosus. Fol. Scandicis, te-
nuissime divisa. Umbel. magna, plana; utraq.
multiplex. Petal. cordata, alba, exter. ma:
Sem. oblong. ovalia, compressa, membranac.
-
- muricata*. A. foliol. ovato-ferrat. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
Caul. hispidus. Involucr. utraq. ramosa. Fl. di-
sci abortivi. In medio cuiusvis umbellæ emi-
net longiori petiolo foliolum crispum, rubrum,
velut umbellula parva.
409. DAU- Involuc. universale fol. profundissime pinnatifid.
CUS. Umbella in senio connivens, concava. Cor.
subradiat. Omnes hermaphrodit. Fruct. pilis his-
pidus. Sem. ovalia, costata, aut striata.
1. *Carota*. D. femin. hispidis: petiol: subtus nervosis. *Syst.*
veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 723. Sabb. hort. 4.
tab. 74. Clus. hift. 2. p. 108.
b. *Pastinaca &c. Black. tab. 546. Ludw. ed. tab. 9.*
In Europæ campis exaridis ♂.
Planta villosa. Caul. 3-ped. ramos. striatus. Fol.
pallide virent. Petal. alba, vel rubent. *Var.*
umbella tota atro-rubente.
2. *mauritanj-* D. femin. hispidis: floscul. centrali sterili, car-
cus. noso: receptac. comm. hemisphærico. *Syst.*
veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 61. f. 1.

Pastinaca &c. *Morif. hist.* 3. f. 9. *tab.* 13. f. 3.

In Italia, Hispania, Mauritania ♂.

Africanis valde priori. Caul. torus hispidus. Involuc. umbella brevius, 5-fido-pinnat. Involucc. 3-dent. Petal. inflexo-2-fid. alba.

3. *Vifnaga*. D. femin. lævibus: umbell. universalis basi coalita. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 3. *tab.* 26.

Gingidium &c. *Dod. pempt.* 792.

In Europa australi, Mauritania, Libano.

Planta nitida. Cal. 2-3-ped. ramos. striatus, lævis. Fol. alterna, amplexicaul. triplicato-pinn. foliol. linear. acutis. Umbel. basi est receptac. comm. subrotund. solidum. Involuc. (tamquam basi 1-phyll.) polyphyl. foliol. 3-fid. Involucc. polyphyl. simplic. Umbelul. numerosiss. Petal. inflexa, biloba, alba. Anth. purpurasc. Receptac. propria fusco-purpurea. Fruct. compressus transverse, oblong. striatus, lævis.

4. *Gingidium*. D. radiis involucri planis; lacin. recurvis. *Syst. veg. ed.* 14.

Gingidium. Matth. comm. tab. 373.

Habitat Monspelii.

Caul. ramosus, striatus. Fol. alterna, amplexicaul. satore virent. sub lucida, pinnata, pinnul. pinnato-multifid. Petal. alba.

5. *muricatus*. D. femin. triglochidi-aculeatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 1. *tab.* 10.

Caucalis &c. *Morif. hist.* 3. f. 9. *tab.* 14. f. 4. *Herm. par. tab.* 11.

Echinophora &c. *Col. ecphr.* 1. *tab.* 94.

b. D. maritimus.

Caucalis &c. *Ger. prov. tab.* 10.

Lappula &c. *Bauh. hist.* 3. p. 81.

In Mauritania; b. in littoribus mediterranei ♂. ☉.

Caul. semiped. ramosus, brachiat. Fol. cum petiol. hisutis, firma, concinna, triplicato-pinn. laciniis ultimis obtusiuscule 3-fid. & 2-fid. Umbell. parvæ, raræ, albæ, Involuc. 6-1-2-fol. sed mere pili; involucc. inæqual. 3-5-fol. Petal. rubra, radio parvo. Fructus magni, 5-7. sem. aculeis flavescens. triplicis seriei, compressi, apice glochidibus.

b. humilis, hirsutus. Caul. fere aphylli. Germi-na hirsuta.

- 6. lucidus.** D. fol. lucidis, petiol. lævibus: caul. hirtus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Mauritania ♂.
 Statura D. Carotæ, sed multo ma. Fol. grossiora, lævia.
-
- gummifer.** D. femin. aculeat: flosc. centrali sterili, nullo: caul. nitido. *Gouan. Illustr.*
D. hispanic. Atl. Fl. Ped.
Pastinaca &c. Bocc. Musf. 2. f. 20.
Ad mare, & in agro Niceensi ♂.
 Altitudo sæpe humana. Caul. striatus, sæpe purpureasc. inferne hispidus, dein calvescens, ramulosiss. nitidus. Fol. radical. ampla, ex vagina non emargin. viridi; ped. ambitu fere triangulari, lucida, 3-pinn. Foliol. lobato-pinnatif. lobulis ovatis, mucronatis, integris-2-3-fidis, glaberr. Umbell. terminal. longæ, pedunc. confertiss. radiis multis, hispidis. Involuc. foliolis sub 12. uncial. pinnatis, foliol. quinque lanceol. mucronatis. Involucc. foliol. sæpe 8. lanceol. profunde 3-fidis.
Sapor Crithmi maritimi. Odor Carotæ citratus. Excisus ramis, manet Gummi albidum, odore subcitrato, non fetido.
- polygamus.** D. femin. hispidis: umbellul. floscul. marginalibus pl. mascul. *Gouan. Illustr.*
Pastinaca &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 9. f. 10.
Habitas
Habitus D. sylvest. sed humilior. Radix sapore Carotæ. Caul. 2-ped. striatus, non hispidus: aculeat. sed retrorsum scaber. Fol. ambitu lanceol. 3-pinn. Foliol. parva, acute integra-2-3-fidis. subtus nervo hirsuto, petiol. hispidis: fol. summa pinnata.
- 410. AMMI.** Involucra pinnatif. Cor. radiatæ, omnes hermaphrod. Fruct. exiguus. subrotund. lævis. Sem. intus planum, dorso tenuius striato.
- 1. maius.** A. fol. inferior. pinnat. lanceolat. serratis; superior. multifid. linear. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 65. Black. tab. 447.*
In Europæ austral. Orientis vineis, arvis ☉.
 Fol. alterna, amplexicaul. oblonga, angusta, pinnula impari. Umbel. terminal. ampliss. longe peduncul. alba. Sem. villos. ex cinereo-padic. amaricantia, odora.

2. *copticum*. A. fol. supradecomposit. linear. seminibus muricat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 196.*

In Ægypto ☉.

Statura *Anethi*; viridis. Caul. striat. lævis. Fol. 3-pinn. oblong. lævia. Umbella, & umbellul. radiis 10. non magna. Involuc. foliol. 5. linear. variis, 3-fid. Involucc. foliol. 7. acutis, linear. indivitis; interior. 4. breviss. Petal. æqual. alba, 5-angula. Fruct. ovatus. Sem. striata, 5. torulis, magis gibba, quam lata, aromatica.

3. *glaucofolium*. A. folior. omnium lacinulis lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Daucus &c. *Bauh. hist. 3. p. 58.*

In Gallia 24.

Caul. sæpe unicus, pedal-cubital. quandoq. in 3. ramulos divisus. Fol. tenuiter secta, glauca, raro glabra: radical. breviter petiol. caulina petiolis caulem amplectent. Flosc. parvi. Sem. parva, subrubeant.

- daucifolium*. A. fol. 2-pinnat. pinnis pinnat. 3-fid: primis costæ comm. verticillatim adnatis. *Scop. Fl. Carn. tab. 10. Pluk. phytol. tab. 11. f. 1. huic proximum.*

In Carniola &c.

Caul. 2-3-ped. ramosus, fulcatus. Fol. pedal. glabra, subtus pallidiora. Involuc. foliol. linear. patulis, dein reflexis, apice pinnatifid. Involucc. polyphylla, fetacea, indivisa. Petal. cordat. albida. Fruct. elliptic. Sem. marginatum.

Canceri specificum. *Störck.*

411. **BUNIAM**. Cor. uniform. Umbella conferta. Petala cordata, reflexa. Fruct. ovali-longior, fere cylindricus. Sem. subriliter striata, nuda. *Rad. carnosotuberosa.*

1. *Bulbocastanum*. B. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 220. Subb. hort. 4. tab. 73.*

Nucula &c. *Murif. hist. 2. f. 9. tab. 2. f. 5.*

Enante. 1. *Mauh.*

In Europæ montosis 24.

Radix tuberosa, rotunda, nigricans. Caul. cubital. subramosus, infirmus, striatus, subfuscus, uno plerumq. fol. adnato, antequam in

ramos dividatur. Fol. alterna, amplexicaul. 3-pinn. obscure virid. nitida, firma, glabra, pinnul. lineari-multifid. caulina tenuius incisa. Umbella ampla. Petal. alba. Rad. coctâ comeditur ab alpicol.

Duo distinctâ Bulbocastana tradit Gouan, quorum primum *B. minus* = fol. uniformibus involuc. poliphyllis: fruct. subcylindric. apice crassioribus: styl. reflexis, deciduis. Alterum *B. majus* = fol. caul. angustiss. involuc. nullo: fruct. ovat. acuminat. stylis persistent.

412. CONI- Involucc. dimidiata, subtriphylla. Petal. inflexo-
UM. emarginata. Fruct. subglobosus, 5-striat. utrimq. crenatus.

1. *maculatum*. C. femin. striatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 156. Sabb. hort. 4. tab. 70. Black. tab. 451. & 573. a. b.

In Europæ cultis, & ruderatis ꝑ.

Odor plantæ feridus. Caul. orgyal. ramosus, fistulosus, maculis rubent. adpersus. Fol. alterna, amplexicaul. maxima, atrovirent. nitida, triplicato-pinn. pinnul. oblong. incisoferratis. Umbella plana. Petal. alba. Var. proceritate, & rad. perenni. Pallus.

2. *rigens*. C. femin. submuricat. pedunc. fulcatis: foliol. obtusis, canalicul. Syst. veg. ed. 14.

Ad cap. b. Spei littora maris ꝑ.

Simil. *C. africano*, sed magis erectum, *rigens*. Caul. brevis, *rigens*. Rami longior. patentiss. remoti. Pedunc. fulcati (*C. Afric. læves*). Fol. 2-pinn. conduplicata, obtusa, crenulata, dura, Rutæ col. Umbell. brevis, conferta, rigida. Involuc. 3-phyll. foliol. uno, vel altero foliac. diviso. Involucc. 7-phyll. foliol. paucis, crenatis. Petal. æqual. lanceol. involuta, alba. Sem. muricata.

3. *africanum*. C. femin. muricat. petiol. pedunculisq. lævibus. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 194.

Caucalis &c. Boerh. Lugd. 1. tab. 63.

In Africa ☉.

Odor Opii. Caul. vix pollic. aphyll. Fol. longe petiol. multiplicato-pinn. Pinnul. multæ, parvæ, linear. planiusc. obtusiusc. Involuc. foliol. sub 6. brevibus lanceolat. concavis, patentibus. Umbel. conyexa. Pedunc. oppositifol.

non fulcati. Petal. oval. patentiss. alba. Fruct. centralis sessilis.

4. *Royenl.* C. femin. radiato-spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Caucalis. *Buxb. cent. 3. tab. 28.*
In Ægypto.
Habitū simil. priori. Laciniae fol. latiores. Involuc. foliol. maioribus, & latioribus. Petal. purpur.

suffruticosum. C. semin. angulato-striat. caul. suffrutic. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. spirham. superne divisus, vaginatus. Fol. petiol. duplicato-pinn. pinnis oblong. obtusiusc. incis; glabra, succulenta. Umbel. radiis 9-12. umbellul. radiis brevibus, sub-12. Involuc. brevia, 3-5-phyl. Petal. alba.

413. SELI-
NUM. Fruct. ovali-oblong. compresso-planus, in medio striat. striis eminent. & subulat. margine alato, ala magna membranacea. Involuc. reflexum. Petal. cordata, æqualia.

1. *sylvestre.* S. radice fusiform. multiplici: styl. erectis: corollul. explicatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 412. Sabb. hort. 4. tab. 98.*

Thyselinum &c. *Morif. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 2. In Italia &c. 24.*

Planta sublaetesc. Caul. numerosi, 4-7-ped. læves, nec striati, basi purpur. Fol. multiplicato-pinn. in planta culta purpurascens. foliol. linear. Umbella patula. Umbellul. remotæ. Involuc. foliol. 8-12. acutis, umbella duplo brevioribus, margine membranac. albo. Involuc. externe longiora, umbellul. æqualia. Petal. lata, alba. Sem. oval-oblong. sulcis 3. elevatis, obtusis, adproximatis: immatura rubescunt, dein parum fuscescunt.

2. *palustre.* S. sublaetescens: rad. unica. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 152. (ob caulem striatum). Crantz. Austr. tab. 4. f. 1. Fl. Dan. tab. 257.*

Thyselinum &c. *Riv. tab. 13.*

In Europæ septent. paludibus 24.

Radix præcipue laetesc. & urens. Caul. 3-4-ped. crassus, ramosus, fulcat. Fol. ampla, 4-duplicato-pinn. Fol. oblong-linear. subcrenata, venis nigricant, foliol. terminal. elongata. Um-

bella densa. Involucra magna, reflexa, ciliata. Pet. ex albo-lutea. Sem. emarginata.

3. *austriacum*. S. caul. striato, fulcato: foliol. ovatis, incis. *Syst. veg. de. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 71.*

S. *argenteum*. *Crantz. Austr. tab. 4. f. 2.*

In *asperis herbidis montosis Austriae, Pedemontii* &c.

Caul. 2-3-ped. sæpe simpl. nitidus. Petioli basi vaginant. membranac. radical. sæpe pedales. Fol. multiplicato--pinn. glabra, supra satute virid. subtus dilutiora. Foliol. varia, pinnatifide incisa, mucrone exiguo. Involuc. foliol. sub 10. lanceol-linear. integris, reflexis, ora membranac. alba. Umbella ampla, patens, convexa. Umbellul. densæ, & convexiores. Petal. alba.

4. *carvisolia*. S. caul. fulcato, acutangulo: involuc. evanido: styl. erectis: petal. connivent. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 16. Fl. Dan. tab. 667. Gmel. Sib. 1. tab. 48.*

Angelica tenuifol. Riv. pempt. tab. 18.

Carvisolia. Bauh. hist. 3. pag. 171. Vaill. parif. tab. 5. f. 2.

In *Germania, Helvetia, Sibiria &c.* &c.

Tota planta nitida. Radix foris fusca, intus candida, semiped. Caul. plerumq. unicus, rectus, 2-ped. medullosus, pallide virens, subramos. membran. albis alatus; quæ plerumq. extant ad exortum umbellæ, quandoq. ad principium petiolor. Fol. triplicato--pinn. petiolo comm. striato; in radicalibus longo, & antice fulcato; in caulinis dilatato, sed vix vaginante. Pinnæ latiuscul. simpl-2-3-fid. Pinnul. ultimæ ex oblon-ellipt. mucronat. apice albidæ, planæ, quædam confluentes. Umbel. densa, & parum convexa. Involuc. 0-1-raro fol. pl. Involucc. foliol. angustis a 5. ad 10. Petal. oblong. cordat. æqualia, alba, subtus rubore perfusa. Semina ala lata, membranac. Culta multo ramosior evadit.

5. *Chabræi*. S. vaginis fol. caulinorum planis, flaccidis, pendul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 72. Crantz. Austr. tab. 3. f. 2. Vaill. parif. tab. 5. f. 2.*

In *collibus, & pratis alpium; in sylvis, & pratis subhumidis* &c.

Tota planta glaberrima. Radix fusiform. simpl. vel ramosa, semiped. albida, quandoq. extus flavesc. aut rufa. Caul. pl. 2-3-ped. striati, teretes, superne ramosi, virentes, vel purpurasc. Fol. radical. & caulina omnium infima longe petiol. circumscript. oblonga. Foliol. opposita, pinn. vel pinnatifida, basi folio simili aucta; pinnul. lanceol. linear. acutis, planis. Fol. caulina constant ex foliol. minus divisis, sed plerumq. longioribus: summa simpliciter pinn. Petioli membranac. plani, & intus albid. debiles, idcirco fol. pendula sunt. Involucr. nullum. Involuc. nulla, aut 1-fol. setaceum. Umbella plana, & rara. Umbellul. magis densæ, sed radiis divergent. Petal. oblong. inflexa, vix cordata, æqualia, intus albida, extus purpurascens. Sem. subovat. & compress. hinc plana, albida, illinc in medio striis 3. elevatis insignita, margine membranac. sapore ingrato, & subacri.

6. *Seguieri*. S. involuc. nullo: pistill. divaricatiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 61.*

Ligusticum alpinum &c. *Segu. ver. 2. tab. 13. Till. pif. tab. 39. f. 2.?*

In Italia, Helvetia, Austria 24.

Planta glabra. Caul. 3-ped. ramosus, striatus. Fol. infer. longe petiol. ampla, sesquiped. petiolo lato, sed non vaginante. Foliol. angustissimo mucrone albido, & innocuo; super. min. Umbell. plana, densa: umbellul. convexæ. Involucr. 0-1-fol. Involuc. polyphyll. Petal. parva, alba, odora. Fruct. subrotund. ovat. nitidus. Sem. membranac.

7. *Monnieri*. S. umbell. conferta; involucr. reflexo: semin. costis 5. membranac. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 62.*

In Gallia australi ☉.

Sem. fructura Laserpitii; sed habitus, & reliqua Selini. Caul. 2-ped. inferne rubens. Folia 2-pinn. foliol. profunde pinnatifid. segment. oblong. subacutis, planis. Involuc. setacea. Umbell. parum convexæ. Petal. alba. Sem. parva.

- Sibiricum*. S. fol. 3-pinn. involucr. utriusq. enneaphyll. decoloribus. *Retz. Obs. fasc. 2.*

Habitat ♂.

Planta facie singulari involuoc. albis. Rad. fusiform. odore Dauci recentis. Caul. erect. 3-ped. fistulosus, striat. glaucus. Fol. pinnæ laciniat. acutæ, apice albo, petiol. compressis, supra canalicul. vaginis superiorum albis. Pedunc. sulcati. Involuc. fol. lanceol. membranaceo-albis, pellucid. Involucc. latiora, & fl. superantia. Umbel. radiis 20-30. Petal. alba. Sem. oblon-rotunda, costis 3. dorsal. præter alas marginales.

414. **ATHA-** Fruct. ovat-oblong. striat. Petal. inflexa, emar-
MANTA . ginata.

Pl. sp. spectans ad Selini genus.

1. *Libanotis*. A. fol. 2-pinn. planis (pinnis latiuscul.): umbella hemisphær. femin. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 392. Fl. Dan. tab. 754. Apium petraeum &c. Bauh. hist. 3. pag. 105. ic. Daucus &c. Pluk. aim. tab. 173. f. 1. Riv. pempt. tab. 37.*

In Germaniæ, Helvetiæ &c. pratis siccis, apricis 24.

A. pyrenaica Jacq. hort. tab. 197. fere var. huius.

Planta pallide virens. Caul. a dimidio ad 4. pedes; in subalpin. simpl. vix pedal. Fol. in ma: var. ampla: petiol. incani: vagin. purpur. Foliol. subovat. lucida, glabra. Umbel. densa. Involucr. ex foliol. integris. Petal. pallide ochroleuca. Sem. villo tecta, non setis rigidis, aut uncinatis.

2. *Cervaria*. A. fol. pinnat. decussat. inciso-ferrat. femin. nudis.

Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 69.

Selinum &c. Crantz. Austr. tab. 3. f. 1.

Libanotis &c. Tabern. 108.

Cervaria. Riv. pempt. 12.

Oreoselinum &c. Garid. Aix. tab. 72.

In Germaniæ, Helvetiæ &c. montibus 24.

Specifica durities, & firmitas. Planta glabra, odorata. Caul. 1-5-ped. Fol. ampla: radical. 3-caulina 2-pinn. 6-iuga, subtus glauca, pleraq. sessil. elliptic. acumin. dent. terminalibus plerumq. 3-lobis, & in petiolum decurrent. Involucr. foliol. sub 10. reflexis, membrana alba. Umbella ampla, subconvexa. Petal. ante explicationem purpur. dein alba, inflexo-cordata, fene æqualia. Sem. ovata, nucleo modice sicc. trifurco, ala membranac. conspicua.

3. *sibirica*. A. fol. pinnat. inciso--angulat. *Syst. veg. ed. 14.*
Gmel. Sib. 1. tab. 40. f. 1. 2.
In Sibiria 24.
Simil. A. Cervariæ. Caul. quandoque orgyal. Fol.
 summa bina--terna--quaterna, ex quorum alis
 rami. Involuc. foliol. sub--12. incanis. Petal.
 subtus rubra. Fruct. parvi, fere cylind. incani.
4. *condensata*. A. fol. sub-2-pinn. foliol. deorsum imbricat. um-
 bell. lentifor. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illuf.*
tab. 26.
A. Libanotis ma. Hall. Helv.
In Sibiria 24.
 Caul. ped. simpl. lævis, inferne angulat. superne
 sulcat. Rami 2--3. floriferi, ex summis alis.
 Petiol. canalicul. basi membranac. subtus an-
 gulati. Foliol. alterna, pinnatif. lobo infimo
 ma: unde quasi cruciata, subtus nitida. Um-
 bel. densiss. utrimq. convexa, antequam floret
 rufescens. Petal. inflexa, alba, anth. fuscis.
 Involucr. plerumq. o. & tantum rudimenta.
 Involucc. longitud. umbellul. foliol. imbricat.
 nec remotis.
5. *Oreoseli-*
num. A. foliol. (triplicato--pinn.) divaricat. *Syst. veg.*
ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 68.
Oreoselinum &c. Clus. hist. 2. p. 195. Riv. pempt. 8.
In Europæ collibus apricis 24.
 Rad. crassa, longiss. fetis coronata, amara. Caul.
 cubit. vix striat. Fol. longe petiol. petiolis va-
 gina lata, intus purpur. Fol. glabra, lacin. la-
 tiuscul. refractis, aristat. Involucr. simpl. va-
 rians num. foliolor. per ætatem reflexum. In-
 volucc. plura. Umbell. axill. & terminal. am-
 plæ, raræ, compositæ. Radii inæqual. Um-
 bellul. densæ. Petal. exigua, integra, inflexa,
 alba, aut ex albo-rosea. Sem. alata, emargin.
 3. lineis exarata.
Ad Selini Genus spectat.
6. *ficula*. A. fol. inferior. nitidis: umbell. primordial. sub-
 sessil. semin. pilosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Daucus &c. Mont. in Zann. tab. 48.
In Sicilin 24.
Simil. sequenti, sed minus incana, & sextuplo ma.
 Caul. cubital. & ultra, pubescens. Fol. mul-
 tifida, super. subvillosa. Petal. alba.
7. *cretensis*. A. foliol. linear. planis, hirsut. petal. 2--part.

femin. oblong. hirsut. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 62.*

Daucus creticus. Black. tab. 271.

Libanotis rupestris. Scop. Fl. Carn. tab. 9.

Dauco primo. Matth.

In Helvetia, Austria, Carniola, Pedemontio, e rupium fissuris, locis alpinis 24.

In alpidibus tota planta villosa: in hortis (seminibus exceptis) glaberrima, & nitida.

Caul. palm. striatus. Fol. cinerea, triplicato-pinn. radical. ex vaginis latis, purpurasc. ultimis linear. planiuscul. at in culta succulentis, fragilibus, nitidiss. Umbel. planæ. Involuc. o-parvisfol. Involucc. foliol. a 4. ad 7. Petal. alba. Sem. oblong. albo, & denso villo canescent. sapore fragranti. Involucr. ex foliol. integris.

6. annua. *A. fol. multipart. lacin. linear. teretiuscul. acuminat. Syst. veg. ed. 14.*

Myrrhis annua &c. Moris. Umb. 67.

In Creta ☉.

Caul. ped. Fol. Dauci vulg. divisura, tenui lanugine obsita. Petal. alba. Sem. alba lanugine pubesc. obsita.

9. chinensis. *A. fol. supradecomposit. multifid. lævibus: femin. membranaceo-striat. Syst. veg. ed. 14.*

Habitat . . .

Caul. erect. parum flexuosus, angulat. lævis. Fol. Charophylli, lævia. Umbell. minus expansa, alba. Sem. 5. alis longitudinal. parvis. Statura Selini monnieri.

pyrenaica. *A. Jacq. hort. 2. tab. 197.*

In Pyrenæis 24.

Videtur var. A. Libanotidis, est habitus diversus, cum in nostra sit patentiss. & diffusus. Caul. 2-ped. angulat. sulcat. subvillosus, ramis patulis. Fol. radical. circumscript. ovata, multiplicato-pinn. vagina membranac. & striata. Pinnul. ultimæ lanceol. acum. planæ, integerr. confluentes in foliol. ambitu ovatum, & sessile. Umbel. ampla, convexa: umbellul. densiss. hemisphær. Involucra utraq. foliol. linearibus. Petal. patentiss. ovata, subcord. ochroleuco-albida. Fruct. ovat. obtusus. Sem. subovata, cinerea.

Dauco-

- Daucoides*. A. (Libanotis). Scop. Fl. Carn. ed. 2.
In Carniola 24.
Caul. cubital. striat. subvillos. polline adpersus.
Fol. pinnata, pinnis pinnatif. segment. plerisq.
3-fid. 3-4-uncial. pinnis uncia vix longioribus.
Umbel. densiss. Radii ad 40. Involuc. linear.
Petal. alba.
- Golatta*. A. Hacquet. Pl. alp. Carniol. tab. 5.
In Carniola 24.
Planta glaberr. sapore ingrato, excepta rad. Rad.
subcarnosa, sapore aliquo *Oreoselin*. Caul.
unicus, suberectus 2-3-4-ped. superne ramo-
sus. Fol. radical. ex petiol. membranac. &
amplexicaul. oriuntur 3-pinn. sicuti superior:
summa incisa; in planta ma: 2-pedal. Mem-
branæ caulium superior. 3-4-fid. Umbel. am-
pla. Involuc. foliol. 8-9. lanceol. incis. re-
flexis, undulat. Umbellul. 15-25. inæqual. In-
volucc. foliol. 3-5. sublinear. integerr. Petal.
æqual. ovat. inflexa, alba. Fruct. ovat. ob-
long. nitidus, clavatus, fuscus.
416. PEUCE- Fruct. ovat. utrimq. striat. ala cinctus non pel-
DANUM. lucida. Involucra breviss.
1. *officinale*. P. fol. quinquies 3-part. filiform. linear. Syst.
veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 96. Gmel. Sib.
1. tab. 41. Bauh. hist. 3. p. 36.
b. P. italicum minus &c.
In Europæ austral. pratis pinguibus 24.
Planta succo lacteo scatens. Caul. 2-4-ped. Fol.
alterna, vaginant. nitida, glabra. Petal. fla-
vescent.
2. *japonicum*. P. fol. quinquies 3-part: foliol. cuneifor. 3-fid.
Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.
Jamma Bosu. Kamph. am. exot. Fasc. V. p.
825.
In Japonia.
Planta tota glabra. Caul. erect. vix ped. flexuos.
ramosus, teres. Rami alterni, divaricati, ra-
mulosi. Fol. petiol. vaginant. Umbell. termi-
nal. subfastigiata, compositæ, multiradiat. Sem.
ovata, compressa, lineis elevatis exarata, mar-
gine parum alata.
3. *alpestre*. P. foliol. linear. ramosis. Syst. veg. ed. 14.
Habitat . . .
Umbella ampla.
Tom. II.

4. *minus*, P. fol. pinnat: foliol. pinnatif. lacin. linear. opposit. caul. patulo, ramosiss. *Syst. veg. ed. 14. Selinum &c. Bauh. hist. 3. p. 17.*
In Bristolia Anglorum, Pedemontio ¶.
 Caul. ped. ramosus, fistulosus, olivac. striat.
 Fol. undulata, pallide virent. glabra. Petal. alba.
5. *filans*, P. foliol. pinnatifid: lacin. opposit. involucr. (tandem) 2-phyll. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 15.*
Seseli pratense. Crantz. Austr. tab. 6. f. 1. Riv. tab. 59. Lob. ic. 738.
In Italia, Helvetia &c. pratis montanis ¶.
Ad Ligustici genus spectat.
 Planta tota glaberr. Rad. crassa, profunde, & recte descendens, vaginis, villisq. obsita. Caul. 3-ped. ramosus, angulat. fistulosus, & luteo-virens; inferne sæpe purpur. Fol. odore peculiari, forti, sapore ingrato, & subacri, triplicato-pinn. Foliol. opposit. ex angusto-lanceol. mucronata, spinula exigua, albidâ, quasi carinata, extimis coadunat. Umbel. inæqual. & rara. Involucr. 0-1. phyll. Umbellul. sub-10. planiuscul. Involucc. polyphylla. Petal. lutea, extrus alba, aut pallide flavescent. seu albidâ, apice inflexo. Sem. ovat. aut multo longiora, 4-sulc. seu striis 3. clavatis notata, non alata, fusca, apice viridi-flavesc.
6. *alsaticum*, P. fol. pinnatif. lacin. (3-4-pluries incis, oblong. acutis, planis). *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 70. Ad. Palat. vol. 2. tab. 3. f. 11.*
Umbellifera alsatica &c. Bauh. hist. 3. p. 106.
In Alsatia, Austria, Italia &c. dumetis humidisc. & in collinis apricis ¶.
 Rad. digitum crassa, ramosa, nigra, folior. reliquis capillata. Caul. 1-2-3-cubit. omnium ramosiss. ut paniculat. videatur, striatus, plus minus angulat. atro-purpur. Rami quandoq. ex infima parte caul. oriuntur. Fol. multiplicato-pinn. in ipsa planta magnitudine varia: radical. sesquipedal. super. seorsum min. Costæ striatæ, antice canalicul. purpur: caulinx superior. mere membranac. fol. dependentibus: nervi canalicul. Umbell. raræ, & planæ. Involucr.

fol. sub-5. brevibus, patulis. Petal. pallide flava, integra, inflexa. Sem. compressa, nigra, striis 3. pallidis.

7. *nodosum*. P. foliol. alternatim multifid. *Syst. veg. ed. 14.*
In Creta.

Caulis nodosus.

417. CRITH-MUM. Fl. æquales, fertiles. Sæm. ovale, intus planum, tota superficie cohærens, dorso 3. obsecuris costis percurso.

1. *maritimum*. C. foliol. lanceol. carnosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. hort. 2. tab. 187. Sabb. hort. 4. tab. 94.
Fœniculum &c. *Lob. ic. 392.*

Critmo I. *Matth.*

In muris vetustis locorum calidiorum 24.

Planta glauca, odore *Apii*. Caulis 2-ped. simplicif. læves. Fol. tritern. medio sæpe 5-phyl. Foliol. linear. acuta, lucida. Petiolus crassitie folioli. Involuc. 5-phyll. Involucc. brevia, 7-phyll. Petal. alba.

2. *pyrenaicum*. C. foliol. lateralibus bis trifid. *Syst. veg. ed. 14.*
In Pyrenæis.

Esse Athamantam Libanosidem senescentem putat Hallerus.

3. *latifolium*. C. fol. pinnat. foliol. sessil. obovat. lobat. dentat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In maritimis Taneriffæ.

Planta sesquiped. Caul. erect. teres, sulcat. Fol. petiol. Foliol. 2-3-iuga, opposita, sessil. margine exterior. decurrente, sensim dilatata: Involuc. foliol. 7-8. lanceol. Involucc. simil. Fl. lutei. Sem. sulcata, margine elevato, glabra.

418. CACHRYS. Fruct. subovat. angulat. suberoso-corticat. (magnus).

1. *Libanotis*. C. fol. 2-pinn. foliol. linear. acutis, multifid. femin. sulcat. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 1. f. 3. 6.*

In Sicilia, Monspeli 24.

Rad. carnosæ, aromatica. Caul. leviter striatus, paniculato-sphæric. virens cum nitore, ad apicem ramis sæpe ternis-quaternis, subverticillat. Fol. ferulacea, pinnis, pinnulisq. oppositis. Petioli inferne crassiores. Vaginæ nervosæ. Umbel. terminal. maxima, subiecto ad quemlibet ramum folio. Involuc. varium. Petal. flava.

K ij

2. *ficula*. C. fol. 2-pinn. foliol. linear. acutis: semin. sulcatis, hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 1. f. 3.*
Hippomarathrum &c. *Bocc. Sic. 37.*
In Sicilia, Hispania.
 Caul. 1-2-cubit. fungosus. Fol. suprema opposita. Umbel. terminal. sessil. Involucra utraq. ramosa. Reliquæ umbel. peduncul. utroq. involuc. simplici. Sem. crassiss. sulcata, hispida.
3. *odontalgica*. C. fol. radical. supradecomposit. tomentosô-canis: caul. nudo umbellif. semin. cortice suberoso, læviss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pall. It. 3. tab. G. f. 1. 2. 3.*
In Dauaria.
 Rad. acerrime aromatica. Caul. erect. dodran-3-spirham. subnud. Fol. radical. terna, supradecomposita, patensia, subpubesc. foliol. extremis digitato-multifid. obtusis, sursum incurvulis. Rami quasi in thyrsum dispositi. Foliol. ad exortum ramorum inferior. filipuliform. apice laciniosa. Involuc. e ramentis paucis, exilibus, deciduis. Radii umbell. 4-6. Umbellul. copiosior. confertiores. Fl. flaviss. Fruct. magnus C. *Libanotidi* simil.
419. FERULA. Fruct. magnus, oval. compresso-planus, striatus, cinctus ala magna, solida, non membranacea.
1. *communis*. F. foliol. linear. longiss. simplic. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 321.*
In Europa australi 24.
 Altitudo humana. Radix crassa, lactescens. Fol. alterna, amplexicaul. 2-pinn. Umbell. rotund. Petal. parva, reflexa, lutea.
2. *glauca*. F. fol. supradecomposit: foliol. lanceol-linear. planis. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 45.*
In Italia 24.
 Altitudo humana. Fol. magna, glauca, præsertim subtus, succo lacteo turgentia, lacin. latio-rioribus priore, odore gravi. Petal. sublutea. Sem. nigra.
3. *tingitana*. F. foliol. laciniat: lacinul. 3-dent. inæqual. nitidis, (caul. lævi, pulverulento; fol. vaginis amplissimis.) *Syst. veg. ed. 14. Herm. par.*

tab. 165. Scop. Del. Insub. fasc. 3. tab. 9.
10.

In Hispania, Barbaria &c.

Rad. humani brachii crassitie, adnodum ramosa, extus fusca, intus flavescens; quarto anno caulescens, florens, & fructicans. Caul. plerumq. unicus, 6-8-pedal. teres, tenuissime striat. glaber; albo polline asperius, rigidus, ad basin virescens, supra rubens, intus albus, superne ramolus, inter ramos flexuosus. Fol. supradecompos. 2-pedal. & longiora; ramis primis hinc rotundat. illinc in angulis adrenuatis. Foliol. profunde dissecta segment. teniter falcatis, glabris, planis, sulco exaratis, supra obscure virid. acumine rubello terminatis, subtus pallidioribus. Vaginæ amplexicaul. tumidæ, striatæ, rubra fascia ad basin notatæ: harum superiores tria folia bis pinn. proferunt; inter quas supremæ aphyllæ, sæpius oppositæ: Ex harum sinu rami spitham. recti, vaginati, rigidi; & ex vaginar. alis umbell. minores, nudæ, ultra maiorem, terminalemque elongatæ. Involuc. nullum; involucre. ex squamul. exiguis, fuscis, deciduis. Petal. oblonga, integra, subinflexa, lutea. Sem. 7-lin. longa, 3 lata, compressa, gibbosa, lineis quinque, lævia. In fructu seminato styli divaricati, deflexi, rubelli. Ex *abscessis ramis exsudat resina acris, ceracea, odora.*

4. *Ferulago*. F. fol. pinnatif. pinnis linear. 3-fid. planis. Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 15. f. 1.

In Sicilia &c.

Altitudo humana. Radix lactesc. Caul. crassus, fungosus. Fol. amplif. Fœnicul. longe petiol. glauca, præsertim subtus. Umbell. rotund. Petal. lutea. Sem. subnigra.

5. *orientalis*. F. fol. pinnis basi nudis; foliol. setaceis. Syst. veg. ed. 14. Tourn. it. 3. tab. 239.

In Oriente.

Caul. 3-ped. medullof. purpurasc. Fol. 1-2-pedal. caulina breviora, rariora. Vaginæ amplæ. Umbell. axill. & terminal. peduncul. Petal. lutea.

6. *meoides*. F. fol. pinnis utrimq. appendicul. foliol. setaceis. Syst. veg. ed. 14.

In Oriente.

Fol. *Mei*. Petal. lutea.

7. *nodiflora*. F. foliol. appendicul umbell. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 5.*

Panax Asclepium &c. *Lob. ic. 783.*

In Europa austral. Istria &c. 24.

Altitudo humana. Fol. ima alterna; subsequa opposita; summa verticill. foliol. linear. integerr. E singulis nodis caulinis prodeunt umbellæ. Involucra breviss. & reflexa. Petal. revoluta, lutea.

8. *canadensis*. F. lucida, canadensis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Foliola linear. ramosa, nitida.

9. *Asa fetida*. F. foliol. alternatim sinuat. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Kamph. am. tab. 536.*

In Persia 24.

Radix nigra, succo albido scatens, foetido. Caul. orgyal. & ultra, subramosus, folior. rudimentis obfusus. Fol. cubital. radical. 6-7. *Præniæ* instar divisa, sed segment. surrectis, tenuioribus, dilute virent. odore debiliore. Umbell. composit. Sem. fusco-rubra.

420. **LASER-**Involuc. utraque. Petal. inflexo-emarginata, **PITIUM**... parentia. Fruct. oblong. duabus plerumq. raro pl. alis dorsalibus, & duabus marginalibus.

1. *latifolium*. L. foliol. (oblique) cordat. inciso-serrat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 146.*

Libanotis &c. *Lob. ic. 704.*

Seseli &c. *Dod. pempt. 312.*

In Europæ nemoribus montanis 24.

Caul. cubital. brachiat. glaucus. Fol. ampla, duplicato-pinn. 2-3-loba, vaginis amplis, & tumidis, caulem amplexant. Umbel. ampla. Radii umbel. ad 60. Petal. albo-rosea.

Var. caul. aphyll. & involuc. longiss. Variat etiam statura, & asperitate, cum glabra evadat.

2. *trilobum*. L. foliol. 3-lob. incis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Gargano monte, Austria 24.

Fol. basi cordat. acuta, & acute serrata, in quo differt a *L. aquilegifol.*

3. *aquilegifolium*. L. foliol. obtus. basi ovat. lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 147.*

In asperis montosis, calcareis 24.

Tota planta glaberr. Rad. ped. & ultra, superne valde capillata, foris nigricans, intus alba,

meditullio flavescent. Caul. erectus, 4-6-ped. non sulcatus, nitidus, rore glauco adpersus, senescens etiam atro--purpur. brachiat. Vag. folior. longa, concava, amplexicaul. conni-vens, striata. Fol. radical. & caulina inferior. ampliss. ac veluti triternata, longe petiol. Caulina summa sessil. subternata, foliol. ple-rumq. trilobis, & incilis, acutis, cum denti-bus subrubent. foliol. hæc lata, nec linear. Caulina intermedia subbiernata, petiolo comm. carentia. Omnium folior. pinnæ amplæ, lo-batæ, incisæ, subtus glaucæ; reticulatæ, su-pra virides. Involuc. aut 0, aut uno, alterove fol. lanceol. concavo, membranac. viridi, ora rubente. Involucc. aut 0, aut ex paucis foliol. Umbel. ampla, rara, plana; radii 2-3-unc. a 10-ad 20. Umbellul. densior. convexior. Petal. parva, inflexo-cordata, alba, æqual. patentiss. Fruct. ovat-oblon. obtusus, compressus. Sem. fusca, odore, & sapore aromar.

4. *gallicum*. L. foliol. cuneiform. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. pag. 137. Pluk. phyt. tab. 198. f. 5. Garid. Aix. tab. 58.*

In Europa australi 24.

Caul. sulcatus, scaber. Fol. alterna, amplexicaul. pinnata: foliol. sessil. lacin. alternis, acutis, *Oxy. canthæ æmulis* Fol. variant longitudine, & latitudine.

5. *silaisfolium*. L. caul. glabro: radice multicipite; foliol. pin-natifid. lacin. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 44.*

In collibus saxosis 24.

Caul. subsupith--4--ped. erecti, flexuosi, striati, glabri. Fol. petiol. membranac. multiplicato--pinn. glabra. Pedunc. oppositifol. erecti, striati. Umbell. densæ, planiuscul. ex pl. radiis constantes, Umbellul. similes. Involucr. foliol. 1-paucis, linear. rarius pinnatifid. umbella du-plo brevioribus. Involucc. plura, linear. umbel-lul. longitudine. Petal. inflexa, alba, seu albo-flavescent. Sem. elliptica, glabra.

6. *angustifolium*. L. foliol. lanceol. integerr. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 19. f. 9. Pluk. alm. tab. 198. f. 4.*

In Europa australi 24.

Caul. 1-2-cubital. Fol. plerumq. opposita, petiol. hirsutus. Petal. alba.

7. *prutenicum*. L. foliol. lanceol. integerrim. extimis coalitis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 153. Breyn. cent. tab. 84. Riv. pent. tab. 29.*

In Borussia, Lipsia, Italiae dumetis, & sylvis ad alpium radices &c.

Planta pilosa. Rad. tenuis, ramosa. Caul. 2-4-ped. basi sæpe purpur. pilis albis, præsertim ad basin. Fol. facie *Cicutæ virosæ*, hirsuta petiolis, & costis. Foliol. cuneiformi--lanceol. confluentia, breviter mucronata, adulta sæpe ex fusco maculata. Umbell. plina. Umbellul. convexæ. Involucr. ex foliol. 6-9. margine membranac. albo. Involucc. simil. Petal. alba, ob apicem valde inflexum cordata, subodora. Sem. pubescent. acri-aromat.

8. *dauricum*. L. caul. maculato: foliol. pinnatifid. acumin. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 38.*

Ligusticum ferulaceum. All. tab. 60. f. 2.

In Dauria, & in alpihus Pedemontii &c.

Planta glabra, trita subodora. Rad. odore Apii. Caul. erectus, ramosus, fistulosus, linearis, nitidus, maculis circa medium atro--purpur. Fol. infer. 3--pinn. summa pinnata, vaginant. Foliol. lacin. plerisq. integerr. inæqual. supra fature virent. Umbell. convexula. Involucr. foliol. sub 6. Umbellul. parvæ, convexulæ, distantes: involucc. simil. Petal. oval-inflexa, æqualia, alba, aut subpurpur. Sem. subovat. glabra, fusca.

9. *peucedano-* L. foliol. lineari-lanceol. venoso-striatis, distin-
ides. *Syst. veg. ed. 14. Segu. ver. 3. tab. 7.*
Pluk. alm. tab. 96. f. 2.

In Baldi valle Vaccaria &c.

Caul. ped. 2-3. ramuscul. donatus; folio in exortu apposito. Fol. longe petiol. segmentis 2-3. uncial. divisa ad instar *Peucedani*. Petal. alba.

10. *Siler.* L. foliol. ovat--lanceol. integerr. petiolat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 145. Black. tab. 426.*

Siler montanum. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 3. f. 2. Ligustico Matth.

In Austria, Helvetia, Gallia &c.

Planta glabra. Caul. 6-ped. Vaginæ amplæ. Fol. 3-pinn. lata, lobata, glauca. Divisiones folior. patulæ, & angulum fere rectum cum costa facientes. Involucr. brevia. Umbella lata, convexa. Petal. alba. Sem. magna, aromatica. *Sem. Sileris sulcati absque membranulis; unde media inter Laserpitium, & Silerem Aquilegæ-folium. Scopul.*

11. *Chironium*. L. foliol. oblique cordat. petiol. hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Crantz. Austr. 3. tab. 1. f. 2. Folium. Panax &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 1. Panaces &c. Dod. pempt. 309.*

Monspeli 24.

Simil. *Pastinacæ opopon.* Planta tota hirsuta. Altitudo fere humana. Rad. sapore acerrimo. Fol. ampla; ut in *Angelica Archangelica*, obtusa, crenata, subtus glauca. Involuc. utraq. parva; un-versale foliol. coloratis, reflexis; partiale filiformibus. Umbel. ampla, hemiphær. conferta: umbellul. convexæ, confertæ. Petal. alba, patentia.

12. *ferulaceum*. L. foliol. linear. *Syst. veg. ed. 14. Cachrys &c. Tourn. it. 2. tab. 121. In Oriente 24.*

Caul. erectus, 4-ped. solidus. Fol. inferior. 3-ped. Fœniculac. foliol. 5-pinn. angustiss. lævia, laxa: caulina 2-3. min. Pedunc. axillar. Umbella radiis inæqual. Umbellul. subrotund. Petal. lutea, inflexa. Fruct. magnus. Sem. alis exarata.

13. *simplex*. L. scapo nudo, aphylo, simplici: fol. pinnat. multifid. acutis, linear. umbell. semiglobosa. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 71. f. 2. Vill. prosp. tab. 8. f. 3.*

In alpidus Aufirincis, Helveticis, Pedemontii &c. 24.

Ad Ligustici genus spectat.

Rad. magna, fetosa. Fol. firma, glabra, nitida, triplicato--pinn. ultimæ pinnæ argute lanceol. dimidiam fere lineam latæ, longiuscul. simplic. 2-3-fid. Caul. semiped. rectus, sulcatus. Fol. caulina radicalibus simil. sed parva, simpliciora. Umbel. densiss. utraq. purpur. Sem. 4. alis sum, grande, ovatum.

14. *Aciphylla*. L. caul. vaginato: petiol. folior. dilatat. fol. digitat. linear. elongatis, mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Aciphylla squamosa. Forst. gen.
In nova Zeylandia.
 Umbell. axillar. pl. vix petiolis ma.
-
- Halleri*. L. fol. triplicato-pinn. l. bulis lanceol. *Hall. helv. n. 79. tab. 19. All. Fl. Ped.*
In alpium pratis 24.
 Differt a *Ligustico ferulaceo*, fol. 4-pinn. non 3-pinn. pinularum segment. brevioribus, & confertioribus, sursum erectis, conniventibus, asperiusculis. & subtiliter in costa, & averfa folior. parte pilosis. Caul. plerumq. simplices. Umbel. densiss. Involucra foliol. simplic. & latioribus.
421. *HERA-CLEUM*. Fructus elliptic. compressus, striatus, vix emarginatus. gin. Cor. radiata, inflexo-emargin. Involuc. caducum.
1. *Sphondylium*. H. foliol. pinnatifid. fl. uniform. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 540. Riv. tab. 4.*
Sfondilio. Matth.
In Europæ pratis 24.
 Altitudo humana. Caul. crassus, sulcatus, fistulosus. Fol. perampla, fordide virent. duriora, scabra, utrimq. subhirsuta, pinnis semi-5-7-lobis. Umbell. maximæ. Involucr. mire ludit. Petal. alba, vel subrubra.
Datur vera var. angustifolia ab H. angustifol. Lin. diversa, quam habet Haller. & pingit Kniphof. cent. 5. n. 41. = altera fol. crispo.
2. *angustifolium*. H. fol. cruciato-pinn. foliol. linear. cor. flosculof. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 173. Pluk. phyt. 63. f. 3. Riv. pent. 5.*
In Svecia, Anglia 24.
 Statura prioris, sed foliol. angustiss. linear. ad petiol. comm. pinnata cruciatim, idest quaterna ad singula genicula, anteriore foliolo basi lobato. Fl. uniform. virides, albi, aut luteo-virid.
3. *longifolium*. H. folior. pinnis longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 174.*
Sphondylium &c. Riv. tab. 5.
In alpinis 24.
 Caul. 2-4-ped. pilis albidis adpersus, striato-sulcatus. Fol. pinn. semi-1-ped. lanceol. oblon.

acutæ, supra glabræ, subtus asperæ. In tenella planta fol. palmata in longas lacin. involucr. aut o. aut foliol. linear. acutis. Petal. alba, exter. ma.

4. *Sibiricum*. H. fol. pinnat. foliol. quinis, intermediis sessil. corollul. uniformibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria ♂.

Caul. profunde sulcatus, hispidus. Fol. convexa, lævia. Petal. virid. incurvata, non emarginata. Involuc. o. Fol. vaginæ basis barba alba, densa.

5. *Panaces*. H. fol. pinnat. foliol. quinis; intermediis sessil. fl. radiat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Apenninis, Sibiria ♂.

Caul. paulo humilior vulg. Fol. lacin. latiores, & minus asperæ, pallidior. quandoq. pene integre, subtus tomentosæ. Petal. alba.

6. *austriacum*. H. fol. pinnat. utrimq. rugosis, scabris: fl. subradiat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 61. Crantz. Austr. tab. 1. f. 1.*

In alpinis Austriacis

Differt a priore fol. q. scabris, venoso-rugosiss. virid. & pedunc. j.

Fol. variantia. Fol. radical. magis rotundata; caulina lanceol. eximo in plerisque subtrilobo. Involuc. foliol. alternis, min. Petal. alba.

7. *alpinum*. H. fol. simplic. fl. radiat. *Syst. veg. ed. 14. Sphondylium &c. Bauh. prodr. tab. 83. Barr. ic. 55. In Helvetiæ alpinis* ♀.

Videtur var. prioris, cum Austriacum spontaneum fol. scabris: alpinum sicut fol. supra laxis evadat.

Caul. ped. Fol. radical. cordat. sublobata, dentata, glaberr. petiol. caulem amplectente, ruberrimo, sulcato: summa brevius petiol. subcuneiform. ferrata. Petal. semper alba.

elegans.

H. *Crantz. Austr. tab. 2. f. 1.*

H. *angustifolium. Jacq. Austr. 2. tab. 175. Boeckm. tab. 99.*

In Austria, Pedemontio ♀.

Caul. 1-4-ped. Fol. lacin. angustæ, non longæ, confluentes. Fol. plerumq. ternata. Fructificatio H. *longifol.*

422. **LIGUSTICUM.** Fruct. ovat-acum. 5-costatus, costis subulatis, non rostratus. Involucr. utraq.

1. *Levisiticum*. L. fol. multiplicibus: foliol. superne incis. Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 275. Ludw. ed. tab. 164. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 3. f. 1.

In apenninis Liguria 24.

Altitudo humana. Fol. 2-pinn. Seleri æmula, lobata, angulata: foliol. opposita, sessil. odore valido. Petal. lutea. Sem. alarum, ala laterali membranacea, & costæ 3 in dorso subulatae, lateralibus ma.

Ad Angelicæ genus spectat.

2. *scoticum*. L. fol. biternatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 207. Pluk. alm. tab. 96. f. 2.

Seseli &c. Herm. par. tab. 227.

Ad litora maris in Anglia, Svecia, Dania, Canada 24.

Sapor Apii. Caul. ped. & ultra, ramosus, paucifl. Fol. infer. longe petiol. læte virent. glabra, firmiora, lacin. subrotund. subtus lucida. Fl. parvi, albo-flavescent.

3. *peloponense*. L. fol. multiplicato-pinn. foliol. pinnatim incis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 13. Gmel. Sib. 1. tab. 45.

Cicutaria &c. Moris. umb. tab. 6.

Seseli &c. Cam. epit. 514. Math. 753.

In Peloponesiacis, Sibiria, Carniolicis &c. montibus nemorosis 2.

Fol. circumscrip. ampliss. infer. 3-pinn. caulium superius 2-pinn. summa opposita, terna, quina, firma: pinnæ longe lanceol. crassæ, striatæ, fistulosæ. Umbel. terminal. ampla, densa, convexa: cæteræ min. Pedunc. patentiss. Involuc. utraq. reflexa; universale ex 5-6 foliol. parziale ex 2-3. Petal. alba. Fruct. oblongus, non rostratus, profunde sulcatus, seu striatus, glaber.

4. *austriacum*. L. fol. bipinn. foliol. confluentibus, incis. integerrim. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 151. All. Fl. Ped. tab. 43.

Seseli I &c. Clus. hist. 2. p. 193.

In Italia, Austria &c. alpinis.

Nimis adfines prior. Caul. 2-3-ped. fistulos. superne ramosus. Fol. radical. ampliss. supra obfcura, subtus pallidiora. Involuc. polyphyll.

ora alba, membranac. involuoc. foliol. sub
6. Umbel. magna, radiis sub 40. Fl. magni,
albi, odori.

5. *cornubiense*. L. fol. (caulinis) decomposit. incis. : radical.
ternatis, lanceol. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

Smyrniac. &c. Raii angl. 3. tab. 8.

Saxifraga &c. Pet. herb. tab. 26. f. 9.

In Cornubia.

Caul. sesquiped. striatus, fistulos. pallidus. Fol.
late virid. fusco varieg. Petal. alba.

6. *peregrinum*. L. umbellæ primariæ involuc. subnullo; latera-
lium basi membranaceo; radiis subramosis. *Syst.*
veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 18.

In Lusitania ♂.

Simile Petroselino, etiam odore, & sapore, sed
omnia crassiora, & rigidiora. Caul. 2-ped. an-
gulat. rigidus, lævis. Fol. supradecomp. sum-
ma ternata: foliol. 3-part. lacin. cuneatis, in-
cis. glabris *Petroselini*, sed ma. Petioli la-
teribus membrana alba. Involuc. umbellis tri-
plo brevius. Involuoc. linear. longitudine um-
bellul. Petal. flavescent.

7. *balearicum*. L. fol. pinnat. foliol. inermis auctis foliolo. *Syst.*
veg. ed. 14.

In Balearibus; Roma ♂.

Caul. ratione umbell. parvus, ped. unica umbel-
la, teres, substriat. Fol. radical. spith. am. Fo-
liol. 5-7. sessil. subcord. obtusa, serrata,
glabra, subtus nitidiora; impari latiore, vix
lobato (Fol. *Sisari*.) Fol. caulina 2-3. parva,
petiol. 3-part. laciniat. linear. Umbel. magna,
rigidula: umbellul. sub 13. Involuc. poly-
phyll. lineare, subulat. reflexum. Involuoc.
similia. Petal. lutea. Sem. oblon. subcylind.
striata.

pyrenaicum. L. fol. 4-duplicat-pinn: foliol. aristat. integris,
multifidisve. *Gouan. Illuf. tab. 10. f. 2.*

In Pyrenæis, & alpibus Valdensium 24.

Caul. 2-cubit. paniculat. statim a radice ramo-
sus, ramis retroflexis, unde habitus plantæ
veluti sphæricus, rigidus, sulcato-angulat. Fol.
circumscript. 3-angul. 2-ped. Pinnæ utrimq. 9
totidemq. pinnul. Petiol. compressi. Vaginæ
amplæ. Caulina fol. minus composita. Rami

summi confluent. Umbell. densæ. Involuc. sæpe 6. Involucc. integra, aut dimidiata. Petal. alba. Fruct. *Conii maculati*, costis 3. in dorso membranac.

(Retz.) L. peloponense. Retz. Obs. fasc. 2. L. S. N. ed. 13. p. 233.

Habitat

Caul. 3-ped. flexuos. teres, leviter striatus, glaber. Fol. radical. 2-3. tripinn. Petiol. fistulosus, teres, 3-fid. petiol. partial. 2-pinn. pinnis 3-4-iugis, intimo pari petiolat. reliquis sessil. Pinn. oblong-lanceol. acum. ad nervum usque incisæ, cæterumq. profunde dentatæ. Fol. caul. 1-2. Pedunc. terminalis; ad huius vero basin 4. alii verticillatim positi. Infra hos demum alii bini, remoti, alterni cum fol. 2 pinnato. Umbel. hemisphær. Involuc. 2-3-phyll. incisum. Sed illud umbel. terminalis 6-8-phyll. lineare. Umbellul. 24-30-peduncul. subgibosæ. Involucc. sub 3-fl. linear. vel lineari-lanceol. Petal. lanceol. involuta, integerr. carinata, candida. Fruct. 3-gonus, lucidus. Odor debilis *Cherophyl. syl.* sed seminum odor, & sapor *Angelicæ Archangelicæ. Cum Ligustico* Gmelin. Sib. 1. tab. 45. quod ad L. peloponense Lin. fuit relatum, nil certe comm. habet.

413. ANGELICA. Fruct. subrotund. angulatus, solidus, alis 2 marginalibus. Cor. æqual. petalis incurvis.

1. *Archangelica*. A. folior. impari lobato. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 206. Black. tab. 496.

Smyrniurn Cordi, Lob. ic. 699.

Angelica domestica. Matth.

In alpinis Lapponiæ, Austriæ &c. ad rivulos &c.

Altitudo etiam humana. Succus lacteus, per siccitatem flavescens. Fol. magna, 2-pinn. Foliol. opposita, sessil. subtus dilutiora, imparima. Umbel. ampla, copiosa, radiis angulatis. Vagin. maximæ, ventricosæ. Involuc. sæpe 1-fol. Umbellul. globosæ. Involucc. polyphyll. linear. reflexa. Petal. subvirid. ovata, acuta, caduca. Stam. alba.

2. *sylvestris*. A. foliol. æqualibus, ovato-lanceol. serratis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 152. Sabb. hort. 4. tab. 85. Ludw. ed. tab. 178. 179. Riv. tab. 17.

Angelica salvatica : *Matth.*

In Europæ frigidioris subhumidis, sylvaticis 24.

Ad Seleni genus spectat.

Fol. non lobata, fordide virentiâ, glabra. Petal. rubella. Sem. margine subrubro.

3. *verticillaris*, A. fol. divaricatiss. foliol. ovat. ferratis: caul. pedunculis verticillato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 130. Pluk. alm. tab. 134. f. 1?*

In Italia, secus torrentes ♂.

Odor A. sylvest. Altitudo humana, & ultra.

Caul. rore glaucescen. Rami floriferi verticill.

4-5. idque bis, vel ter, aliis peduncul. supra

alios in apice caul. Fol. decomposita; petiol.

fartis, ramification. divaricatiss. basi nodosis.

Fol. radical. ampliss. 2-ped. & ultra, supra

sature virent. nitida. Foliol. glabra, 2-3-lo-

bata, extimo non decurrente. Petal. parva,

inflexa, integra, cum flavedine virescent. Sem.

cordato-orbicul. obtusa, valde compressa, lævia.

4. *atropurpurea*. A. fol. extimo pari coadunato: foliol. terminali petiol. *Syst. veg. ed. 14. Corn. canad. tab. 199.*

In Canada.

Caul. orgyal. crassitie vix brachii, fistulos. articul.

lævis, atropurpur. rore glauco. Petiol.

vaginant. striati. Foliol. oblon. sublobata, fer-

raturis apice albis, venosa, nuda, subtus pal-

lida, pleraq. sessil. Umbel. terminal. 3. vagi-

nis 2. purpur. apice foliosis. Involuc. o. In-

volucc. foliol. 12. subulatis, longitud. umbel-

læ. Umbellul. hemisphær. Petal. incurva, stam-

in. breviora, extus ferrugin. intus purpurasc.

Sem. convexa, tricarinata.

Vehemens est venenum.

5. *lucida*. A. foliol. æqual. ovat. inciso-ferrat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 24. Corn. Canad. tab. 197. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 3. f. 8.*

In Canada ♂.

Radix sapore Apii. Caul. 1-2-ped. fistulos. ni-

tidus. Vaginæ amplæ, virent. Fol. radical.

3-pinn. cætera 2-pinn. supra lucida, atrovi-

rent. subtus nitida, extimo cum proximo pari

confluente. Umbel. densæ, convexæ. Petal.

fordide pallent.

*Raqulit.*A. fol. 2-pinn. foliol. lanceol. ferratis, decurrent. *Gouan. Ilust. tab. 6.**Panax alpina* &c. *Bocc. tab. 99.**In Pedemontii pratis* 24.

Habitus A. *Archangel.* Caul. 3-ped. angulato-striatus, lævis, ramis 3-4. Fol. primordial. femipalm. facie *Sambuci*, ambitu triangul. ternata, pinnul. 2. inferior. opposit. quinaris: summo foliol. lanceol. ferratis, subtus pubescent. Radical. & caulina infer. etiam ambitu triangul. fere pedal. pinnul. sæpius 5. In infimis pinnul. foliol. ex quolibet latere 4 cum impari. In secundis pinnulis 2-3. In terminal. pinnul. foliol. uniform. sessil. lanceol. ferrata, cristata. Hæc foliol. per paria ad nervum coacta decurrunt per petioli longitudinem usq. ad infer. Fol. supra virid. subtus cinerea, pubesc. Umbel. ampliss. hemisphær. radiis pubescentibus, cinereis. Involucr. foliolo setaceo. Involucc. foliol. 4-5. Cor. primum purpurasc. dein alba. Fruct. ovat-oblong.

424. **SIUM.** Involuc. polyphyll. Fl. æquales, fertiles. Petal. cordata. Fruct. oblongo-ovatus. Sem. ovata, leviter striata, intus plana, calyc. minimo coronata.

1. *latifolium.* S. fol. pinnat. umbella terminali. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 66. Fl. Dan. tab. 246. Sabb. hort. 4. tab. 75. Riv. tab. 78. fig. optima.*

S. medium. *Bauh. hist. 3. pag. 173.**In Europæ rivulis, & ad ripas paludosas* 24.

Planta glaberrima. Altitudo sæpe humana. Foliol. lanceol. elliptica, utrimq. 3-4. cum impari, argute ferrata, læte virentia, glabra; aliquando varia. Fol. sub aqua quandoq. capillaria. Umbel. ampla. Involuc. 5-8-phyll. margine membranac. albido; involucc. paucifol. Fl. maiusc. albi.

2. *angustifolium.* S. fol. pinnat. umbell. axillar. pedunculat. involucro pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 67.*

S. nodiflorum. *Fl. Dan. tab. 247. fig. optima.**S. minus.* *Riv. pent. tab. 79. fig. optima.**S. verum.* *Math. Dalech. hist. 1012.*

In Europæ austral. æquis; nec extra aquas ascendit 24. Planta

- Planta glaberr. trita odora. Caul. 2-3-raro 4-ped. potius diffusi, ramosi, fistulosi, sæpe purpur. Fol. vaginant. minora. Foliol. sessil. lanceol-oblong. aut subovata, acuta, quandoque laciniata, aut profunde serrata, numero, & forma varia. Fol. prima caulinis simil. sed auriculæ nullæ. Umbell. convexa: umbellul. hemisphær. Involuc. lanceol. Sem. odorata, acris.
3. *nodiflorum*. S. fol. pinnat. umbell. axillar. subsessil. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 5. f. 3.*
In Europa ad ripas fluviorum.
 Caul. ramosi, diffusi. Fol. aliqua pinnata, pinnis simplic. vel auriculat. caulina appendicul. pallide virent. dentata, glabra. Fol. impar non 3-fid. Involuc. magna, latifol. 3-dent. universale sæpe deest. Fl. parvuli, albi.
4. *Sisarum*. S. fol. pinnat. floralib. ternat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 76. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 4. f. 8.*
In China? 24.
 Radice e Napiform. pl. ab uno cespite pendentes, crassitie digit. cortice albedo, pulpa candida, sapore dulci, aromat. Caul. 2-ped. ramosi. Fol. minutim serrata. Petal. alba. Sem. fusca.
5. *Ninfi*. S. fol. pinnat. ferratis; rameis ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 29. f. 1. Black. tab. 514. Kämpf. amæn. tab. 818.*
In China 24.
 Rad. fasciculata. Caul. sesquiped. Vaginæ amplexicaul. Fol. primum solitar. rotunda, cordata, dentat. uncial. dein *Sisari* fol. simil. pinnis sesquiunc. ovat-acut. dense ferratis. Petal. alba. Sem. obscure rubescent.
- Est S. Sisarum in hortis japonicis fraude chinensium cultum.*
6. *rigidius*. S. fol. pinnat. foliol. lanceol. subintegerr. *Syst. veg. ed. 14.*
Oenanthæ &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 7. f. 1.
In Virginia 24.
 Rad. fasciculat. Caul. 2-3-ped. inferne ramosus, rigidulus. Fol. ampla, 5-6-iuga cum impari, rigida, ad apicem dentata. Petioli canalicul. Umbell. amplæ, planæ. Fl. parvi, albi.
7. *japonicum*. S. fol. pinnat. foliol. incis: umbell. terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
Tom. II.

Caul. erectus, flexuosus, superne ramosus. Fol. glabra; infima maxima: pinnæ difform. oblong. ovatæ, integræ, incisæ, patentes: superior. minuta; foliol. lanceol. Umbell. compositæ.

8. *Falcaria*. S. foliol. linearib. decurrentibus, connatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 257. Riv. pent. tab. 47.*

Anni &c. *Morisi hist. 3. f. 9. tab. 8. f. 1.*

In Europa 24.

Caul. 1-2-ped: diffusus. Fol. dura, glauca, simplic. ternata, aut difformiter pinnatifid. lacin. longis, angustis, dentatis, & pallide viridib. Umbell. plena, non densa. Petal. alba.

9. *græcum*. S. fol. omnibus 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Græcia.

Caul. rectus. Fol. radical. semi-vel pedal. Pinnul. lanceol. ferratæ. Petal. lutea.

10. *ficulum*. S. fol. radicalibus ternatis; caul. 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 133.*

Daucus &c. Mont. in Zann. tab. 128.

In Sicilia.

Planta vitida. Caul. cubital. Fol. crassa, supra late virent. subtus albescent. Petal. crocea. Fol. variant, etiam radical.

11. *repens*. S. caul. repente; foliol. subrotund. dentato—angulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. Austr. 3. tab. 260.*

In pratis udis.

Non est *Sison inundatum*. Caulic. herbac. nitidi, undiq. diffusi. Fol. impari-pinn. foliol. opposit. sessil. ovat-subrotund. terminal. 3-lobis. Umbell. oppositifol. Umbellul. hemisphær. densæ. Petal. lanceol. alba.

12. *decumbens*. S. caul. decumben. fol. 2-pinnat. *Syst. veg. ed. 14.*

Thumb. Jap.

In Japonia.

Caul. pusillus. Fol. radicalia, longe petiol. glabra: foliol. 3-fida. Umbell. terminal. subsimpl. Sem. ovata, obtusa, styliis persistentibus, striata, glabra.

425. *SISON*. Involucra paucifol. sub 4-phyll. Petal. cordata, æqualia. Fruct. ovat-oblongus, parvus. Sem. subtiliter striata.

Carum, Bunium, & Sison adfinia sunt genera, ut ægre distingui possint.

1. *Amomum*. S. fol. pinnat. umbel. erectis (*pedunculat.*) *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 17. Black. tab. 442.*
Petroselinum &c. Dod. pempt. 697.
In Angliæ humidis lutosis; in Carniola, & Pedemontio, ad sepes ♂.
 Caul. erect. 2-ped. filiform. striatus, glaber.
 Fol. petiol. late virid. tenera, glabra, 4-iuga.
 Foliol. ovata, obtusa, incisa, serrata: summa tenuius divisa; terminale 3-fidum.
2. *segetum*. S. fol. pinnat. umbell. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 134. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 5. f. 6.*
In Anglia, Helvetia &c. ♂.
 Caul. pl. 3-ped. Fol. appendicul. Pinnæ ovatæ, argute, & cum brevill. aristis serratæ. Umbel. pauciflora. Petal. late ovat. alba, vel purpur.
Ad Seseleos genus spectat.
3. *canadense*. S. fol. ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Myrrhis &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 11. f. 4. Riv. pent. tab. 53. Pluk. phyt. tab. 383. f. 2. In Amer. septentrion. 24.*
 Rad. fascicul. fibrillosa. Caul. erect. 2-ped. & ultra, parum ramosus, teres, glaber. Fol. petiol. subtus pallidiora, glabra. Foliol. argute serrata, intermedium subpetiol. cætera sessil. radicalia folio medio 3-fid. lateralibus 2-fid. Umbell. 4-fid. inæqual. involuc. nullo. Umbellul. sub 7-fl. involucc. minimis. Petal. alba, æqualia. Sem. glabra.
4. *Ammi*. S. fol. 3-pinn. radicalibus linear. caulin. setaceis: stipularibus longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 200.*
Fœniculum &c. Shaw. Afr. tab. 232.
Ammi &c. Lob. iv. 724.
In Lusitania, Apulia, Ægypto ☉.
 Planta tota glabra, & trita aromatica. Caul. ped. subdichot. nitidus. Vagin. margine membranac. Foliol. sessil. replicato-imbricata. Umbel. inæqual. planiuscul. & raræ. Involuc. nulla. Petal. albida. Fruct. parvus, compresso-subrotund. Sem. hinc plana, inde gibba, 5. striata, e rufo-spadicea, odore sem. *Apii.*
5. *inaundatum*. S. repens; umbell. 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 89.*

- Sium* &c. *Morif. hist.* 3. f. 9. tab. 9. f. 5. *Pluk. phyt.* 61. f. 3.
In Europa inundatis ♂.
 Planta parva. Fol. immersa capillac. fusca: super. 1-2-iuga, medio ma: semitrilobo: caulinum sessile 3-lobat. Umbell. minimæ, 8-fl. Petal. alba. Sem. fusca.
6. *verticillatum*. *S. foliol. verticillat. capillaribus. Syst. veg. ed.* 14. *Daucus pratensis Dalech. hist.* 718.
In Gallia, Pyrenæis ♀.
 Rad. fasciculata. Caul. cubital. ramosus, paucifol. Involuc. utraq. Petal. primum rubra, dein alba.
7. *falsum*. *S. fol. radical. compositis, foliol. subverticillato-fascicul. lanceol. caul. aphyllis: ramis umbelliferis, dichotom. Syst. veg. ed.* 14. *Lin. Suppl. In falsis limosis circa W'osgam.*
 Fol. radicalia, brevia. Pinnæ oppositæ, oblong. par primum decompositum; reliqua vero non. Fol. margine membranac. alba. Umbell. parvæ, erectæ. Involuc. parva, subulata.
426. **BUBON**. Fruct. ovatus, striatus, villosus.
1. *macedonicum*. *B. foliol. rhombo-ovat. crenat. umbell. numerosiss. Syst. veg. ed.* 14. *Subb. hort.* 4. tab. 60. *Black. t. b.* 382.
Petrofelinum &c. *Lob. ic.* 708.
In Macedonia; Mauritania ♂.
 Caul. villosus, apice albicans. Fol. incana: infer. 2-pinn. super. pinnata. Umbel. ex 10-radiis. Petal. alba.
2. *Galbanum*. *B. foliol. rhombeis, dentat. striatis, glabris: umbell. paucis. Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 3. tab. 36.
Ferula &c. *Herm. par. tab.* 163.
Anisum &c. *Pluk. alm. tab.* 12. f. 2.
In Æthiopia ♀.
 Caul. frutesc. 5-ped. & ultra, rore glauco adspersus, nodosus, inferne aphyllus, ramis subpurpur. Fol. alterna, petiolar. pinnato-trinervata, vaginant. Polioli. sub 3-loba, argute ferrata, inferne integerr. rigidula. Umbell. magnæ, densæ. Involuc. polyphylla. Petal. cum virore flavescent. Odor aromaticus.
3. *gummiferum*. *B. foliol. glabris; inferior. rhombeis, serratis; superior. pinnatifid. 3-dent. Syst. veg. ed.* 14. *Ferula* &c. *Comm. hort.* 2. tab. 58.
In Æthiopia ♀.

Caul. 6-7-ped. frutescens subramosus. Umbell. expansæ. Fl. parvi, lutei.

4. *rigidius*. B. foliol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Perula &c. Bocc. mus. 2. tab. 76. Barr. rar. tab. 77. In Sicilia 24.

427. CUMI- Fruct. ovatus, striatus. Umbellul. 4. Involuc.
NUM. 4-fid.

1. *Cuminum*. C. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 2. Riv. pent.*

C. sativum. Cam. epit. 518. fig. optima.

In Ægypto, Æthiopia ☉.

Caul. ped. a basi ramosus, flexuosus, divaricato-panicul'. Fol. pauca, capillacea, linear. rara, 2-fid. impari foliol. 3-fid. Umbel. inæqual. paucifl. radiis 4-6. patentibus: rotundæ. Petal. alba, seu purpurasc. Sem. ex cinereo-subflava.

428. ENANTHE. Fl. radiati, disco sterili. Petal. inæqualia. Fruct. ovatus, cal. insigni, 5-dent. coronatus. Sem. ovatum, non acuminat. striatura, intus planum.

1. *fistulosa*. C. stolonifera: fol. caulinis pinnat. filiform. fistulosi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 846.*

C. aquatica &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 7. f. 8. Riv. pent. tab. 65. Camer. epit. 611. fig. exterior.

In Europæ paludibus 24.

Rad. quandoq. bulbifera. Caul. 1--sesquiped. debilis, brachiat. subnudus, fistulosus. Fol. glauca, glaberr. infer. 2-pinn. foliol. ovatis, profunde incis. Umbellæ disjunctæ. Involuc. 0-1-fol. Involucc. dimidiata. Petal. alba, extus subrubella.

Var. fol. latis, obtusis.

Diversa adparet in æstate.

2. *crocata*. C. fol. omnibus multifid. obtusis, subæqual. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 55. Black. tab. 575.*

C. cicutæ facie &c. Ad. Angl. 1747. tab. 3.

In Europæ paludibus 24.

Caul. 2-ped. ramosiss. striatus, rufus. Fol. pallide virent. succo flavo, venenato scatentia; alia pinnata, alia sæpius 2-pinn. Foliol. cucinata, incisa, lineata, lævia. Pedunc. angulati, striati. Involuc. nullum. Petal. alba, inflexa, tamen acuta. Anth. fuscæ.

3. *prolifera*. C. umbellarum peduncul. marginalibus longioribus, ramosis, mascul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq.*

hort. 3. *tab.* 62. *Morif. hist.* 3. *f.* 9. *tab.* 7. *f.* 5.

In Sicilia, Apulia 24.

Rad. ex pl. tuberibus conflata. *Caul.* erect. sesquiped. subramos. angulato-striat. *Fol.* subtriplicato-pinn. vaginant. foliol. (circumscript. subovata, aut magis subrotunda) obtusis, incis. Umbell. radii laterales 3-4. divaricati, horizontal. Disci floscul. subsessil. conferti in hemisphærium. *Involuc.* subnullum. *Umbellul.* in principio densiss. parvæ, convexæ.

4. *globulosa*. *Æ.* fructibus globosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Gouan. Illuf. tab.* 9.

In Lusitania, & herbidis subhumidis agri Nicæensis 24.

Facies sequentis, sed caulis minus ramosus, & fol. lanceol. circumscript. non triangul.

Rad. tuberosa pendula. *Caul.* ped. & ultra, basi angulatus, & sæpe purpurasc. *Fol.* radical. priora ternata quinata; foliol. aliis lanceol. aliis cuneiform. integris-2-3-lobis, venosis, glabris. *Fol.* subsequa 2-pinn. foliol. opposit. lanceolat. 2-3-fid. acuminat. summa pinnata, foliol. angustioribus. *Sem.* Coriandro ma.

5. *pimpinelloides*. *Æ.* foliol. radical. cuneatis, fissis: caulinis linear. integris, longissim. simplicibus. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* 4. *tab.* 394. *Sabb. Hort.* 4. *tab.* 83.

Æ. aquatica &c. *Pluk. alm. tab.* 49. *f.* 4. *mala. Enante II. Matth.*

In Europa australi 24.

Caul. sub-pedal. angulatus. *Fol.* radical. omnino Petroselinæ, sed crassiora, lata, ex virore pene lucida. Umbell. inæqual. *Involuc.* subulato-setac. *Cor.* albæ, parum radiatæ. *Fol.* valde variant.

peucedanifolia. *Æ.* fol. omnibus linear. radicalibus 2-pinn. caulinis pinnat: *involuc.* nullo: radicem napulis ovatis, sessil. *Pollich. pal. f.* 3.

An *Æ.* fol. radicalibus duplicato-pinn. linear. recurvis? *Hall. helv. n.* 756.

Rad. ex pl. albis glomerulis, cylindrico-ovat. constans. *Caul.* cubital. erectus, sulcatus, basi

rubellus, geniculat. dichotomus. Fol. alterna, vaginantis, triangular. lacte viridia, glabra. Umbell. radiatæ. Petal. alba.

Karstia. *Æ. Hacquet, pl. alp. Carn. tab. 3.*

In Carniola 24.

Sapor *Æ. pimpinelloidis, cui similis*. Rad. subcarnosa, ext. is fusca, intus albida, tortuosa. Caul. sicuti tota planta, glaberr. foliatar. 2-ped. rotundat. subulriatus. Fol. radical. 2-pinn. costa ad basin vaginante, semiamplexicaul. subultriat, circumscript. oblonga, vel elliptica; pinnis sessil. lanceolat. subovat. acutiuscul. serrato-incisis: caulina pinnata: summa ternato; pinnul. integris, linear. aut lanceol-acut. Umbell. convexæ, ex 10-12. radiis: involucri. paucifol. Umbellul. parvæ, subrotund. densæ; radiis exterioribus paulo longioribus: involucri. setacea. Petal. alba. Fruct. subrotund. striati.

429. *PHELLANDRIUM*. Involucr. universale nullum. Petal. cordiformia. Floscul. disci minores. Fructus ovat. lævis, obiter 3-striat. coronatus perianth. & pistillo.

1. *aquaticum*. P. folior. ramificationibus divaricat. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 72. Black. tab. 370. Riv. pent. tab. 64.*

Cicutaria &c. Lob. ic. 735.

In Europæ fuffis 8.

Caul. 3-ped. crassissim. dichotom. fistulosus, glaucus. Fol. ampla, alterna, amplexicaul. triplicat-pinn. super. 2-pinn. cinereo-virescent. glabra; foliol. pinnatifid. Fl. parvi, albi.

2. *Mutellina*. P. caul. subnudo: fol. pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 56. All. Fl. Ped. tab. 60. f. 2. Bauh. hist. 3. pag. 66.*

In Helvetia, Italia &c. 24.

Ad Ligustici genus spectat.

Caul. pedat. pene nudus, glaucus, genicul. crassiss. Fol. *Chærophylli*, longa magis quam lata, multifid. duriuscula, saturæ virent. glabra. Involuc. varium. Petal. parva, subrubent. inflexa. *Fructus maturus alam foliaceam deponit.*

430. *CICUTA*. Fructus subovat. sulcatus.

1. *viridula*. C. umbellis oppositifol. periol. marginatis, obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 208. Gunn. Fl. norv. tab. 2. Bluckv. tab. 574. a. b. c.*

Cicutaria. Riv. pent. tab. 76.

Sium aquaticum. Moris. umb. tab. 5.

In paludibus Europæ sterilibus 24.

Rad. grandis. Caul. teres, fistulosus. Fol. am-
pla, alterna, amplexicaul. circumscript. ellip-
tica, duplicato-pinn. obscure virent. glabra.
Foliol. ad 7. paria, lanceol. acute serrat. sim-
plic-2-3-5-fid. Umbell. patens, basi rubra.
Involucc. polyphyl. setacea, brevia. Petal.
alba. Fruct. compressus, truncatus.

2. *bulbifera*. C. ramis bulbiferis. Syst. veg. ed. 14.

In Virginia, Canada.

Caul. angulatus. Fol. lacin. capillaceæ. Petal.
alba.

3. *maculata*. C. folior. serraturis mucronat. petiol. membranac.
apice 2-lobis. Syst. veg. ed. 14.

Angelica &c. Pluk. alm. tab. 76. f. 1.

In Virginia aquosis.

Caul. altus, fusco-purpureo, sicuti & petioli,
inferne maculatus. Foliol. lanceol-acumin. Um-
bell. planæ. Petal. alba. Sem. odore, & sa-
pore Cumini.

431. *ÆTHU-
SA*. Involuc. o; Involucc. dimidiata, 3-phyll. pendu-
la. Fruct. subrotund. Sem. ovatum, intus pla-
num, maxime gibbum, 5-costatum.

1. *Cynapium*. Æ. fol. conformibus. Syst. veg. ed. 14. Black.
tab. 517. Riv. pent. tab. 75.

Cicutaria &c. Bauh. hist. 3. p. 179. Lob. ic. 280.
Inter Europæ olera, & sepes hortorum ☉.

Tota planta *Allium olet*. Caul. 1-4-ped. ramosi,
striati, glauci, ad basin sæpe purpur. Fol. 2-
pinn. nitida, tenera, supra atro-virent. subtus
pallidiora; pinnis pinnatifid. pinnulis ovat. a-
cutis: ad *Petroselinum* accedentia. Umbel. pa-
tens, radiis interioribus gradatim brevioribus.
Fl. numerosi, albi. Sem. subrotun. pallide
fusca. Involucr. o.

2. *Bunius*. Æ. fol. radical. ternatis, quinisque: caulinis 2-
pinn. linear. summis setaceis: umbell. 7-fidis.

Æ. fol. radicalibus pinnat. caulinis multi-partito-
setac. Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 198.

Saxifraga &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 2. f. 16.

Bunius. Dalech. hist. 774. Bauh. hist. 3. p. 29.

In Pyrenæis, & Pedemontio ☉.

Planta glabra, odore ingrato. Caul. 2-ped. dif-
fusus, ramosus, purpur. Prima fol. simplic.

cordato-subrotund. semitriloba, ferrata: caulina (*Carvi*). Petioli vaginant. marginae involuti. Involucra lateris exterioris sæpius terna, setacea, flosculis longiora. Umbellul. 7-fl. Fl. æqual. albi. Sem. oblongiusc. fulcata, costis 3: dorsalibus membranaceo-compressis.

Ad Carum spectat.

3. *Meum*, *Æ.* fol. omnibus multiplicato-setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 303. Sabb. hort. 4. tab. 82.*

Meum. Riv. tab. 62. Dod. purg. tab. 62. Black. tab. 525. Ludw. ed. tab. 66.

In alpidibus Europæ 24.

Ad Ligustici genus spectat.

Rad. fetis coronata. Caul. ped. uno, vel altero fol. donatus. Fol. alterna, amplexicaul. pinnat. Foliol. brevia, in fasciculos circa nervum collecta, odore medicato. Umbel. convexa. Involuc. o-raro 1-phyll. Involucc. lateral. ut in toto genere. Petal. ex albo-virid.

432. CORI-
ANDRUM. *Cor. radiata. Involucr. 1-phyll. Involucc. dimidiata. Petal. inflexo-emargin. Fruct. sphaericus, aut didymus.*

1. *fativum*, *C. fructibus globosis. Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 92. Black. tab. 176. Ludw. ed. tab. 37. In Italiae agris ☉.*

Caul. 1-2-ped. Fol. obscure virent. infer. duplicato-pinn. pinnul. latis: superior. tenuiter incisæ. Involucc. 3--phyll. Petal. maiuscul. ex albo-purpurasc.

2. *testiculatum*, *C. fructibus didymis. Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 169. f. 2.*

C. minus, odorum. Bauh. hist. 3. pag. 91.

In Europæ austral. agris ☉.

Odor priore virosior. Caul. angulatus. Pinnul. fol. angustiores, magisq. divaricatæ, quam in priore. Umbell. sæpius simpl. Involucc. nulla. Petal. non radiata. Anth. purpurasc. Germina inferne didyma. Sem. ma: priore.

433. SCAN-
DIX. *Cor. radiata. Petal. emarginata. Floscul. disci sæpius masculi. Fruct. subulatus.*

1. *odorata*, *S. semjn. fulcatis, angularis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. app. tab. 37. Black. tab. 243. Riv. tab. 56. Dod. pempt. 701.*

In alpidibus 24.

- Caul. 4-5-ped. ramosus, villosus. Fol. circumscript. triangular. ampla, triplicato--pinn. villosa, mollia, albida, odore *Anisi*. Involuc. caducum. Petal. albida, exter. maiora. Sem. nigricant. nitida.
2. *peden.* S. femin. rostro longiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 263. Fl. Dan. tab. 844.*
Scandix Riv. pent. tab. 37. Bauh. hist. 3. p. 71. Inter Europæ austral. segetes ☉.
 Caul. pedal. Fol. multiplicato--pinn. firmiora, subhirsuta, sordide virent. Involucc. apice incisa. Fl. pauci, albi. Sem. *Geranii*, longiss.
3. *Cerefolium.* S. femin. ovat-subulat. nitidis: umbell. ad nodos sessil. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 390. Sabb. hort. 4. tab. 88.*
Chærophylloides &c. Black. tab. 236. Knorr. del. hort. 2. tab. C. 8. Riv. tab. 42.
In agris, & arvis Europ. austral.
Sapor aromaticus. Caul. sesquiped. Geniculi distantes, turgescant. Fol. 3-pinn. molliss. subvillosa. Umbell. rariores. Involuc. o. Involucc. 2. foliol. rubris. Fl. pauci, albi.
4. *Anthriscus.* S. femin. ovatis, hispidis: cor. uniformibus: caul. lævi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 154. Fl. Dan. tab. 863.*
Caucalis folio &c. Riv. tab. 34.
Myrrhis &c. Colum. ecphr. 1. tab. 112.
In Europæ aggeribus ☉.
Odor fœtidus. Caul. 1-3-ped. ramosus: vaginæ magnæ. Fol. triplicato-pinn. mollia, tenera, hirsutula, læte virent. nitida. Umbel. parvæ, & raræ. Fl. multi, albi. Sem. e fusco nigricant.
5. *australis.* S. femin. subulat. hispidis: fl. radiatis: caulibus lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Anisomarathrum. Col. ecphr. 1. tab. 90.
In Gallia narbonensi, Italia, Creta ☉.
An var. Sc. pedinis? Caul. vix semiped. Foliol. capillaria. Umbell. sæpius terminal. duæ.
6. *nodosa.* S. femin. subcylindricis, hispidis: caul. hispido: genicul. tumidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 25.*
Cerefolium &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 10. f. 4.
In Sicilia &c. ☉.
 Caul. sesquiped. scaber, aculeis mollibus reflexis; articulis superne incrassat. Fol. patula, scabra,

vaginant. subtriplicato-pinn. foliol. inciso-ferrat. etiam pinnatifid. lobis obrutis. Involuc. o. Involucc. parva, 2-3-phyll. subulata. Petal. alba. Fruct. hispido, pilis ascendentibus.

7. *trichosperma*. S. semin. hirsutissim. pilis sem. duplo longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ægypto ☉.

Caul. pl. obliqui, semiped. ramosi, flexuosi, fere glabri. Fol. 2-pinn. glabra, subtus pallidiora: foliol. ovat-lanceol. inciso-ferrata, margine scabra, petiol. subpilosis. Pedunc. oppositifol. Umbel. radiis 3-4. inæqual. Umbellul. rad. 10-12. subæqualibus. Involucc. foliol. 7. subulat. longitudine umbellul. Fl. uniform. carnei.

8. *infecta*. S. sem. exter. hispido: umbell. confertiss. hemisphæricis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 46.?*

Habitat

Caul. erect. subped. scaber. Fol. S. *Cerefolii*. Umbell. 5-fida. Involucc. 7-phyll. subulata, non reflexa. Fl. subradiati, albi. Sem. 2. interius non hispidum, sed tantum scabrum.

9. *grandiflora*. S. semin. peduncul. villoso brevioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Oriente.

Cor. maxima.

10. *procumbens*. S. semin. ovat-subulat. nitidis: fol. decompositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cerefolium &c. *Morif. hist. 3. f. 9. tab. 11. f. ult. In Virginia.*

Caul. procumb. ped. Fol. *Fumariæ*. Umbell. raræ, plerumq. ex 3. radiis. Petal. alba. Sem. nigricantia.

434. CHÆ- Involucc. reflexa, concava. Petal. inflexo-cordat. ROPHYLLUM. Fruct. oblong. lævis.

1. *sylvestre*. C. caul. lævi, striato; genicul. tumidiuscul. *Syst. veg. ed. 14 Jacq. Austr. 2. tab. 149.*

Cerefolium sylv. Riv. tab. 43.

Cicutaria &c. *Bauh. hist. 3. p. 11.*

In Europæ pratis montanis 24.

Caul. 3-ped. subfulcat. Fol. magna, multiplicato-pinn. nitentia, flaccida, pallide virent. Vaginarum oræ albæ, & denso villo pubescent. Umbell. planæ, non densæ. Petal. alba. Sem. nigra, nitida, non striata.

2. *bulbosum*. C. rad. bulbosa: caul. maculato, inferne hispido, superne glabro.

C. caul. lævi, geniculis tumido, basi hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 63.*

Cicutaria bulbosa. Bauh. hist. 3. p. 183.

Myrrhis &c. Pluk. alm. tab. 206. f. 2.

In Germania, Helvetia &c. ☉.

Rad. turbinata, seu obovata. Caul. seped. rufo-maculatus. Fol. multiplicat-pinn. pinnis pin-natifid. supra glabra, petiol. & carina pilis al-bis, vagis subtus adpersa. Invol. foliol. 5-7. inæ-qual. subulat. Petal. inæqual. obcordata, alba.

3. *aristatum*. C. caul. lævi, geniculis tumido: semin. hirtis, 2-aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Differt a C. bulboso, fol. hirtis, scabris: semin. villosis, aristatis. Caul. erectus, teres, striatus, glaber. Fol. 2-pinn. villosa, vaginis petiolor. ciliatis. Umbell. terminal. compositæ. Utraq. involuc. subulata, reflexa. Sem. oblong. stylis divaricatis, albo-villosa.

4. *temulum*. C. caul. scabro (maculato) geniculis tumidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 65.*

Myrrhis &c. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 10. f. 7.

In Europæ sepibus, viis &c. ♂.

Caul. 1-3-pedal. Fol. tenera, hirsutula, sordide virent. duplicato-pinnat. Pinnul. subrot-obtusæ, lobato-incisæ. Umbell. cernuæ. Involuc. sæpe nullum. Petal. inæqual. alba.

5. *hirsutum*. C. caul. æqual. foliol. incisis, acutis: fructibus biaristat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 148.*

Cerefolium &c. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 10. f. 6.

Cicutaria. Bauh. hist. 3. pag. 182.

Myrrhis palustris. Riv. pent. 50. bene.

In alpinis Germaniæ, Helvetiæ &c. 24.

*Planta pubescens odore fætido, viroso. Rad. præ-longa. Caul. sesquiped. teres, fistulosus. Fol. triplic-pinn. nudiuscul. subtus scabra, venis ci-liatis. Foliol. in singulis folior. ramulis vix ultra 5. Umbel. densa, convexa, ante anthesin nutans. Involucc. 5-phyll. lanceol. acumin. re-flexa, viridia, longitudine umbellul. Fl. non radiati. Petal. inflexo-cordata, albo-virent. aut subpurpur. Stam. cor. longiora. Fruct. sub-cylindrici, leviter striati. *Var. glabritie.**

6. *aromaticum*. C. caul. æquali: foliol. cordat. ferratis, integris: fructibus biaristat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 130.*
Cerefolium &c. Bocc. mus. 2. tab. 19.
In Austria, Lusatia &c. 24.
 Caul. 1-3-ped. una cum petiolis hirtus, inferne punctis atro purpur. Fol. *Ægopodii Podagrariae*, subbitern. vaginis pilosis. Umbell. plana, non densa. Involuc. o-paucifol. Involucc. foliol. 7-8. lanceol. reflexis. Fl. non radiati. Petal. alba, odora.
7. *coloratum*. C. caul. æquali: fol. supradecomposit. involucc. coloratis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 51.*
Myrrhis &c. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 10. f. 6.
Pluk. phytol. 100. f. 5. forte.
In Illyria 24.
 Caul. teres, hirsutus, præcipue inferne. Fol. *Selin. Thysselin*, adpersa pilis raris; infima hirsuta; media minus; summa nitida. Umbel. C. *sylvest.* Involucc. ovata, acumin. lutea. Petal. cordata, lutea. Fruct. C. *aurei*, nitidi, sed tenuius striati, a quo differt omnino foliol. pilisq. diversis.
8. *aureum*. C. caul. æquali: foliol. incis. semin. coloratis, sulcatis, muticis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 64.*
Cerefolium. Rupp. ien. 3. tab. 5.
Myrrhis &c. Lob. ic. 734.
In Germania, Helvetia &c. 24.
 Planta pubesc. Caul. 3-4-ped. angulat. striatus, fuscus, maculatus, incanus, aut purpur. inferne hirtus. Fol. odore aromatico, sed debili in senectute, pallida, supra glabra, subtus hirsuta; varia in diversis: radical. multo latiora; foliol. oblon-lanceol. extrema confluent. Umbell. planæ. Involuc. o-1-fol. Involucc. foliol. 5-6. lanceol. acuminat. reflexis. Petal. extrema mæ: alba, extus subrubra. Fruct. fusiformi-cylindr. Sem. oblon. glabra, 4. linear. extus obsolete angulata, fulcescent. cum angulis pallidioribus in nostris, non certe col. aureo. *Var. fol. hirsutioribus, & hirsutiss.*
9. *scabrum*. C. caul. æquali: foliol. incis. acutis, hirtis: pedunc. scabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. Jamma Ninsin. Kämpf. Am. exot. Fasc. V. p. 822.*
In Japonia.

Differt a C. hirsuto = foliol. min. & magis divisus, nec vaginis dilatatis: umbell. min.

Rad. fibrosa. Caul. erectus, ped. & ultra, subflexuos. angulatus, striatus, inferne glaber, superne hirsutus. Ramuli subfastigiati, alterni, patuli. Fol. 2--pinn. Umbel. terminal. Sem. ovat-oblon.

10. *arborescens*. C. fruticosum. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia B.

Caul. frutesc. Fol. *Charophyll. sylv.* ampla, supradecompos. pinnis patentiss. lævia, incisoferrata. Umbell. tenues, albæ.

435. IMPE- Fruct. subrotund. compressus, medio gibbus, mar-
RATORIA. gine cinctus. Petal. inflexo-emargin.

1. *Obstruthi-* 1. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 279. Riv. pent.*
um. *tab. 7. Camer. epit. 532. Garid. aix. ic. 55. Matth.*
Ad radices alpium Italia, Helvetiæ &c. ad rivulos præcipue 24.

Rad. obliqua. Caul. usque 6-ped. crassus, ramosus, sulcatus, fistulos. Fol. 3-ternata, sordide virent. venosa, glabra: foliol. lata, longedent. impar 3-lobum. Fol. floral. opposita. Stipul. petiolaris, membranac. ventricosa. Umbell. ampla, plana, laxa. Involuc. o-uno, alterove foliol. tenuiss. Umbellul. inæqual. concavæ. Involucc. brevia, polyphyll. Petal. albidæ, vel subflavescent.

Ad Selini genus spectat.

436. SESELI. Umbell. globosæ. Involuc. foliolo uno, alterove: involucc. polyphyll. Petal. cordata, reflexa. Fruct. subrotund. aut ovatus. Sem. ovatum, acuminat. intus planum, gibbum, 5-costatum.

1. *pimpinello-* S. caul. declinato: umbell. nubilibus mutantibus.
ides. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australiore 24.

Caul. pedat. teres, ante florescentiam decumb. dein suberect. foliol. uno, alterove, petiolo membranac. spathæform. oblong. e quo pedunc. simpl. Fol. radical. pinnata, pinnis multifid. segment. alternis. Involuc. o. Involucc. linear. angusta. Sem. 3. striis elevatis.

2. *montanum*. S. petiol. ramiferis membranac. oblong. integris: fol. caulinis angustiss. *Syst. veg. ed. 14.*

S. multicaule. Jacq. hort. 2. tab. 129.?

In Italia &c. collibus 24.

Rad. sapore *Dauci*. Fol. *Petroselinai* sapore: radical. pinnis pinnat. ab invicem distantibus. Vaginæ petiolor. undique caulem, & ramos ambientes. Umbel. seq. magis confertæ, radiis sub 13. inæqualibus. Fructus pubescens, duplo mai: sequenti.

3. *glaucum*. S. petiol. ramiferis membranac. oblong. integris: foliol. singularibus, binatisq. canalicul. levibus, petiolo longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 144. Ger. prov. 253.*

In Gallia &c. 24.

Planta glauca, & nitida. Caul. 2-4-ped. solitarius, quandoq. purpur. Fol. radical. 2-pinn. superior. pinnat. tandem simplicia. Foliol. longa, linear. uncial. terminalibus ad basin usque 3-fid. Umbella rara, convexa. Involuc. o. Umbellul. densæ, hemisphær. Involucc. foliol. sub 8. Fl. ante explicationem purpurasc. dein albi; anth. purpur.

4. *annuum*. S. petiol. rameis membranac. ventricosus, emarginat. (fol. triplicato-pinnat. linear.) *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 55.*

Fœniculum &c. Vaill. parif. tab. 9. f. 4.

Pimpinella &c. Riv. irr. tab. 82.

In Gallia, Germania &c. ☉.

Planta adulta rubens. Caul. spitham. & ultra, strictus, striatus. Foliol. profunde 3-fid. Umbell. convexa, & densa. Involuc. o-t-phyll. Involucc. foliol. pl. lanceol. umbellul. longioribus. Petal. albicanti-subviolac.

5. *Ammoides*. S. fol. radicalibus: foliol. imbricatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 52.*

Ammi &c. Mathioli Dalech. Lugd. 695.

In Italia, Lusitania ☉.

Differt a Sif. ammi, cum quo convenit in multis = involucc. polymorphis, setaceis, spatulat. aut 3-fid. Planta nitida. Caul. 2-pedal. ramosiss. Fol. 2-pinn. multifid. radical. oblonga, Millefolio simil. cætera magis subrotund. Umbell. multæ, radiis 4-5. divaricat. in ambitu; & 2-3 parvis in disco, absq. involuc. Involuc. radiis 2-3. parvis. Petal. alba, retusa. Anth. subviolac. Sem. parva, striata, sapore acri.

6. *tortuosum*. S. caul. alto, rigido: foliol. fasciculatis, linear. *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 685.*

- Foeniculum* &c. *Bauh. hist.* 3. p. 16.
In Europa australi ad rupes 24.
 Caul. 2-pedal. quasi lignosus. Umbell. radiis
 inæqual. umbellul. exiguæ, conglobatæ. Pl.
 parvi, albi.
7. *Turbith.* S. involucro 1-phyll. semin. striatis, villosis,
 stylatis: *Syst. veg. ed.* 14.
In Europa australi 24.
 Caul. semiped. Fol. supradecompos. Foliol. li-
 near, divaricata. Involucc. polyphyll.
8. *Hippomar-
 thrum.* S. involucell. connato-monophyll. (pelviformi-
 bus): *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* 2. tab. 143.
 S. articulatum. *Crantz. Austr. Fasc.* 3. tab. 5.
 f. 1. 2. *Riv. pent.* 66.
In Austria, Carniola, Pedemontio 24.
 Fol. 2-pinn. pinnis 3-fid. linear. Caul. subped.
 junceus, glaucus, ut tota planta. Supremæ
 fol. tantum vagina constant. Umbellul. inæ-
 qual. Involuc. o. Umbellul. breviss. densæ.
 Cor. alba, sæpe subpurpurea.
9. *pyrenaum.* S. fol. duplicat-pinn. foliol. incis, acutis, in-
 volucc. setaceis, umbellul. longioribus. *Syst.*
veg. ed. 14.
Selinum &c. *Ad. Helv.* VII. tab. 12.
Carvi alpinum Moris. hist. 3. f. 9. tab. 9. f. 2.
In Pyrenæis.
 Caul. pedal. teres, striatus, ad basin purpurasc.
 Fol. ambitu fere ovali: radical. longe petiol.
 vagina ampla, purpur. duplicato-pinn. laxa,
 parum divaricata. Foliol. pinn. acumin. cunei-
 form. Folium in caule sæpe unicum, ex cujus
 ala exit ramus. Umbell. oblong. nuda, radiis
 sub 8. Umbellul. breviss. confertæ, uniform.
 Involucc. polyphyll. setacea. *Facies aliena a*
Seselsos genere.
10. *saxifragum.* S. caul. filiform. divaricato: fol. duplicato-ter-
 nat. linear. umbell. sub 6-fid. *Syst. veg. ed.* 14.
Pimpinella &c. *Riv. pent.*
Ad lacum Genevensem &c.
Videtur var. Seselsos annui. Caul. 3-4-ped. ra-
 mosus. Fol. parva, raro lobata. Umbel.
 convexa, nuda. Umbellul. involucr. Involucc.
 setacea. Petal. alba.
11. *elatum.* S. caul. elongato, genicul. callosis: fol. 2-pinn.

pinnis linear. distantibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Gouan. Illuf. tab. 8.

In Aufiria, Gallia, Pedemontio, pascuis sterilibus, saxosis montium, & alpium 24.

Rad. napiformis, fetosa. Caul. sesquiped. subdichot. ramis divaricatis; summis angustiss. Fol. radical. & caulina inferior. 2-pinn. media pinn. summa foliolo unico ad apicem vaginæ. Foliol. teretia, rigida, mucronata, subcarnosa, supra sulco exarata: foliol. intermedium cæteris longius. Vagin. latæ, margine membranac. apice bilobæ. Umbell. 3 fida. Umbellul. confertæ, sub 8-fl. Involucc. breviss. integra. Petal. alba. Sem. tuberculata.

fragile.

S. fol. articulatis, fragilibus: foliol. linear. integris, binatisque; vaginis 2-lobis. *Gouan. Illuftr.*

Habitat . . . ♂.

Differt a S. montano & glauco. Sapor dulcis, & aromaticus. Caul. 2 ped. ramosus, strigosus, glaucus. Fol. ambita triangulari, palmat. articulata, tactu decidua, 3-pinnat. Caulina inferior. foliol. simplic. triplo longioribus: summa minus composita, longiora. Vaginæ amplæ, longæ, membranac. Umbell. terminal. & oppositifol. Involuc. nullum. Involucc. foliol. 7-9. umbellul. triplo breviora.

437. THAP- Involuc. nulla. Fl. æquales, petalis lanceolat.
 SIA. integris. Fructus oblongus, membrana cinctus, quæ supra, & infra ampliter truncata est, & emarginata.

1. villosa. T. foliol. dentat. villosis, basi coadunatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Thapsia 1. Clus. hist. 2. pag. 192.

In Hispania, Lusitania &c. 24.

Caul. cubit. & ultra, brachiatus. Fol. crassiuscul. & aspera, in alas oppositas subiecta, segment. longioribus, semunc. Umbell. lata. Petal. lutea.

2. fœtida. T. foliol. multifid. basi angustatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Black. tab. 459. Morif. hist. 3. f. 9. tab. 18. f. 7.

In Hispania 24.

Fol. longa, lata, hirsuta, venosa, segment. non
 Tom. II. M

oppositis, sed singularibus. Petioli hirsuti, rubent. Petal. lutea.

3. *Asclepium*. T. fol. digitat. foliol. 2-pinnat. setaceo-multifid. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 18. f. 9.*

Panax Asclepium &c. *Colum. ecphr. 1. tab. 86.*

In Apulia, Oriente 24.

Sapor acer. Caul. 2-3-ped. Fol. in orbem sparsa, segment. minutis, densis, *Millefolii* æmulis, hirsuta; petiol. 5-6. radiatim adnatis. Umbel. ampla. Petal. lutea.

4. *garganica*. T. fol. pinnat. foliol. pinnatifid. lacin. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. tab. 10. Pluk. tab. 67. f. 2. Bauh. hist. 3. p. 50. Magn. monsp. tab. 286.*

In Barbaria, monte Gargano Apulix 24.

Caul. 1-2-cubit. glaucus, glaber, nitens. Fol. decurrent. glabra: radicalia priora sesquiuunc. longe petiol. ovat-lanceol. integerr: secunda ternata, quinata, lobis raro 2-fid. caulina ambitu triangulari, 3-pinn. Foliol. venosa, supra glauca, subtus pallide virentia, sessil. laciniis distantibus, parum refalcatis. Rami axillares ad angulum acutum, glaberrimi. Umbell. ampla.

5. *trifoliata*. T. fol. (caulinis) ternatis, ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

Habitus Sii Nissi. Fol. crenata; infimum cordatum. Petal. atro-purpur. Sem. *Selini Carvisfol.* seu *Monnieri*, sed involuc. nulla.

438. PASTI-
NACA. Fructus ellipticus, compresso-planus, vix emarginat. striatus. Petal. involuta, integra. Fl. æquales.

1. *lucida*. P. fol. radicalibus cordat. lobatis: caulinis ternatis, quinatisq. rameis cuneiformibus. *Gouan. Illust. tab. 11. 12.*

P. fol. simplic. cordatis, lobatis, lucidis, acute crenatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 199.*

In Europa australi: in insulis balearicis 24.

Odor aromaticus. Sapor acerrimus. Caul. sesquiped. & ultra, lævis; excisus gummi foetidum, rutaceum, album præbet. Fol. lucida, rigidula, rugosa, serrata, obtusa, crassa, atro-virent. longe petiol. 3-5-lobata, impari petiolato.

Rami pl. panicul. Umbell. convexa. Involuc. subnullum. Involucc. semper nulla. Petal. acuta, integra, inflexa, lutea. Sem. orbicul. compressa.

2. *sativa*. P. fol. simpliciter pinnat. *Syst. veg. ed. 14. Riv. tab. 6. Black. tab. 379.*

P. domestica. *Matth.*

In Europæ austral. ruderatis, & pascuis ♂.

Caul. 6-ped. Pinnul. subsessil. oblique ovatae.

Petal. lutea. *In sylvestri pinnul. petiol. lobata, hirsuta.*

3. *Opoponax*, P. fol. pinnat. foliol. basi antica excisis. *Syst. veg. ed. 14. Gouan. Illust. tab. 13. 14.*

Panax Heracleum. Moris. hist. 3. f. 9. tab. 17. f. 2.

In Italia, locis umbrosis, & montanis rupestribus ♀.

Altitudo etiam humana. Radix crassa. Caul. ramifusus. Fol. ampla, costa crassa, sæpius glabra: primaria simplic. cordata, dein ternata-quinata, tandem pinnata, acute crenata; foliol. terminali majore: lateralibus oblique cordatis, lobo super. brevior. Caulina infra magis composita, ambitu triangul. bipedal. 2-pinn. pinnul. utrimque 5. pinna ultima pinnata, foliol. sæpe 5, ultimo cordato, cæteris sessilibus, oblique cordatis. Pinnul. cæteræ ternatæ, demum simplices sunt. Cor. lutea.

439. **SMYRNIUM.** Involuc. nulla. Petal. acumin. Fru. subrotund. magnus. Sem. carinata, dorso subrotunda, & tribus costis obrutis, & veluti funiculis percurso; interiore facie veluti triangulari; neque idcirco tota plana, & contigua.

1. *perfoliatum*. S. fol. caulinis amplexicaulibus. *Syst. veg. ed. 14. S. amani montis. Dod. pempt. 698.*

In Italia, Creta ♂.

Rad. napiformis. Fol. primordial. *Apil palustr. caulina circinnata. Sem. subnigra.*

2. *egyptiacum*. S. fol. floralibus binis, simplicibus, cordat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ægypto.

Magnitudo S. *Olusatrum*. Fol. infra pedunc. comm. bina, opposita, amplexicaul. ovata, integerr. Petal. lutea.

3. *Olusatrum*, S. fol. caulinis ternatis, petiolat. ferratis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 408.*

Hippofelinum. *Dod. pempt.* 698.

Smirnio. *Matth.*

In Europa ♂.

Fol. radical. triternata: summa opposita: vaginis lacerato-ciliat. Foliol. magna, firma, venosa, glauca. Involucc. breviss. Petal. albido-virescent. Sem. nigra.

4. *aureum*. S. fol. pinnatis, serratis; posticis ternatis: floscul. omnibus fertilibus. *Syst. veg. ed.* 14.

Angelica acadensis. *Dodart. Ad.* 55. tab. 4. 247. cum fig.

In Amer. boreali ♀.

Caul. 2--ped. & ultra. Fol. *Podagrariae* æmula, trifariam divisa, acuta, æqualiter, & non alte serrata. Umbell. planæ. Pet. parva, lutea. Sem. brunnea.

5. *integerrimum*. S. fol. caulinis duplicato-ternatis, integerr. *Syst. veg. ed.* 14.

In Virginia ♀.

Caul. sesquiped. lævis, parum ramosus. Fol. fere *Aquilegæ*, tri-ternata, oblong--ovat. glabra, glauco-virid. odore grato.

- nodiflorum*. S. *All. Fl. Ped.* tab. 72.

Ligusticum &c. *Vill. prosp.* tab. 23. f. 2.

In sylvis, & pratis montosis Pedemontii &c. ♀.

Caul. 3-ped. brachati, subnudi, striati, læves. Juxta ramorum longitudinem, atque in ipso caule 2--3--4. etiam uncial. pedunc. radiatim nascuntur, umbellas sustinentes. Ad pedunculor. ortum adest foliol. integrum, lanceolat. umbellæ etiam terminales. Involuc. 1-phyll. lineare, aristatum, simile foliolo umbellæ subiecto. Umbellulæ 3-4 cum fl. uno soliar. in medio umbellæ, 3-4--floræ. Petal. cordata, inflexa, herbacea. Sem. magna, nigra, incurva, non acuminata, dorso potius costato, quam striato. Petioli fol. striati, rotundi, breviter vaginantes. Petiol. in 3 dividitur, medio longiore; quorum quilibet fol. tria petiolata, ovario--lanceol. profunde dent. dentibus quandoque aristat. venosa, glabra, subtus pallent. *Ex forma sem. media planta inter Smyrnum, & Ligusticum, sed ad primum potius accedit.*

440. ANETHUM. Fruct. subovat. compressus, striatus. Petal. involuta, integra.

1. *graveolens*. A. fructibus compressis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 93. Black. tab. 545.*

Aneto. *Matth.*

Inter Lusitaniæ, & Hispaniæ &c. segetes: circa Afracæ ☉.

Odor totius plantæ *graveolens*. Caul. pedat. Fol. 2-pinnat. linear. pleniutcul. glauca. Petal. lanceol. lutea. Sem. ex flavo-pallescent.

2. *segetum*. A. fol. caulnis tribus: fructibus ovalibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 132.*

In Lusitania ☉.

Odor prioris. Caul. spitham. teres, lævis, glaucus. Rami 3-4. alterni, patentes. Fol. petiolar. basi membranacea, 2-3-pinn. filiform. linear. lævia, plana, foliol. alterne subdivitis. Folia summi foliol. indivisa. Loco involuc. utriusq. rudimentum. Umbell. convexa, patula, disperma. Umbellul. 9. Cor. flosculosa. Petal. involuta, flava. Fruct. oval. convexiuscul. striis 3. elevatis.

3. *Feniculum*. A. fructibus ovat. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 288. Riv. tab. 60. Cam. epit. 334.*

Finocchio. Matth.

In Narkonæ, Maderæ rupibus cretaceis ♂.

Altitudo humana. Fol. ampliss. foliol. magna, setacea, nigro-virent. glabra. Umbella lata. Involuc. nulla. Petal. flavicant. Sem. sapore acuto, oblong. parum gibba, nihil arcuata, intus plana, dorso 5-costato.

441. CARUM. Fructus ovat-oblong. striatus. Sem. intus plana. Petal. carinata, inflexo-emarginata. Involuc. nulla.

1. *Carvi*. C. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 393. Black. tab. 529. Ludw. ed. tab. 156.*

In Europæ borealis pratis montanis ♂.

Caul. striatus, in albis spitham. in hortis 2-cubit. Fol. longa, angusta, petiolis membran. dilatatis, 3-pinnat. nigro-virent. rigida, glabra, lacin. linear. Umbell. peduncul. raræ, plantæ. Involuc. 0-1-phyll. Petal. alba, inde rubra, extima parum mæ. Sem. fusca, sapore aromatico.

442. PIMPINELLA. Fl. subradiati, fertiles. Involuc. nulla.

Petal. cordata. Fruct. subrotund. aut subovat.
Sem. intus plana, paulisper acuminata, dorso
gibbo tricostrato.

1. *Saxifraga*. P. fol. pinnat. foliol. radical. subrotund. summis
linear. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab.*
395. Fl. Dan. tab. 669. Black. tab. 472. Morisf.
umb. tab. 5.

In Europæ pascuis siccis 24.

Radix Hirci sapore. Caul. 2-ped sæpe ramosus,
angulatus, quandoq. diffusus. Foliol. dentata,
nitida. Umbell. raræ. Petal. alba.

2. *magna*. P. foliol. omnibus lobat. impari trilobo. *Syst. veg.*
ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 396.

P. *saxifraga*. *Camer. epit. 775. ic-Barr. ic. 213.*
Dod. pempt. 315.

b. P. *saxifraga*. *Riv. tab. 60.*

In Europa au. rali, in pinguibus alpium vasis 24.

Huius Var. est P. *Orientalis* Gouan. *Illust. tab.*
15. Jacq. Austr. 4. tab. 397.

Differt a priore glabritie: umbell. ma: petal. non
semper albis.

Caul. 3-ped. Fol. fere cubital. petiol. vaginante.
Foliol. latiora, quam longa, serrata, venosa,
quasi oleo inundata, facie *Sisari*. Perioi com-
pressi.

3. *glauca*. P. foliol. supradecompos. caul. angulato, ramo-
siss. *Syst. veg. ed. 14.*

In Gallia, Italia.

Fol. *Peucedani*, sed longe min. pinnul. ultimis
3-partit. caulinoz vaginæ longæ, striatæ,
margin. albidis. Involucc. nulla, quorum de-
fectu a *Sesel*. differt.

4. *peregrina*. P. fol. radical. pinnat. crenatis: summis cuneiform.
incisis: umbell. nubilibus nutantibus. *Syst. veg.*
ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 131.

Daucus &c. *Colum. ceph. 1. tab. 109.*

In Italia pascuis sterilibus 24.

Caul. 2-ped. paucifol. Fol. radical. p.^o prodeunt
simplicia; dein ternata; subsequa pinnata: fo-
liol. utrimq. bina, terna, cum impari, subro-
tunda. Umbella plana. Umbellul. convexæ.
Petal. alba.

5. *Anisum*. P. fol. radical. (subrotund.) 3-fid. incisis. *Syst.*
veg. ed. 14. Black. tab. 374. Clus. hist. 2. p.
202.

In Ægypto ☉.

Caul. ped. striatus, hirsutus. Fol. pinnata; super. multifida. Involucc. depauperata. Petal. alba. Sem. e viridi-fusca, fragrantia.

6. *dichotoma*. P. peduncul. oppositifol. fol. floriferis 2-trifid. petiolis alato-membranac. Syst. veg. ed. 14.

In Hispania.

Caul. semiped. ramosiss. dichotom. Fol. infer. tri-ternata: superior. 2-ternata, fere linear. breviora, acuta. Petioli membrana alba. Umbell. radius 5-6. Petal. alba, incurvo-emargin. Fruct. subglobosi, striati.

7. *dioica*. P. pumila; umbell. numerosiss. compositis, simplicibusque. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 28.

Seseli &c. Clus. hist. 2. pag. 200.

In Austria, Helvetia &c. vallibus; & saxosis apricis.

Caul. palmar. divaricat. striatus, lævis, parum foliac. Fol. ternata, seu 2-ternata, linear. Umbell. terminalis, & laterales 2. oppositæ. Petal. longe lanceol. incurva, non emarginata. Involuc. nulla. Stam. longa, alba. Datur planta mascula, & hermaphrodita.

- diffusa*. P. fol. omnibus pinnat. pinnis multipart. segment. subfalc. acutis. Retz. Obs. fasc. 3. tab. 11. Pimpinella &c. Moris. Hist. plant. T. 1. tab. 5. Tragofelinum. Hall. Helv. 787.

Habitat

Fol. primi anni omnino pinnat. pinnis subrotun. In horto culta procerior evadit, & magis striato caul. surgit.

443. CUSSO. Petal. 3-gona. Margo receptaculi dilatatus in calyc. 5-dentat.

1. *thyrsiflora*. C. fol. digitat. foliol. sessil. cuneiform. truncatis, 3-dentatis: fl. racemosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Ad. Ups. vol. 3. tab. 12. fig. bona.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. frutesc. inæqual. crassitie digiti, inferne scaber, superne simpliciss. Fol. in apice caul. adproximata, quinata, alterna, petiolat. Foliol. inæqual. consistentia, *Menyanthes*, longe petiolata. Stipul. interfoliac. Racemi terminal. umbellati. Radii 4. simpliciss. racemo cylindrico.

Var. fol. articulatis, articul. infimo apice in lobos min. dilatato; unde foliol. quasi prolifera.

2. *spicata*. C. fol. digitat. foliol. petiolellat. spatuliat. ligula 3-5-palmata, anguste ferrata: fl. spicat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Ad. Upf. vol. 3. tab. 13. f. bona.*

Ad cap. b. Spei.

444. **APIUM**. Involucr. 1-phyll. vel nullum. Petal. æqualia, integra, inflexa. Fruct. minimus, subrotund. Sem. ovatum, intus planum, dorso tenuissime striato.

1. *Petroselinum*. A. fol. (inferioribus subrotund.) caulinis linear. involucl. minutis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 172. Dod. pempt. 694.*

In Cardinia iuxta scaturigines.

Caul. 2-cubit. sulcatus. Fol. alterna, amplexicaul. 2 pinn. Petal. pallid. Sem. cinerea, glabra.

2. *graveolens*. A. fol. (inferioribus quinato-pinnat.) caulinis cuneiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 790. Sabb. hort. 4. tab. 67. Ludw. ed. tab. 180. Black. tab. 443.*

Apio palustre. Matth.

In Europæ humidis, præsertim maritim.

Altitudo humana. Caul. sulcatus. Fol. læte virentia, firma, nitida; inferior. petiol. 3-fid. superiora subsissil. Umbell. pauciss. aliæ petiolatæ, aliæ sessiles.

445. **ÆGOPodium**. Fl. exteriores inæqual. inter. æqual. petalis profunde cordat. Involucra 0. Sem. magna, oblonga, convexa, profunde striata, nuda.

1. *Podagraria*. A. fol. (imis biternat.) caulinis summis ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 607. Riv. tab. 46.*

Herba Gerardi. Dod. pempt. 320.

In Europa ad sepes, & in pomariis.

Caul. 3-ped. brachiat. angular. Fol. magna, læte virent. glabra. Vaginæ grandes. Foliol. obverse ovata, acuta, ferrata. Umbell. magna, convexa. Umbellul. planæ. Fl. albi, maiusc. extus subrubri. Sem. oblonga.



TRIGYNIA.

446. SEME- **C**Or. 5-petala. Drupa cordata, cellulosa,
CARPUS. 1-sperm.

1. *Anacardium*. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Anacardium verum Or. Offic.

In India versus Zeylonam h.

Arb. grandis, cortice cinereo, fusco: ramis
subhirtis. Fol. magna, adproxinata, alterna,
cuneiform. acutiusc. integerr. glabra, pilis ra-
rioribus conspersa. Racemus erectus, pedun-
culat. Bractæ ad peduncul. & pedicellos. Cal.
carnosus, hirsutus, persistens. Drupa extus
nigra, intus succus mucilaginosus, causticus,
niger.

*Succus diploës ed lintea, sericea, bombycina, li-
terarum notis nigris numquam delendis infi-
gnienda usurpatur. Hæc nigrities adeo inhæret,
ut Saponi artificiali, vel sulibus detergi nequeat;
lintea tamen non corrodit, nisi ut causticum in
cute agat.*

447. RHUS. Cal. 5-part. Petal. 5. Bocca 1-sperma, coria-
cea.

1. *Coriaria*. R. fol. pinnat. obtusiuscule ferratis, ovalibus,
subtus villis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab.*
486. *Ludw. ed. tab. 122.*

Dod. pempt. 776.

Sumach. Offic.

Rhu. Math.

In Europa australi, Syria, Palæstina h.

Altitudo humana, & ultra. Frutex subramosus.

Fol. alterna. Foliol. 13-15. opposita, sessil.

bas. integerr. ad apicem ferrata, subtus sub-

rubra. Fl. racemosi. Cor. ex albo-lutesc.

Capf. subvirid. villotæ.

2. *typhinum*. R. fol. pinnat. lanceol. argute ferratis, subtus
tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Duhamel. arbr. 2.*

In Virginia h.

Rami Cervi cornua referunt. Fol. magna, lon-

ga. Foliol. sæpe utrimq. 9. cum impari. Pa-

nicul. conglomerata, crassa, villosa. Cor. sub-

rubra. Fruct. rubri.

3. *javanicum*. R. fol. pinnat. ovat. acuminat. ferratis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China h.

Foliol. sub 7-iuga, pollicar. sensim maiora, opposita, sessil. parallelo-nervosa, supra glabra, subtus ferrugineo-tomentosa. Petiol. alari. Panicula terminal. composita, tomentosa. Fl. minuti.

4. *glabrum*. R. fol. pinnat. lanceol. ferratis, utrimq. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Gisech. ic. fasc. 1. tab. 5. Dill. elth. tab. 243. f. 314. Catesb. Car. 3. tab. 4.*

In Amer. Septent. ad agros, & sepes h.

Frutex sub 3-cubit. cortice cinereo, ramis alternis, expansis. Fol. alterna, longa, foliol. terminal. ma. supra satore viridia, subtus glauco-albicant. Panicula pyramidal. ped. sparsa. Petal. e luteo-virid.

5. *Vernix*. R. fol. pinnat. integerr. annuis, opacis; petiol. integro, æqual. *Syst. veg. ed. 14.*

Toxicodendron &c. *Dukamel. arbr. 2. tab. 99. Dill. elth. tab. 145. f. 1.*

Arbor amer. &c. Pluk. alm. tab. 145. f. 1.

In Amer. Septent. Japonica h.

Cortex cinereus. Foliol. 4-5-plura, ovat-lanceol. utrimq. sursecta, supra virid. & glabra, subtus pallida, & sublanuginosa. Fl. racemosi, pedunc. purpur. Petal. minima, herbaea. *Dioicum. Diversum a Vernice offic.*

6. *succeda-
neum*. R. fol. pinnat. integerr. perennantibus, lucidis; petiol. integro, æqual. *Syst. veg. ed. 14.*

Arbor vernicifera &c. *Kamph. am. 795.*

In Japonia, China h.

Adfne priori, sed differt potissimum magnitudine fol. quæ rigida sunt, utrimq. nitida, raro utroq. margine æqualia, odore lætido muris. In priore vero opaca, viridia. Fruct. huic magnitudine Cerasi, nec albi; in priore magnitudine Pisi, omnino albi.

7. *copallinum*. R. fol. pinnat. integerr. petiol. membranac. articulo. *Syst. veg. ed. 14. Dukam. arbr. 7.*

R. obscuriorum &c. *Pluk. alm. tab. 55. f. 1.*

In Amer. Septent. h.

Arb. gummiifera. Foliol. utrimq. 5-6. costa, & nervis robustibus. Fl. racemosi.

8. *semialatum*, R. fol. pinnat. ferratis, petioli extimis internodiis membranaceis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gottin. 1784. c. tab. M.*

Habitat . . .

9. *Metopium*, R. fol. pinnat. quinatis, subrotund. integerrim. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 13. f. 3.*

Terebinthus &c. *Sloan. J. m. hist. 2. tab. 199. f. 3.*

Borbonia Plum. ic. 61.

In America h.

Arb. 30-ped. valde ramosa. Fol. longe pinnata. Foliol. 20-unc. longa, dilute virent. nitida. Fl. in summis ramulis corymbosi. Petal. fusco-purpur. Fruct. Olivæform. rubri.

10. *pauciflorum*, R. fol. pinnat. foliol. alternis, decurrent. cuneiform. apice ferratis; panicula festili, paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

11. *digitatum*, R. fol. pinnat. foliol. oblong. integerr. glaberr. caul. scandente. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

12. *radicans*, R. fol. ternatis; foliol. petiolat. ovat. nudis, integerr. caul. radicante. *Syst. veg. ed. 14.*

Toxicodendron &c. *Du Ham. arb. 2. tab. 98.*

Dill. elth. 390.

b. *Toxicodendron* &c. *Dill. elth. tab. 292. f. 375.*

In Virginia, Canada h.

Dioicum. Minus venenatum quam R. Vernix.

Stolones pl. 3-cubital. Fol. latiora, & longiora, vel breviora, & obtusiora, supra læte virid. subtus pallidiora. Fl. axillar. racemosi, herbacei, vel luteo-albidi. Fructus *Coriandri*.

b. *Differt caudice erecto, absq. stolonibus.*

13. *Toxicodendron*, R. fol. ternat. foliol. petiolat. angulat. pubescentibus; caul. radicante. *Syst. veg. ed. 14.*

Hedera trifolia &c. *Cor. Canad. tab. 97. Barr. ic. 228.*

In Virginia, Canada h.

Dioicum. Fol. nunc integra, nunc sinuata. Fl. racemosi, parvi, dilute lutei.

14. *Cominia*, R. fol. ternatis; foliol. petiolat. ovat. subtus tomentos. remotiss. ferrat. *Syst. veg. ed. 14.*

Baccifera &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 208. f. 1.*

Malago maram. H. Mal. 5. tab. 25.

In India h.

Arb. procera, ramis e viridi--flavescent. & tomentof. Petiol. longi, & tomentosi. Racemi terminal. peduncul. lanuginosis. Petal. minima. Baccæ rotundæ, p.^o atro-virent. dein viridi--albescens.

15. *Cobbe*. R. fol. (plerumque) ternat. foliol. ovat. acuminat. ferratis, peduncul. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Rhois trifoliatæ &c. Pet. mus. 678.

In Zeylona h.

Frutex facie *Rhois Afric.* Fol. alterna, longe petiol. quandoq. quinato-digit. Foliol. magna. Spicæ axill. sæpe simpl. Fl. multi, minimi, breviter peduncul. Fructus nigri.

16. *tomentosum*. R. fol. ternatis: foliol. subpetiolat. rhombeis, angularis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 7.*

Vitex &c. Comm. hort. 1. tab. 92.

Ad cap. b. Spei h.

Frutex cortice fusco. Foliol. acuta, ferrata, dura, crassa, supra satore virid. nitida, subtus dilutiora. Fl. decussati, aut binatim positi, peduncul. Petal. purpureo-cœrul.

17. *angustifolium*. R. fol. ternatis: fol. petiolat. lineari-lanceol. integerr. subtus tomentof. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 6. Burm. afric. tab. 91. f. 1.*

In Æthiopia h.

Frutex ramis sparsis. Racemi terminal. fol. longiores. Baccæ subrotund. rubra, glabra.

18. *lævigatum*. R. fol. ternatis; foliol. sessil. lanceol. lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Simile *R. lucido*, sed foliol. lanceol. minus lucida. Panicul. longa, tenuissima.

19. *lucidum*. R. fol. ternatis: foliol. sessil. cuneiform. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 219. f. 9. Burm. afric. tab. 91. f. 2.*

Vitex &c. Comm. hort. 1. f. 93.

Ad cap. b. Spei h.

Altitudo humana. Frutex ramis 2-pedal. virid. vel purpurasc. Fol. petiolat. Foliol. crassa, venosa, variantia glabritie, hirsutie, glaucedine &c. Fl. axillar. racemosi. Baccæ subrotunda.

20. *villosum*. R. fol. ternatis: foliol. sessil. ovatis, integris, pubescenti-villosis: caul. pubescente. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

Differt a reliquis cunitie.

21. *incisum*. R. fol. ternatis: foliol. sessil. cuneiform. inciso-pinnatifid. subtus tomentos. venosis: calyc. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Foliol. parva, & exquisite divisa, ut folia *Myrica quercifoliae*.

22. *cuneifolium*. R. fol. ternatis: foliol. sessil. cuneiform. glaberr. 7-dent. dentibus mucronat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

23. *lanceum*. R. fol. ternatis: foliol. lanceol. subulat. elongat. utrimq. glaberrim. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Differt a *R. laevigato* fol. longioribus, angustioribus, utrimque glaberr.

24. *cirrhisiflorum*. R. scandens, fol. ternatis: foliol. integerr. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

25. *tridentatum*. R. scandens; fol. ternatis: foliol. incanis, ferrat. ferraturis 3-5. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

26. *Cotinus*. R. fol. simplic. obovatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 210. Du Hamel. arbr. 1. tab. 78. Cocconileia. Clus. Hist. rar. p. 16. ic. Lob. ic. 99. Cotino. Matth.*

In Lombardia Italiae; ad rad. apenninorum &c. h.

Odor balsamicus. Frutex humilis, nodosus, cortice e fusco-rubro. Fol. alterna, longe petiol. petiolis rubellis, apice rotundo, integerr. firma, glabra, nervis saepe rubent. Panicula terminal. interne rara, superne densior, bracteis filiform. pilosis, longioribus quam pedicelli. Petal. subvirid. Bacca glabra, compressa, siliulam Bursae pastoris per medium quasi difectam referens.

- sæneb.* R. fol. longo-lanceol. ferratis, subtus tomentos. albis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Arabia h.

Baccæ sessil. in ramis sub fol. confertæ, globosæ, subspicat. hispidæ.

448. *VIBURNUM*. Cal. 5-dent. superus. Cor. 5-fid. campanul. Bacca 1-sperm.

1. *Tinus*. V. fol. ovat. integerr. ramification. venarum sub-
tus villosa-glandulosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Tinus 1. 2. 3. Clus. hist. 1. p. 49.
Laurus Tinus &c. Bauh. hist. 3. p. 418.
In Lusitania, Hispania, Italia, sylvis opacis h.
Arbust. sempervirens. Fol. opposita, petiol. fir-
ma, nitida, obscure virent. Fl. terminal. ra-
cemosi, primum rubri, dein albi. Cymæ in-
volucrat. Fructus in maturitate rubri.
2. *Tinoides*. V. fol. elliptic. glabris, integerr. ramis, cymis-
que teretibus, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
In Amer. meridion. h.
Simile V. *Tino*; at fol. *Tini* exacte ovat. petioli
longiores: pedunc. caulisque angulati, glaberr.
3. *scandens*. V. fruticosum, scandens; fol. oblong. ferrat. cymis
terminal. radiis terminatis fl. maximo. *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Zeylona h.
Fol. breviter petiolat. oblong. angustiora, utrinq.
acumin. Radii patentes. Fl. parvi, sursum
versis, albi.
4. *virens*. V. fol. oblong. acuminat. medio ferratis, scabris;
ramis scandentibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb.*
Jap.
In Japonia.
Caul. frutesc. ramosus. Fol. sesquipollic. æqual.
opposita, petiolat. basi, & apice integra, me-
dio tenuiss. ferrata, tenuia, glaberr. læte vi-
rid. subtus pallidiora. Fl. terminal. umbellati,
radiati. Cal. reflexus. *Differt a V. castroide,*
petiol. minime carinatis, & fol. ferratis.
5. *ferratum*. V. fol. oblong. dentato-ferrat. basi integris,
subtus pallidis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia h.
Fol. opposita, petiol. acumin. inferne attenuata,
glabra. Cymæ terminal. fl. radiantibus.
6. *nudum*. V. fol. lanceol-ovat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*
Mill. ic. 274.
In Virginia h.
Cymæ nudæ. Petal. alba. Fruct. atro-purpur.
7. *prunifo-*
lium. V. fol. subrotun. crenato-ferrat. glabris. *Syst.*
veg. ed. 14.
Mespilus &c. Pluk. alm. tab. 46. f. 2.
In Virginia, Canada.

PENTANDRIA TRIGYNIA. 191

Fol. Pruni. Fl. cymosi, albi. Fruct. oblong. atro-purpur.

8. *dentatum*. V. fol. ovatis, dentato-ferrat. plicatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 1. tab. 36.*

In Virginia h.

Frutex cortice fusco. Fol. opposita, petiol. supra glabra, subtus leviter pubescent. primum plicata, dein expansa, & planiora. Cymæ terminal. Petal. alba.

9. *Lantana*. V. fol. cordat. ferratis, venosis, subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. austr. 4. tab. 341.*

Viburnum. Du Ham. arb. 2. tab. 103. Cam. epit. 122.

Lantana. Dod. pempt. 701.

Viburno. Mart.

In Europæ austral. sepibus argillofis h.

Arbuse. 6-ped. Fol. opposita, petiol. Cymæ densæ. Fl. sessil. odori. Cor. albido-lutea. Fruct. primum albi, dein rubri, tandem nigri.

10. *acerifolium*. V. fol. lobatis; petiolis lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia h.

Baccæ rubræ, umbilicat.

11. *Opulus*. V. fol. lobatis; petiolis glandulos. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 661.*

Sambucus. Pol. Dod. pempt. 846.

Sambuco aquatico. Matth.

b. V. roseum. *Knorr. del. hort. 2. tab. S. 6.*

In Europæ pratis humidiusculis h.

Frutex 6-ped. Fol. opposita, inferne nervosa, lobis dentat. lateralibus 2-partit. Cymæ latæ, nudæ, planæ; in var. globosæ. Cor. alba. Baccæ rubræ.

12. *Lentago*. V. fol. ovatis, ferrulat. acuminat. glabris; petiolis marginatis, undulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada h.

Rami propendent. Fol. crassa *Tini*, glabra, denticulis minim. ferrulata. Gemma terminal. subulata, basi ventricosa.

13. *tomentosum*. V. fol. ovat. acuminat. ferratis, venosis, subtus tomentosi, umbell. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Te Marikwa. Kæmp. am. exot. Fasc. V. p. 854.

In Japonia h.

Differt a V. Lantana = fol. ovatis, nec cordatis: umbell. lateralibus, confertis. Rami ramulosi, divaricati, teretes, glabri, rubent. Fol. opposita, petiol. nervosa. Petioli, ramuli, & peduncul. tomentosi. Cymæ lateral. in apice ramulor. floscul. radiantibus.

14. *erosum*. V. fol. ovat. acuminat. eroso-ferrat. glabris: petiol. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticos. erectus, ramis patenti-erect. oppositis, angulatis, glabris, cinereis. Fol. inæqual. 2-pollic. superior. ma. opposita, breviter petiol., infima basi integra, tenuia, glabra, subtus pallida. Fl. in apice ramulorum paniculati, non radiati. Panicula decomposita, umbellata. Bract. setaceæ, villosæ. *Differt fol. ovatis, longius acuminat.*

15. *hirtum*. V. fol. ovat. ferratis, villosis: petiol. hirtis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. flexuoso-erectus, teres, glaber. Rami, & ramuli alterni, basi glabri, apice hirti. Fol. pollicar. opposita, petiol. (Urticæformia) acuta, profunde, & æqualiter ferrata, venis hirtis, pilis albis decumbentibus. Petiol. & pedunc. hirti, pilis horizontal. Umbellæ terminal. compositæ. Fl. minuti, non radiantes. Stigm. 2-lobum.

16. *dilatatum*. V. fol. obovat. acuminat. inæqualiter ferratis, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. erectus, fruticos. subangulat. cinereus, villosus. Fol. 2-pollic. inferiora min. opposita, petiol. nervosa. Fl. paniculati, non radiati. Panicul. axillar. supradecomposita, patentiss. 4-fid. 3-chorom. Pedunc. & pedicelli tomentosi.

17. *macrophyllum*. V. fol. obovat. acuminat. dentatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Planta tota glabra. Caul. & rami teretes. Fol. palmam lata, & paulo longiora, opposita, petiol. nervosa, glabra, subtus pallidiora. Umbell. terminal, composita; fl. radiantibus.

18. *cuspi-*

18. *cuspidatum*. V. fol. ovat. cuspidat. ferrat. villosis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia h.

Fol. palmam fere lata, & paullo longiora, æqualiter, acuteq. ferrata, pilis spartis. Umbell. terminal. supradecomposita, fl. radiantibus.

19. *Cassinoides*. V. fol. ovat. crenat. glabris; petiolis carinat. eglandulat. Syst. veg. ed. 14.

Cassine. Mill. dict. tab. 83. f. 1. Angl. hortul. tab. 29.

In Amer. Septent. h.

Frutex. Fol. opposita, infima obovata; proxima ovata; super. lanceol.

- lanceolatum*. V. Hill, hort. Kevenf. tab. 19.

In Virginia h.

Frutex 6-ped. Fol. 3-unc. Petal. alba.

449. CASSINE. Cal. 5-part. Petal. 5. Bacca 5-1perm.

1. *capensis*. C. fol. petiol. ovat-obl. retulis, crenatis. Syst. veg. ed. 14.

Celastrus &c. Burm. Afric. tab. 85.

Phylliræa &c. Dill. elsh. tab. 236. f. 305.

Frutex &c. Seb. mus. 1. tab. 29. f. 5. Pluk. phys. tab. 97. f. 8.

Ad cap. b. Spei h.

Simil. sequenti, sed differt fol. forma. Fol. venis eminentibus. Petiol. marginati, nudi. Ramuli 4-goni. Corymb. breviss. ut in *Mauroc. nia*.

2. *Peragua*. C. fol. petiol. elliptic. acutiuscul. serratis: ramul. ancipitibus. Syst. veg. ed. 14.

C. corymbosa. Mill. dict. ic. tab. 83. f. 1.

In Carolina, Virginia h.

Rad. longa, lutea, vel rosea. Caul. subnulli.

Fol. opposita, crassa. Petioli dorso decurrentes. Corymb. axillar. breves. Bacca globosa.

3. *Mauroc. nia*. C. fol. sessil. obovat. integerr. coriaceis. Syst. veg. ed. 14.

Frangula &c. Dill. elsh. tab. 121. f. 147.

Cerasus &c. Pet. gaz. tab. 57. f. 4. Pluk. alm. tab. 158. f. 2.

In Æthiopia h.

Frutex 3-cubit. a medio ad summum ramosus, ramis ramulof. Fol. plerumq. opposita, crassa, valde rigida, utrimq. glabra, & subnitent. margine subreflexo, quandoq. emargin. supra sa-

ture, subius viridi-lutescent. costa pallide vi-
renti. Fl. axillar. fascicul. parvi, primum fla-
vescent. dein albidis, *Oxyacanthæ* simil. odori.
Baccæ oblong-rotund. rubent.

450. **SAMBU-CUS.** Cal. 5-fid. Cor. 5-fid. rotata, concava. Bacca
2-4-sperma. Fol. pinnata. Fl. in nostris, cy-
mosi.

1. *Ebulus*. S. cymis 3-partit. stipul. foliac. caul. herbac. *Syst.*
veg. ed. 14. Black. tab. 483. Mill. ic. tab. 226.
Fuchs. hist. 65. Cam. epit. 979.

Ebulo. Maith.

In Europa 2.

Caul. 1-2-cubit. Fol. impari-pinn. 3-4-iuga. Fo-
liol. longiora, angustiora, magisque dentata
S. nigra. Flos speciosior. Petal. segment. lan-
ceolat. extus subrubris.

2. *japonica*. S. fruticosa, cymis 3-part. stipul. nullis. *Syst.*
veg. ed. 14. Thumb. Jap.

In Japonia h.

Caul. ramis patulis, oppositis, glabris, teretibus,
inanibus. Fol. pollic. & ultra, opposita, im-
pari-pinn. petiol. Foliol. 3-5-7-iuga, ovata,
acuta, sæpe acumin. serrata, margine carti-
lagin. albo, glabra. Fil. terminal. Cyma supra-
decompos. patens, nuda, absque bracteis, gla-
bra. Cor. alba.

3. *canadensis*. S. cymis 5-part. fol. sub 2-pinnat. caul. frutesc.
Syst. veg. ed. 14.

In Canada h.

Media inter *S. Ebulum*, & *nigram*. Habitus *S.*
nigra, at fol. pinnat. foliol. inferioribus ternat.
omnibus magis ovat. Fruticat, sed plerumq.
perit supra terram hyeme. Cymæ ut in *nigra*.
Stipul. filiform. truncatæ, ut in *nigra*, nec in
foliol. expansa, ut in *Ebulo*. Baccæ rubicund.
& edules, magnitudine sem. *Coriandri*.

4. *nigra*. S. cymis 5-part. fol. pinnat. foliol. subovat. ser-
ratis: caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan.*
tab. 545. Black. tab. 151. Knorr. del. 1. tab.
H. Du Ham. arb. 2. tab. 65.

Sambuco montano. Maith.

In Europa, & in Japonia h.

Arb. pumila. Fol. impari-pinn. Foliol. ovat-lan-
ceol. acute serrata. Odore torrido. Petal. alba.
Baccæ nigra, quandoq. virid. vel albæ.

5. *laciniata*. S. cymis 5-part. fol. 2-pinn. pinnis ternatis; foli-
liol. lanceol. incis; caul. arboreo. *Syst. veg.*
ed. 14. Retz. Obs. fasc. 3.
Vor. S. *nigra*. *Syst. veg. ed. 13.*
In Europa h.
6. *racemosa*. S. racemis composit. ovat. caul. arboreo. *Syst.*
veg. ed. 14. Du Ham. arb. 2. tab. 66. Bauh.
hist. 1. pag. 549.
S. *montana*. *Lob. ic. 163.*
In Europa austral. montibus h.
Frutex 6-ped. Fol. longiora, angustiora, firmio-
ra. Gemmæ caulinae. Fl. racemosi. Cor. o-
chroleuca. Baccæ rubræ.
451. SPA-
THELIA. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Capf. 3-gona, 3-locul.
Sem. solitar.
1. *simp. ex.* S. *Syst. veg. ed. 14.*
Aceri &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 171.*
In Jamaica h.
Arb 40-ped. ab imo ad semipedal. usque a sum-
mitate distantiam nudus, Pamarum more, cor-
tice albicante. Fol. in orbem disposita, perian-
tha, pinnata, costa media 3-4-pedal. albicante,
lanuginosa. Pinnul. longitudine 6-unc. latitu-
dine unc. Fl. terminal. muni, purpur. stamin.
luteis. Veficæ membran. glabræ.
452. STA-
PHYLEA. Cal. concavus, 5-fid. marcescens. Petal. 5, el-
liptica. Styli 2-3. Capf. veficæform. membra-
nac. 3-locul. Sem. ossea, globosa, cicatrizata.
1. *pinnata*. S. fol. pinnatis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. hort.*
2. tab. S. 1.
Staphylodendron. *Dalech. hist. 102. Duham. arb. 3.*
Pistacia *sylv. Cam. epit. 171.*
Nux veficaria. *Dod. pempt. 818.*
In Europa austral. succulentis h.
Arbuseul. etiam 15-20-ped. Foliol. 5-7. oval. a-
cuta, margine cartilagin. argute serrata. Stipul.
flavescent. Racemi longitudine fol. penduli.
Petal. alba cum rubore. Capf. magna.
2. *trifolia*. S. fol. ternatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia h.
Dignoscitur fol. ternatis, & semin. parvis.
453. TAMA-
RIX. Cal. campanif. 5-part. Petal. 5. Capf. 1-locul. 3-
valv. Sem. papposa. Stam. etiam. 10.
1. *gallica*. T. fl. pentandris: (fol. tenuioribus). *Syst. veg.*

ed. 14. Mill. ic. tab. 262. f. 1. Black. tab. 331. f. 2. Lob. ic. 218.

In Gallia, Hispania, Italia, Russia &c.

Arbust. cortice cinereo. Fol. Cupressiform. tenuiss. imbricata, dilute virid. Fl. terminal. racemosi. Differt a sequenti fol. multo minoribus, acutioribus, densius imbricat. virid. ramis florigeris horizontal. folio fl. singulis subiecto, albedo, pellucido, aristato.

2. *germanica*. T. fl. decandris: (fol. crassioribus). Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 262. f. 2. Fl. Dan. tab. 274. Black. tab. 331. Lob. ic. 218.

Myric. Cam. epul. 74.

In Germaniæ locis inundatis h.

Fol. maiora, glauco-cinerea, & crassiora quam in priore. Rami floriferi recti. Fl. duplo maius brevius peduncul. Cal. ex 5 foliol. imbricatis, viridibus &c.

- orientalis*. T. ramis, & ramul. articul. ramorum vaginis cylindric. acumine unico squamiformi. Forsk. Ag.

In Arabia h.

Differt a T. gallica, cuius rami squamati, squamis alternis, sessilibus, lanceolat. ramuli breves imbricat. foliol. confertis, lanceol.

454. XYLO-PHYLLA. Cal. 5-part. colorat. Cor. o. Stigmata lacera. Caps. 3 locul. Sem. gemina.

Fl. hermaph. & fem. in eodem caul. Hompton. Journ. des Sçavans. 1785.

1. *longifolia*. X. fol. linear. ramis 4-gonis. Syst. veg. ed. 14. Rumph. amb. 7. tab. 12.

In India Orient. h.

Caul. suffruticos. lævis. Rami alterni, stricti, angulis acutis. Fol. alterna, sæpe bina, stricta, lævia, subcarinata, alterne, & remotiss. serrata, serraturis floriferis. Fol. summa, longa, angusta, a.umin. primaria 14-18-pollic. longa, semidigit. lata. Primarium folium dividitur in lateralia. Fl. ad apices prope crenas folior. Cal. ruber. Caps. ut bacca Lauri, oblonga, rotunda, virid.

2. *latifolia*. X. fol. lanceol. ramis teretibus. Syst. veg. ed. 14. Phyllanthus &c. Comm. hort. 1. tab. 102. Seb. thes. 1. tab. 13. f. 2. Catseb. car. 2. tab. 26.

Filicifolia &c. *Pluk. alm. tab. 247. f. 4. & tab. 36. f. 7.*

In Amer. calidiore, Surinamo &c. h.

Frutex 2--ped. ramosus. Fol. ad plurimum spithamam longa, lata ad dimidium unc. sessil. mucronata, seture virent. nitida, rigida, magna ex parte arcuata, seu falcifor. rariter crenata, & præcipue ad apicem. Fl. parvi, sanguinei, cum punctul. albicantibus.

455. **TURNERA.** Cal. 5--fid. infundibul. exter. 2--phyll. Petal. 5. calyci inserta. Stigm. multifida. Caps. 1--locul. 3--valv.

1. *ulmifolia.* T. fl. sessil. petiolaribus: fol. basi biglandulos. *Syst. veg. ed. 14. Hort. Cliff. tab. 10. Mart. cent. tab. 49.*

Cistus &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 127. f. 4. 5.*

b. *T. frutescens.* *Mart. cent. tab. 49. Müll. ic. tab. 268. f. 2.*

In Jamaica, & Amer. calidiore h.

Caul. 1. 2--ped. frutesc. scaber. Fol. alterna, subpetiol. ovat-lanc. Ulmiformia, serraturis alternè profundioribus, utrimq. pubescent. Fl. lutei in medio petiolor. *Var. b. cor. minor, petalis mucronatis. Bract. absque glandulis. Fol. obtusiflora. Anth. fulvæ, nec flavæ.*

2. *Pumilea.* T. fl. sessil. petiolaribus: fol. eglandulos. *Syst. veg. ed. 14.*

Chamæcistus &c. *Pet. rar. tab. 38. f. 9. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 227. f. 6.*

In Jamaica ☉.

Caul. vix pollic. simpl. albo-pilosus. Fol. alterna, petiol. lanceol. semipinnatif. serraturis profundis, utrimq. 5-6. integris, acutis, pilis raris adpersa. Cal. bract. 2. linear. Petal. lutea. Anth. non ultra faucem calyc. elevatæ.

3. *fidoides.* T. pedunc. axillar. bifetis: fol. obovato-cuneat. serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Brasilia.

Caul. palm. simplic. pilosi. Fol. alterna, subsessil. profunde serrata, ad basin integerr. utrimq. levissime tomentosa, subtrus venis, margineq. pilosa. Fl. solitar. Bract. in pe. uncul. 2. oppositæ, linear. hirtæ. Cal. turbinat. pilosus. Petal. obovat. *Convenit cum sequenti caul. piloso, sed illa caret bracteis, tomentisq. folior.*

4. *cistoides*. T. pedunc. axillar. aphyll. fol. apice serratis. *Syst. veg. ed. 14*

Helianthemum &c. *Pum. sp. 7. ic. 150. f. 1.*

Chamæcisus &c. *Sloan. Jam. hist. 1. tab. 127. f. 7.*

In Amer. meridion. Jamaica &c. ☉.

Differt a priore bracteis nullis, & fol. non tomentosis. Caul. erect. digital. simpl. pilosus. Fol.

alterna, subpetiol. lanceolat. ad apicem paucis

crenatis notata, scabra, punctata, subtus to-

mentosa. Pedunc. solitar. 1-fl. geniculo notati.

Cal. tomentosus. Petal. lutea. Caps. subrotun.

5. *racemosa*. T. racemis terminal. elongatis. *Syst. veg. ed. 14. J. q. hort. 3. tab. 94.*

Habitat

Differt a T. cistoides latitudine fol. & racemo florigeri. Caul. erectus, ramosus, teres, una

cum petiol. ramis, & peduncul. pilis longis

obtus. Fol. alterna, petiol. longe ovata, vel

lanceol. obrusa, vel acuta, rugosa, ad nervum

subtus subhirsuta. Pedunc. axill. longi, solitar.

1-fl. Petal. obverse ovata, obusiss. patentia,

lutea. Caps. subrotun. depressa, villifera.

rupestris. T. fol. linearibus, serratis. *Aubl. Guian. tab. 113. f. 1.*

In Guiana h.

Fruticul. 3-ped. ramosus. Fol. alterna, sessil. Fl.

axill. solitar. exigui. Cor. lutea.

frutescens. T. fol. lanceol. serratis. *Aubl. Guian. tab. 113.*

In Caribæis h.

Frutex 8-ped. ramosus. Fol. alterna, subsessil.

acuta, e luteo-virent. Fl. axill. solitar. exigui.

Cor. lutea.

Guianensis. T. fol. linearibus, serratis: fl. spicat. *Aublet. Guian. tab. 114.*

In Guiana h.

Caul. 2-ped. sublignosus. Fol. alterna, sessil. Fl.

terminal. breviter peduncul. Cor. flava. Caps.

sub 3-gon. 3-valv. Sem. rugosa.

456. TELE- Cal. 3-phyll. Petal. 5. receptac. inserta, æqualia. PHIMUM. Caps. 1-locul. 3-valv. polysper.

1. *Imperati*. T. fol. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hist. 2. pag. 67.*

In Gallo-provincia, Helvetia &c. 24.

Caul. procumbent. toti foliosi. Fol. obverse ovata, glauca, nervis in caulem decurrent. imarotundiora. Fl. terminal. umbellati, albi.

2. *oppositifolium*. T. fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Shaw. afric. f. 572.*

In *Barbaria*.

Apices ramulorum, *Heliotropii* instar reflectuntur. Petal. parva.

457. *CORRIGIOLA*. Cal. 5-phyll. Petal. 5. Sem. 1. triquetrum, nudum, calyc. contentum.

1. *luoralis*. C. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 334.*
Polygonifolia. Dittl. giff. app. tab. 3. Ephem. N. C. cent. V. VI. app. tab. 9 f. 20.

Aline &c. Lind. als. tab. 2. C.

Polygonum &c. Bauh. hist. 3. pag. 379. Morif. hist. 2. f. 5. tab. 29. f. 1.

In *Gallia, Germania, Helvetia arenosis, mari proximis* ☉.

Caul. prostrati, vix palmar. ramosi. Fol. alterna, sessil. lanceol. integerr. Stipul. binatae, acutae, argenteae. Fl. racemosi, in ultimis ramis congesti; interdum axill. Calyc. segment. ala membranac. alba, vel fusca aucta. Petal. oval. alba.

- repens*. C. fol. ovat-lanceol. fl. capitatis. *Forsk. Suppl. Æg.*

In *Arabia*.

Caul. repentes, articulati. Fol. ad genicula verticillata, crassa, setula terminata, semipollic. numeri incerti. Squam. membranac. sub foliis. Rami axill. floriferi. Fl. subquini. Petal. calyce breviora. *Omnia signa novi gen. habet.*

- albella*. C. fol. oppositis: stipul. hyalinis. *Forsk. Æg.*

In *Arabia*.

Tota planta alba adparet. Caul. prostrati, dichotomi. Fl. conferti, sessil. Petal. mucrone fetiformi, extus sub apice.

458. *PHARNACEUM*. Cal. 5-phyll. Cor. o. Caps. 3-locul. polysper.

1. *Cerviana*. P. pedunc. subumbellat. lateralibus, folia linearia æquantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 20. f. 2.*

Aline &c. Pluk. mant. 9. n. 332. f. 11.

Spergula &c. Barb. cent. 3. tab. 62. f. 2.

P. umbellatum. Forsk. *Æg. Vahl*.

In Russia, Hispania, Asia ☉.

Caulic. palm. raro longiores, simpl. vel ramosi, 3-4. articulati. Fol. ex infer. geniculo 10-14. sessil. obtusa, crassiusc. plana, glauca: secundum genicul. fol. 5. inæqual. in superioribus geniculis numerus fol. minuitur. Ramuli axill. Fl. clausi. Fruct. 3-gonus.

2. *Mollugo*. *P. pedunc. 1-fl. lateralibus: fl. longitudine fol. caul. depresso. Syst. veg. ed. 14.*

Mollugo &c. *Burm. Ind. tab. 5. f. 4.*

Alfine &c. *Burm. Zeyl. tab. 7. Herm. Lugd. tab. 21.*

Rubia &c. *Pluk. mant. tab. 331. f. 4.*

In India orient. ☉.

Caul. procumb. herbac. dichotomi, articulati, teretes, fere læves, Fol. verticillata, 4-5. inæqual. subpetiol. elliptico-lanceol. acutiuscul. subcarnosa. Pedunc. ad verticill. fol. 4-5. 1-fl. albi. Cal. supra albus. Petal. minutiss. linear. angustiss. semi 2-fid. *Planta tota facie simil. Illecebro ficoideo.*

3. *depressum*. *P. pedunc. 1-fl. lateralibus: fol. lanceol. pubescentibus. Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 334. f. 4.*

Loellingia indica, Retz. *Obs. fasc. 4.*

In India orient.

Planta Mollugini simil. Caul. numerosi, prostrati, spitham. depressi, simplic. teretes, pubesc. Ramorum rudimenta axill. alterna. Fol. quaterna, aut bina, ex axill. plura, subsessil. basi angustiora. Stipul. solitar. parvæ, membranac. Panic. fere terminal. dichotomæ, inæqual. Fl. subsessil. (purpurei. Retz.) cinerei, scarioso-membranac.

4. *serpyllifolium*. *P. pedunc. 1--fl. fol. ovatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Planta tenera, fol. & caul. Herniaria glabra minor. Caul. filiform. articulati, glabri, ramosi, dichotomi. Fol. opposita, & plura, petiol. internodiis multo breviora. Pedunc. lateral. capillares, longitudine fol.

5. *incanum*. *P. pedunc. commun. longiss. fol. linear. stipul. pilosis. Syst. veg. ed. 14. An Pluk. phytog. 304. f. 4.?*

In Africa.

Caul. erectus, proliſer. Rami albidi. Fol ſparſa; ſolitar. lævia, patula. Stipul. albæ. Pedunc. terminal. Umbella compoſita, proliſera. Fl. albi, extus virid.

6. *diſtichum*. P. racem. 2-partit. flexuoſis: fol. ſublinear. pubeſcentibus. *Syſt. veg. ed. 14.*
Alſine &c. *Pluk. mant. tab. 33. f. 4. alm. tab. 130. f. 6.*

In India orient.

Fol. anguſta.

7. *cordifolium*. P. racem. 2-partit. terminalibus: fol. obcordat. *Syſt. veg. ed. 14. Am. acad. 6. afr. 6.*
Ad cap. 6. Spei.

Caul. ped. proſtrati, articulati; ſquamul. membranac. congeſtis. Rami alterni. Fol. plurima, verticill. integerr. glabra. Fl. albi, magnitudine *Spergula arvenſis*.

8. *lineare*. P. umbell. inæqualibus: fol. linear. oppoſitionibus remotis. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. 6. Spei.

Planta ſpergula arvenſi maior. Caul. proſtratus, articul. lævis, dichotome ramoſus. Fol. plurima, verticill. obtuſa, lævia, pollic. Umbell. lateral. & terminal. ſolitar. peduncul.

9. *glomeratum*. P. caul. flexuoſo: fol. linear. fl. glomerat. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. mant. tab. 331. f. 4.*

In Æthiopia ☉.

Caul. herbac. læves. Fol. plurima, verticillata, acuta, lævia, glabra. Fl. ad verticillos, parvi, minutiff. peduncul. præter umbellam glomeratam, folioſam. *Facies Molluginis.*

10. *quadrangulare*. P. ſubfruticoſ. fol. linear. 4-fariam imbricatis. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. 6. Spei h.

Facies Erica. Fol. minuta, aceroſa, lævia. Panicul. terminal. parvæ, conglomeratæ. Fl. albi, extus virides.

11. *microphyllum*. P. tomentofum: fol. ovat. teretiufcul. obtuſis, lana intertextis: peduncul. umbellat. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. 6. Spei.

12. *dichotomum*. P. fol. verticillat. linear. pedunc. axillar. elongatis, dichotomis. *Syſt. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. 6. Spei.

13. *albans*. P. fol. linear. exstipulat. peduncul. communibus longiss. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Fruticul. caulibus albis. Fol. opposita, patientia, oppositionibus remotis. Stipul. nullæ.
459. *ALSI-NE*. Cal. 5-phyll. Petala 5. bipart. æqualia. Caps. 1-locul. 3-valv. polysper.
1. *media*. A. petal. 2-part. fol. ovat-cordat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 525. 438. Black. tab. 164. Dod. pempt. 29. Loeß. ic. 460. Mutth.*
In Europæ cultis ☉.
 Caul. ped. debilis, ramosus. Fol. opposita, ima petiolat. super. sessil. connata, integerr. succulenta. Pedunc. axill. 1-fl. Petal. plana, alba. Caps. conica. Stam. num. varia.
Ad Stellariam pertinet, cum styli semper 3.
2. *segetalis*. A. petal. integris: fol. subulat. *Syst. veg. ed. 14. Vaill. Paris. tab. 3. f. 3.*
Habitat Parisiis, & in Pedemonte ☉.
 Fol. unilateral. Stipul. vaginant. membranac. Fl. umbellati. Petal. alba.
3. *mucronata*. A. petal. integris, brevibus: fol. setaceis: calyc. aristatis. *Syst. veg. ed. 14. Hall. Helv. tab. 17.*
In Helvetia, Gallia.
Planta difficillima ob similes, uti Arenaria fasciculata, & Minuartia montana. Caul. cespitosi, ped. ramosi, subhirsuti. Fol. fasciculata, longa, connata, acutiss. Fl. in iunioribus plantis axillar. in adultis quasi umbellati. Cal. albus, stria viridi. Petala ovata, alba.
-
- graminifolia*. A. (Arenaria) fol. lanceol. rigidis, hirsutis: caul. erecto, (plerumq.) 3-fl. *Arduin. Specim. 2. tab. 10.*
In altissim. montibus Feltrinis Vette.
 Caul. plurimi, simpliciss. subincani, 5 plerumq. genicul. Fol. radical. plurima, in cespitem imbricata, sesquiunc. longa: caulina opposita, lanceol. amplexicaul. Cor. alba. Styl. 4-5.
- prostrata*. A. caul. prostrato, dichotomo: fol. oblong. fl. pentandro, trigyno. *Forsk. Suppl. Æg.*
In Arabia.
460. *DRYPIS*. Cal. 5-dentat. Petal. 5. Caps. circumscissa, 1-sperma

1. *spinosa*. D. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 49. Michx. gen. tab. 23. fig. mola, cum sit erecta. Dalech. hist. 1480. Læb. ic. 789. Tabern. ic. 144. Bauh. hist. 3. pag. 388.*
Carduus &c. Moris. hist. 3. f. 7. tab. 32. f. 8.
In Italia, Hircia, Mauritania &c.
 Caul. primi procumbent. 4-goni, ramosiss. brachiati, superne dichot. cubital. Fol. Juniperina, subulata, subtrigona, mucronata, dihomotomiae lanceolat. utrimq. 3-dent. Cor. ex carneo-albescens.
461. BASEL-
 LA. Cal. o. Cor. 7--fid. lacin. 2. opposit. latioribus; tandem baccata. Sem. 1.
1. *rubra*. B. fol. planis: peduncul. simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 2. tab. 98. Hort. mul. 7. tab. 24.*
Gandola rubra. Rumph. amb. 5. tab. 154.
In India ☉.
 Caul. volubil. ruber. Fol. longe petiol. ovata.
 Cal. crassus, albus, apice purpureo.
2. *alba*. B. fol. ovatis, undatis: peduncul. simplic. folio longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*
Gandola alba. Rumph. amb. 5. pag. 417.
Mirabiri &c. Pluk. alm. tab. 63. f. 1.
In China, Amboina &c.
 Caul. herbac. perennis, viridis. Flos albus.
3. *lucida*. B. fol. subcordat. peduncul. confertis, ramosis.
Syst. veg. ed. 14.
In India ☉.
 Color plantæ lucidus. Affines sunt hæc 3 sp., sed constantes reperiuntur in hortis.
-
- japonica*. B. fol. rhombeo-ovat. peduncul. simplic. subdichot.
Burm. Ind. tab. 39. f. 4.
In Japonia ☉.
 Reliquis triplo min. Fol. ut in *Chenopodio Vulvaria*. Peduncul. semipollic. 1-fl. raro dichotomi.
462. SARO-
 THRA. Cal. 5-part. Cor. 5--petal. Caps. 1-loc. 3--valv. colorata.
1. *Gentianoides*. S. *Syst. veg. ed. 14.*
Centaurium minus &c. Pluk. mant. tab. 324. f. 4.
In Virginia, Pennsylvania apricis glareosis ☉.
 Caul. erectus, palmar. brachiatus, ramosiss. Fol. minima, opposita, subulata. Fl. solitar. alterni. sessil. flavi. Fructus parvi, elliptici, rubri.
Odor Pini graveolens. Vis vulneraria.

TETRAGYNIA.

463. PAR-
NASSIA. **C**al. 5-part. Petal. 5. Nectar. 5. cordata, ciliata, apicibus globosis. Capsl. 4-valv. 4-locul. loculis polysper.
- Essentia gen. in nectariis.*
1. *palustris*. P. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 384. Ludw. ed. tab. 110.
- Pyrola &c. Moris. hist. 3. f. 12. tab. 10. f. 3.
- In Europæ uliginosis, & ad rivulos 24.
- Scap. ped. simpl. parum contortus, angulosus, rigidus. Fol. radical. multa, petiol. rubentibus, cord t-acuta, integerr. glabra, pallide virent.
- Fol. caulinum plerumq. solitar. Flos terminalis, unicus, albus; quandoq. plenus.
-
- polynectararia*. P. fol. lineari-lanceol. Nectar. 10-fetosis. Forsk. Suppl. Æg-Arab.
- In Arabia.
- Caul. decumbent. pedal. ramosi, inferne violac. superne virides. Fol. semipollic. opposita, sessil.
- Pedunc. 1-fl. Cor. alba, nervis violac. subtus in medio violacea.
464. EVOL-
VULUS. Cal. 5-phyll. Cor. sub 5-fid. rotata. Capsl. 3-locul. Sem. solitar.
1. *nummularius*. E. caul. repente: fol. subrotund. fl. subsessilibus.
- Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. pict. tab. 260. f. 23.
- Convolvulus &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 96. f. 2.
- In Jamaica, Barbados pratis.
- Caulicul. longi, radicans. Fol. $\frac{1}{2}$ unc. longa, semunc. lata, alterna, petiol. fuscis, apice crenata. Fl. axillar. solitar. dilute cœrul. carnei, vel albi. Capsl. fusca.
2. *gangeticus*. E. caul. diffuso: fol. cordat. obtusis, mucronatis, villosis, petiolat. pedunc. 1-fl. Syst. veg. ed. 14.
- In India.
- Caul. 2-ped. ramosi. Fol. tenella, & fl. villosiss.
- Pedunc. breves, capillar.
3. *alsinoides*. E. caul. diffuso: fol. obcordat. obtusis, pilosis, petiolat. pedunc. 3-fl. Syst. veg. ed. 14.
- Anagallis &c. Burm. Zeyl. tab. 6. f. 1. & tab. 9. f. 1. Pluk. alm. tab. 9. f. 1.
- Vistru-claudi. H. Mal. 11. tab. 64.
- In Malabar, Zeylona &c. ☉.

PENTANDRIA TETRAGYNIA. 205

Tota planta hirsutie rufa. Caul. ramosus. Fol. alterna, breviter petiol. Fl. axillar. longe peduncul. pro plantæ ratione magni, cœrul.

4. *emarginatus*. E. fol. reniform. repandis, emarginatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 30. f. 1.*

In India ☉.

Caul. radicans. filiform. glaberrimi. Fol. alterna, petiol. Fl. axillar. parvi, solitar. Capf. glaberrima.

5. *linifolius*. E. caul. erecto: fol. lanceol. sessil. villosis: pedunc. longis, 3-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Convolvulus &c. *Brown. Jam. 10. f. 2.*

In Jamaica ☉.

Facies *Lini*. Cor. cœrul.

6. *3-dentatus*. E. fol. lineari-cuneiform. tricuspidad. basi dilatata, dentat. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 16. f. 3.*

Convolvulus &c. *Pluk. mant. tab. 167. f. 5.*
Sendera—*Claudi. H. Mal. 11. tab. 65.*

- b. *C. indicus* &c. *Pluk. alm. tab. 276. f. 6.*

In India.

Caul. pl. volubil. 5-angulari, glabri, viridi--fufcescent. Fol. alterna, glabra. Fl. axillar. longe peduncul. Cor. ex albo--flavesce. ad umbilicum purpuro-rubra. Capf. cuspidata.

- hederaceus*. E. fol. cordat. repandis: pedunc. sub 3-fl. *Burm. Ind. tab. 30. f. 2.*

In Java.

Caul. volubil. Fol. infer. cordat--acumin. super. obtusa. Pedunc. infer. 1-fl. superior. 3-fl. Cor. parva, lutea. Capf. subglobosa, glaberrima.

PENTAGYNIA.

465. *ARALIA*. **I**nvoluc. umbellulæ. Cal. 5--dent. superus. Cor. 5-petala. Bacca 5-sperm.

1. *arborea*. A. caul. arboreo: fol. simplic. umbell. universal. radiis uniglandulos. *Syst. veg. ed. 14.*

Hedera &c. *Plum. ic. 148.*

In Jamaica ☿.

Arb. 15-ped. odore ingrato. Fol. alterna, petiol. ovalia, acumin. ferrata, utrimq. nitida. Stipul. lanceol. Racemi terminal. erecti. Involuc. 1-phyll. Fl. parvi. Petal. sordide albescentia. Baccæ globosæ, fulcatæ, & coronatæ.

2. *spinosa*. A. arborecens; caule, foliisq. aculeatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Angelica &c. *Comm. hort. 1. tab. 47.*

Chrystophoriana &c. *Pluk, alm. tab. 20.*

In Virginia h.

Fol. ampla, impari-pinn. ad instar *Angelicæ*, sicuti & foliol. quæ breviter petiol. ovalia. Fl. in acervis sparsi, parvi, herbacei. Bacca 3-gon.

3. *pentaphylla*. A. arborea, aculeata: fol. quinatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Dara. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 895.

In Japonia h.

Rami flexuosi, aculeati, cinerei. Aculei axillares, solitarii, horizontal. Fol. e geminis 3-4-plura, petiol. foliol. subpetiol. ovata, acuta, superius ferrata, inferius integra, attenuata, inermia, glabra; infer. min. intermedium maximum, pollicar. Petioli patentes, palmar. Fl. inter fol. umbellati. Umbella simplex, pedunculata.

4. *chinensis*. A. frutesc. caul. petiolisq. aculeatis: foliol. incrimibus, villosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Nalugu. H. Mal. 2. tab. 26.

Frutex &c. *Rumph. Amb. 4. tab. 44.?*

In China h.

Caul. simpl. apice tantum foliosus. Petioli 3-part.

Fol. partialia pinnata, & insuper foliol. 3 ad ramificationes petioli. Pinnæ ovatæ, ferratæ, subtus præsertim villosæ, duplo ma: quam in *spinosa*. Panicul. ramosa, umbellul. numerosis.

5. *japonica*. A. frutesc. fol. lobatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Jaats Ta. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 790.

In Japonia h.

Caul. fruticos. erectus, orgyal. inerm. Fol. in apice frequentia, alterna, petiol. inciso-7-lobat. iuniora 5-loba, adultiora 3-4. duplo ma: nervosa, reticulata, supra virid. subtus pallida: lobi digital. incisuris rotundat. a medio ad apicem ferrati, acuti. Petioli. amplexicaul. Bract. plurimæ. Fl. terminal. paniculati. Pa-

nicul. composita. Umbell. simplex, subrotun.
Petal. lineam longa, alba.

6. *racemosa*. A. caul. folioso, herbac. lævi. *Syst. veg. ed. 14.*
Punaces. Corn. Can. tab. 75. Barr. ic. 705.
Chysophoriana &c. *Morif. hist. 3. j. 1. tab. 2.*
f. 9.

In Canada 24.

Rad. tuberosa, crassa, aromatica. Caul. articul.
obscure purpur. Fol. bina, terna, petiol. in-
cronata, ferrata. Fl. axillar. racemosi. Petal.
alba. Baccæ sature rubentes.

7. *nudicaulis*. A. caul. herbac. subnudo: fol. binis, ternatis.
Syst. veg. ed. 14.

Christophoriana &c. *Pluk. alm. tab. 238. f. 5.*

In Virginia 24.

Radix repens, aromatica. Caul. brevissim. & fere
nullus. Fol. decomposit. petiol. longis. Foliol.
pinnata: pinnæ 5. ferratæ. Scapus inter 2. fol.
ortus, 3. umbellulas ferens.

- cordata*. A. herbacea, caul. angulato, inermi: fol. sim-
plicibus, cordatis. *Thumb. Jap.*

Dosjen. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 826.

In Japonta 24.

Caul. suffrutescens, adscendens, parum ramosus,
angulatus, villosus. Fol. 2-pollic. inæqual.
alterni, petiol. acuta, ferrato-dent. utrimq.
glabra, subtus pallida, nervosa. Fl. axill. um-
bellati. Pedunc. trichotomi, & pedicelli to-
mentosi.

- capitata*. A. caul. arboreo: fol. simplic. fl. in capitula con-
gestis. *Jacq. Amer. tab. 61.*

In sylvis Martinkæ h.

Arb. altitudine varia, ramosa. Fol. magnitudine
varia, in ramulorum apice alterne sparsa,
petiolat. coriacea, rhombeo-ovata, vel obo-
vata, acumin. basi attenuata, integerr. nitida,
Panicula terminal. erecta. Ultimi fl. in capi-
tulum globosum collecti.

466. COM- Cal. 1-phyll. corollifer. Petal. 5. Nectar. 5-part.
MERSONIA. Caps. 5-locul. echinata.

1. *echinata*. C. *Syst. veg. ed. 14. Forst. Gen.*

Restiaria alba. *Rumph. 3. Amb. tab. 119.*

In Tuheiti h.

Arbor fol. alternis, oblique ovata, acuminat. fer-

ratis, subtus canis. Fl. paniculati, minuti, caui. Fruct. simillim. *Sparmannia* tam quoad fig. quam superficiem.

467. STATICE. Involuc. univernale varium. Cal. proprius infundibuliform. limbo integro, plicato. Petal. 5 sentim dilatata, & iuxta se posita, infundibulum referentia. Fruct. stellatus, 1-sperm. ex calyce persistente.

1. *Armeria*. S. scapo simpl. capitato: fol. linear. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 29.*

In Europæ, & Amer. septentrion. campis, & collibus saxosis 24.

Scapus semiped. nudus. Fol. radical. conferta, integerr. nervo simplici, læte virid. Capitulum terminal. globosum, convexum. Fl. amæni, dilute purpurasc.

2. *Pseudo-armeria*. S. scapo simpl. capitato: fol. longe lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

S. plantaginea. *All. Fl. Ped.*

S. *armeria* ma: *Jacq. hort. 1. tab. 42.*

S. *Lulitan*. *Scorzonera* fol. *J. R. H.*

Habitat in Pedemontii vallibus, & montibus 24.

Priore quadruplo maior. Fol. nervosa, subincana. Cal. squamis lanceol. acuminat. Cor. alba, anih. cœrul.

3. *Limonium*. S. scapo paniculato, tereti: fol. enerviis, lævibus, subtus mucronatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 315. Black. tab. 481.*

Limonio. *Matth.*

In Europæ, & Virgin. maritimis 24.

Rami simplic. Fol. radical. sessil. lanceol: integerr. glabra. Fl. numerosi, secundi, purpurasc. *Mire variat, præsertim fol.*

4. *incana*. S. scapo paniculato: fol. lanceol. trinerviis, subundulat. apice mucronatis: panicul. ramis triquetris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Arabia 24.

Fol. radical. elliptico-lanc. incana. Scap. teres. Cal. acutus, albus, striis 5. virid. Bract. 3-4. subulatæ, breves, parulæ. Fl. albi.

5. *cordata*. S. scapo paniculato: fol. spathulat. retusis. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. *Barr. ic. 805.*

Ad maris Mediterran. littora 24.

An Var.

- An Var. S. Limonii?* Caulicul. spitham. Cal. albus, angulis rubent. Cor. purpuro-cærul.
6. *reticulata*. S. scapo prostrato, paniculato: ramis sterilibus, retroflexis, nudis: fol. cuneiform. muticis. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. *Bocc. Sic. tab. 44. Pluk. alm. tab. 42. f. 4.*
In Melita.
 Caul. reticulat. fusco-rubens. Fol. obscure virent. glabra, duriora. Rami retiformiter se invicem implicati: Fl. parvuli, purpurasc.
7. *echioides*. S. scapo paniculat. tereti, articulado: fol. scabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. *Magnol. Monsp. tab. 2. f. 4.*
In squallidis, & saxosis montibus Monspelii ☉.
 Caul. erect. palm. nudus, squamosus, sæpe rubens. Fol. in rosulam disposita, obovata, obtusa, quædam emarginata, rubentia. Fl. alterni, remoti, sessiles, secundi. Cor. parva, purpur-cærul.
8. *speciosa*. S. scapo dichotomo, ancipiti: fol. ovat. mucronat. fl. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. *Gmel. Sib. 2. tab. 91. f. 1.*
In Tataria ♂.
 Caul. palm-cubital. subramos. sæpe alatus, sæpe nudus. Fol. in orbem disposita, supra obsolete virid. subtus purpur. utrimq. albu-punctata, quandoq. lanceol. in spinam terminata. Cal. integer, albus. Cor. purpur. linea saturiore.
9. *tatarica*. S. scapo dichotomo: fol. elliptico-oblong: mucronat. fl. alternis, distantibus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 92.*
Limonium &c. *Boerk. Lugd. 1. tab. 76.*
In Tataria ♂.
 Caul. ab exortu ramosus. Fol. longa, petiol. glaberr. in spinulam mollem terminata. Cal. pllicatus. Cor. primum rubella, dein alba.
10. *Echinus*. S. scapo paniculato: fol. subulat. mucronat. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. *Buxb. cent. 2. tab. 10.*
b. Echinus &c. *Alp. exot. tab. 36.*
In Græcia, & Media desertis.
 Scap. simpl. Fol. imbricata, subulata, supra plans, margine scabra; inferior, reflexa. Cor. amæne purpurasc.

210 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

11. *flexuosa*. S. scapo flexuoso, ramoso: fol. nervosis: corymbis terminal. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 89. f. 1. male.*

In Sibiria.

Rad. palmo longior, extus fusca, intus alba. Fol. radicalia, in orbem posita, 2-3. unc. longa, quandoq. verticaliter ovata, & tunc ultra dimidiam unc. lata, quandoq. oblonge ellipt. omnia obrufa, læte virid. cæteris speciebus tenuiora. Scap. dodrant. dichotome divisus, squamosus. Capitul. 1-2-3. subrotunda. Cal. maiuscul. totus albus: squamæ vero huic subiectæ subenti-albo colore mixtæ. Cor. minima, atro-cærul.

12. *purpurata*. S. caul. subfolia o: fol. obovato-cuneat. mucronat. trinerviis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei 24.

Simil. S. Limonio, sed fol. obtusiora. Fol. caulina nonnulla. Fl. duplo minus colorati. Scap. spitham. dichotomo-ramosus. Fol. radical. obovat-lanc. obtusa, mucrone terminali, petiolat. lævia. Scap. ramosus. Bract. folitar. ovatæ. Cal. purpurea. radiis 5. sanguin. Cor. purpurea.

13. *minuta*. S. caul. suffrutic. folioso: fol. confertis, cuneat. mucicis, glabris: scapo paucifl. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Boec. Sic. tab. 34. & tab. 13. f. 3. Pluk. alm. tab. 200. f. 5.

Ad mare Mediterran. h.

Caul. vix digital. Fl. pallide rubent.

14. *suffruticosa*. S. caul. fruticoso, superne nudo, ramoso: fol. lanceolat. vaginantibus: capitul. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 2. tab. 88. f. 2. 3.*

In Sibiria h.

Caul. multi, semiped-dodrant. procumb. dein erecti, ramosi. Capitul. alterna. Cal. albidofuscus. Cor. pallide cærul.

15. *monopetala*. S. caul. fruticoso, folioso: fol. lanceol. vaginantibus: fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

Limonium &c. Boec. Sic. tab. 16. 17.

In Sicilia h.

Caul. spitham. multigenicul. dichotom. Pedunc. erecti, sæpe hini, spicati. Bract. puniceæ. Spic. alternæ, sessil. 3-fl. Cal. violac. Cor. 5-

- fid. violac. *Gallas sæpe fert ex Phalena*. *Reaum. Inf. 3. tab. 39. f. 1. 4.*
16. *aurea*. S. caul. frutic. folioso, ramoso: fol. (caulinis) subulat. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. Amm. ruth. tab. 18. f. 2.
In Dauriæ campis montosis.
 Fol. radical. petiol. ovata. Fl. corymboso-fascicul. Cal. aureus.
17. *serulacea*. S. caul. fruticoso, ramoso, ramulis imbricat. paleis apice pilo terminatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonium &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 1. f. 23. Pluk. alm. tab. 28. f. 4.
In Barbaria, Lusitania, Hispania h.
 Caul. sublignosi, teretes, nudi, paleis alternis, paniculati. Fl. subimbricati, adscendent. secundis, lutei.
18. *linifolia*. S. caul. fruticoso, prostrato: fol. linear. fl. paniculat. secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
19. *pruinosa*. S. caul. flexuoso, ramoso, furfurac. *Syst. veg. ed. 14.*
S. aphylla. Forsk. Æg. Vahl.
In Palæstina, & Arabia.
 Planta tota furfuracea. Rami ramulis geminis, obtusis, paniculat. Stipula sub singulo ramo lanceol--subulata.
20. *sinuata*. S. caul. herba: fol. radical. alterne pinnato-sinuatis: caulinis ternis, triquetris, subulat. decurrentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Limonii &c. Rauw. it. tab. 314.
Limonium &c. Clus. cur. tab. 33.
b. L. africanum &c. Mart. cent. tab. 48.
In Sicilia, Palæstina, Africa g.
 Cal. coerul. Cor. nivea. b. *Fol. minus sinuata:*
21. *mucronata*. S. caul. crispo: fol. elliptic. integris: spicis secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Heritier.*
Stirp. nov. fasc. 2. tab. 13.
In Barbaria 24.
Adfinis priori, præcipue caul. crispis: & fl. secundis. Fol. radical. pollic. petiolat. valde mucronata, lævia, atomis albis adspersa. Caul. palmar. aphylli, membranulis longitudinal. decurrentibus ad proximam bracteam, angustis, undulat. apice mucronat. superne ramis simplic. spicatis. Spicæ dimidiatæ, fl. confertis, sessil.

212 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

gluma exceptis. Cal. albi. Cor. rufesc. lacín.
emarginatis.

21. *lobata*. S. caulibus teretibus, aphyll. fol. sinuatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Africa.

Planta minor S. *sinuata*, sed caul. ramique teretes. Bract. simil. sinuatæ. Cal. albus. Cor. cœrul.

- axillaris*. S. caul. fruticoso, folioso: paniculis axillaribus, dichotom. fl. confertis, erectis. *Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Abfq. fl. simillima S. *monopetal*. Caul. erecto-dif-fusi, spinham. squamati, ferrugin. Fol. alterna, petiolis vaginant. digitum transversum longa, oval. obtusa, nuda, crassa, plana. Fl. in sum-mis alis. Cal. ferrugin. Cor. membranac. alba, radiis 5. angularibus, ferrugineis.

- olæfolia*. S. fol. lanceol. subaristat. margine albo: caulibus dichotomis, flexuosis, subnudis. *Scop. Delic. Insul. fasc. 1. tab. 10. Barr. ic. 790.*

In Amboin: &c. 24.

Fol. radicalia, in petiolum decurrent. acumin. integra, marginata. Caul. erecti, unico fol. prope basin donati. Fl. terminal. dense spica-ti, 3 simul, unilateral. Bractea singulo flori laterali subiacens. Cor. subrubra.

468. LINUM. Cal. 5-phyll. Petal. 5. æqualia. Capf. 5-valv. 10-locul. Sem. folitaria.

Filom. 5. basi membranosa communi inter se con-nexa.

* *Folius alternis.*

1. *usitatissimum*. L. calyc. capsulisq. mucronatis: petal. crenatis: fol. lanceol. alternis: caul. subsolitar. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 2. tab. L. 9. Ludw. ed. tab. 144. Black. tab. 160.*

Inter segetes Europæ austral. ☉.

Caul. pedal-cubit. Fol. angusta, sessil. integerr. mollia, glabra. Fl. laxè paniculati. Petal. sub-rotun. cœrul. alba, rosea.

2. *perenne*. L. calyc. capsulisq. obtusis: fol. alternis, lanceolat. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Mill. dict. tab. 166. f. 2.*

In Sibiria, Cantabrigiæ, & Pedemontio 24.

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 213

Duplo ma. priore. Caul. magis ramosus. Fl. ma. Cor. stricta, cœrul. ut in priore, sed integra.

3. *viscosum*. L. fol. lanceol. pilosis, 3-nerviis. *Syst. veg. ed. 14.*
L. sylvest. *Fl. Carniol.*
In montibus Italiae &c. 24.

Fol. paulo latiora vulgari. Cor. incarnata, liturris sanguin. notata. *Est eadem planta cum sequenti.*

4. *hirsutum*. L. calyc. hirsutis, acumin. sessil. fol. alteris; rameis oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 31. Scop. Fl. Carn. tab. 11. Moris. hist. 2. f. 3. tab. 26. f. 5. Clus. hist. 1. pag. 317.*
In Austria, Italia, Tartaria.

Simile L. *nodifloro*. sed caul. teres. Fol. latiora, hirsuta. Planta hirsuta. Caul. subpedal. Fl. lanceol. aut ovata. Calyc. longi, ciliati. Petal. obtusiss. lineata, cœrul. vel albida.

5. *narbonense*. L. calyc. acuminat. fol. sparsis, lanceolat--acumin. strictis, scabris: caul. tereti, basi ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zan. tab. 191.*
In Gallo-provincia, Helvetia &c. 24.

Caul. ped. cubit. Fol. variae latitudinis, glauca, duriora quam in vulgari. Cal. magnus, lanceolat. latere membranac. apice exquisite acuminat. & quasi mucrone subulato instructus. Petal. ampla, cœrul.

6. *tenuifolium*. L. calyc. acuminat. fol. sparsis, lineari--setaceis, retrorsum scabris. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 215. Clus. hist. 1. pag. 318.*
In Europa aridis herbosis 24.

Caul. subped. stricti. Fol. firma, nitida. Fl. subpanicul. Petal. rosea, purpur. alba.

7. *gallicum*. L. calyc. acutis, subularis: fol. lineari--lanceol. alternis: paniculae peduncul. 2-fl. fl. subsessil. *Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 15. f. 1.*
Habitat Monspelii &c. 24.

Petal. lutea. Pistil. quandoq. 3. saepius 5.

8. *maritimum*. L. calyc. ovatis, acutis, muticis: fol. lanceol. inferioribus oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 154. Bauh. hist. 3. p. 454. Dod. pempt. 534.*

In Austria, Italia, Gallia &c. locis maritimis 24.
Adfne priori. Planta tota glaberr. ma. Caul. pl. ped. & ultra, superne ramosi, toti foliosi,

214 PENTANDRIA PENTAGYNIA

- glauca. Fol. glauca. Cor. lutea. Capf. sub-
 rotunda, acuta, glabra, apice dentata.
9. *alpinum*. L. calyc. rotundat. obtusis: fol. linear. acutiuscul.
 caulibus declinatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 321. Clus. hist. 1. p. 318. Zan. tab. 107.*
In Austria &c. alpinis ☉.
- Planta tota lævis. Caul. subpedal. teretes, sim-
 plic. apice multifi. & sæpe divisi. Fol. sparsa,
 adscendent. sessil. inferior. imbricatim reflexa,
 cinerea, subpilosa, mollia. Fl. non parvi.
 Cal. foliol. aristatis, inæqual. ora alba. Petal.
 aristata, non emarginata, crenulata, dilute
 purpur.
10. *austriacum*. L. calyc. rotundat. obtusis: fol. linear. acutis,
 rectiuscul. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 418. Tabern. ic. 812.*
In Austria infer. Palatinatu.
- Caul. diffusi, subped. teretes, apice ramosi, L.
 usitatissi. breviores. Fol. sparsa, glabra. Fl.
 ante anthesin nutantes. Petal. magna, inte-
 gerr. striata, facie L. *usitatissimi*, venis satu-
 rioribus, subtus pallidiora. Anth. albæ. Pistul.
 reflexa extra stam. Stigm. capitata.
11. *virginianum*. L. calyc. acutis, alternis: capsul. muticis: pan-
 icula filiform. fol. alternis, lanceol. radicalibus
 ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia, Pennsylvania.
- Caul. ped. filiform. Fl. alterni, breviter pedun-
 cul. Cor. lutea. Capf. globosa.
12. *flavum*. L. calyc. subserrato-scabris, subsessil. lanceol. pa-
 nicula ramis dichotom. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 214.*
L. latifolium &c. Bauh. hist. 3. p. 454.
L. sylv. 3. Clus. hist. 1. p. 317.
In Austria, Pedemontio ☿.
- Caul. subped. glabri, striis eminentibus angulati.
 Fol. sparsa, sessil. lanceol. acumin. crassula,
 glabra, cum puncto utrimq. ut in L. *campanulato*. Petal. ampla, flava, lineis croceis.
13. *strictum*. L. calyc. subulatis: fol. strictis, lanceol. mucronat.
 margine scabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Passerina &c. Bauh. hist. 3. p. 454.
In Monspelii, Hispania, Sicilia &c. squallidis ☉.
- Planta corymbosa, stricta. Caul. semiped. Fol.
 cauli adpressa, nervo, & margine scabra, *Lin.*
ulg. similia. Cor. lutea.

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 225

14. *suffruticosum*. L. caul. suffruticoso: fol. linear. acutis, scabris. *Syst. veg. ed. 14.*
In regno Valentino h.
Fol. aculeata.
15. *arborescens*. L. caulibus arborescentibus: fol. cuneiformi-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Alp. exot. tab. 13.*
In Creta, Italia h.
Frutex ramis angulat. Fol. alternis, sessil. avenia, glabra. Fl. magnitudine L. *vulgaris*, peduncul. Cal. foliol. aristat. Petal. subrotund. lutea. Caps. acumin.
16. *campanulatum*. L. fol. basi utrimque punctata, glandulosa, *Syst. veg. ed. 14.*
Campanula &c. *Lob. ic. 414. Bauh. hist. 2. p. 817.*
In Gallo-provincia, Montpelii &c. montibus 14.
Caul. digital. simplic. angulato-striati, sæpe 5-gon. Fol. non serrata interior. spatul. super. L. *vulgaris*. Fl. terminal. sæpe 3. magni, peduncul. Calyc. lanceol. acumin. Petal. crocea.
** Fol. oppositis.
17. *africanum*. L. fol. oppositis, lineari-lanceol. fl. terminal. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14.*
In Africa h.
Caul. pedic. suffruticos. strictus, teres, ramis simplic. Fol. sessil. erecta, lævia. Umbel. terminal. 4-5-fid. radiis dichotomis. Cal. acuminat. margine scaber. Petal. lutea, unguibus villosis, demum fulva.
18. *nodiflorum*. L. fol. floriferis oppositis, lanceolat. fl. alternis, sessil. calyc. longitudine fol. *Syst. veg. ed. 14.*
L. *luteum* &c. *Morif. hist. 2. f. 5. tab. 26. f. 11.*
Column. ecphr. 2. tab. 80.
In Italia pratis argillosis.
Caul. angulat. lævis, 2-3-fid. Fol. utrimq. ad basin glandula ovata fusca: caulina alterna, lanceol. Cal. linearis, foliac. Cor. flavesce. Caps. globosa, acumin.
19. *catharticum*. L. fol. oppositis, ovat-lanceol. caule dichot. cor. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 851.*
Black. tab. 368. Lulw. ed. tab. 143.
Chamælinum &c. *Barr. ic. 1165.*
Spergula bifolia &c. *Loef. pruss. tab. 86.*
Alpine verna &c. *Bauh. hist. 3. p. 55.*
In Europa pascuis succulentia ©:

- Caulic. dodrant. rubri. Fol. parva, sessil. integerr. ima obtusa, super. lanceol. Fl. laxa panicul. ante anthesin penduli. Petal. alba, ungue luteo. *Var. fl. tetrand. tetragynis.*
20. *Radiola*. L. fol. opposit. caule dichot. fl. tetrand. tetragyn. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 178.*
Radiola. Dill. *gicss. app. tab. 9. Eph. N. C. cent. V. VI. app. tab. 9. Rali. Angl. 3. tab. 13. f. 3.*
Chamælium &c. *Vaill. parif. tab. 4. f. 6.*
Linocarpum &c. *Mich. gen. tab. 21.*
In Europæ sabulo inundato ☉.
Differt ex habitu a priore, longe min. ramis brevioribus, crebrioribus; & fol. brevioribus. Caul. decumbent. ramosiss. Fol. ex rotundo-lanceol. Fl. terminal. fasciculati. Petal. 4. minima, ovat. emargin. Caps. 8-locul.
21. *quadrifolium*. L. fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia.
Caul. semi-1--ped. erecti, superne ramosi. Fl. ampli, cœrulei.
22. *verticillatum*. L. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Bocc. mus. 2. tab. 42. Barr. rar. tab. 1226.*
In Italia ☉.
Caul. pedat. Calyc. & fol. super. villosa. Flos cœsius.
-
- Leve.* L. fol. nullibi scabris: cal. lacin. 5-dentat. *Scop. Fl. Carn.*
In Carniola.
Caul. basi procumb. spitham. apice ramosus, striatus. Fol. densa. Cal. minime attenuatus in acumen, neque glandulosus, ut in L. tenuifolio.
469. *ALDOVRANDA*. Cal. campanifor. 5-part. Petal. 5. Caps. 5-valv. 1-locul. 10-sperm.
- I. vesiculosa*. A. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Bon. 2. p. 3. tab. 12.*
Leuticula &c. *Pluk. alm. tab. 41. f. 6.*
In Italia, & Indiæ paludosis 24.
Utriculos gerit fere ut Utricularia, sed confertos. Caul. dodrant. & ultra, simpl. plerumq; articulis crebris. Fol. 7-8-9. verticill. cuneiformi-retusa, crassiuscula, intus veluti spongiosa, in 6. virid. barbularum desinentia. In quarum medio follicul. oblique appenditur ex orbicul. membrana in semicircular. formam sic complicata, ut ventricosus adpareat. Petal. ovata,

vix calyce ma. fordide alba, conniventia, raro
expansa. Fruct. globosus, Pisi magnitudine.

470. DROSE-*Cal. tubulosus, 5-fid. Petal. 5. Capf. 1-locul. api-
ce dehiscens, 5-valv. polysperm.*

1. *acaulis. D. fl. radicali e scapo solitar. fol. oblongis. Syst.
veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

2. *cuneifolia. D. scapis radicatis: fol. cuneat-rotundat. Syst.
veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. sessilia.

3. *rotundifolia. D. scap. radicatis: fol. orbiculat. Syst. veg. ed.
14. Black. tab. 432.*

Rorida. Lob. ic. 811.

Ros solis. Barr. ic. 251.

Salsifiora. Thal. herc. tab. 9. f. 1.

*In Europæ, Asiæ, Amer. paludosis, & montibus
○.*

*Fol. radical. integerr. concava, fetis rubent. ci-
liata. Scap. nudus, subruher, Spica terminal.
paucifl., subunilateral. Cor. alba.*

4. *longifolia. D. scap. radicatis: fol. ovali-oblong. Syst. veg.
ed. 14.*

*Ros solis &c. Barr. ic. 251. n. 11. Dod. 474.
fig. exterior.*

Salsifiora &c. Thal. herc. tab. 9. f. 2.

*In Europæ pratis spongiosis, & ad fontium scatur-
igines ○.*

*An var. prioris, cum differat tantum fol. ellip-
ticis?*

5. *aeapensis. D. scap. radicatis: fol. lanceolat. subtus scabris,
Syst. veg. ed. 14. Burm. Afric. tab. 75. f. 1.*

In Æthiopia.

Radix emittens fila spiralia. Scapi pl. spitham.

*Fol. 3-pollic. obrufa, ciliata, supra hirsuta,
petiolat. radicalia. Fl. racemosi, pedicellat. se-
cundi. Cor. violac.*

6. *lusitanica. D. scap. radicatis: fol. subulat. subtus convexis:
fl. decandris. Syst. veg. ed. 14.*

*Ros solis &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 4.
Pluk. atm. tab. 117. t. 2.*

In Lusitania.

*Planta dubii generis. Scap. aliquot foliis. Fl.
2-4. terminal. peduncul. Fol. dodrantal. supra
sulcata, pilosa. Fl. magni. Capf. calyce du-
plo longior.*

218 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

7. *ejusflora*. D. caul. simplici, folioso: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Afric. tab. 75. f. 2.*

Ros folis &c. *Breyn. prodr. tab. 22. f. 2.*

Ad cap. b. Spei.

Caul. pedat. herbac. simpl. pubescens. Fol. alterna, hispida, pilis glutinosis. Fl. terminal. 1-2-3. pedunculati, magis, fundo atro. Stam. nigra. Anth. luteæ. Pistil. nigrum.

8. *indica*. D. caul. ramoto, folioso: fol. linear. *Syst. veg. ed. 14.*

Ros folis &c. *Burm. Zeyl. tab. 94. f. 1.*

Araca-puda. *H. Mul. 10. tab. 20.*

In India.

Caul. semiped. herbac. Fol. alterna, petiol. versus medietatem villosa.

471. GISEKIA. Cal. 5-phyll. Cor. 0. Capsf. 5. adproximatæ, subrotun. 1-spermæ.

1. *pharnacioides*. G. *Syst. veg. ed. 14.*

Köelreutera &c. *Comm. nov. Gott. 2. T. 2. tab. 2. f. 1. Pluk. phyt. tab. 130. f. 3.*

Pharnaceum occultum. *Forsk. Æg. Vahl.*

In India orient. ☉.

Caul. decumbent. herbac. globri, pedat. teretes, exarati latere superiore linea, genicul. remotis. Rami baseos, alterni. Fol. opposita, petiol. elliptico-lanceol. integerr. obtusa, patentia, lævia. Pedunc. axillar. foliar. teretes, nudi. Umbell. simplex, multifi. Fl. extus virid. intus albi, deorsum penduli, excepto die florecentiæ. *Herba Illecebræ ficioides.*

472. CRAS- Cal. 5-phyll. Petal. 5. Squamæ 5. nectarifer. ad
SULA. basin germinis. Capsf. 5. Staminibus 5 a sedo differt. Folia carnosæ, succosæ.

* *Frutescentes.*

1. *coccinea*. C. fol. ovat. planis, cartilagineo-ciliar. basi conato-vaginant. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. B. 2.*

Cotyledon &c. *Comm. rar. tab. 24. Bradl. succ. 5. tab. 50. Breyn. prodr. 3. tab. 20. f. 1.*

In Æthiopia h.

Caulis erectus, fruticosus, rubens. Fol. confertim opposita, ut quasi 4-faria, pollicar. & ultra, acutiuscul. succulenta. Fascicul. terminal. bis dichotom. fl. sessil. alternis, coccineis, 1-petal. limbo 5-par.

2. *cymosa*. C. fol. linear. cartilagineo-ciliat. connato-vaginant. caul. fruticoso: cyma terminal. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Caul. erecti, spitham. glabri, annui. Fol. opposita, glabra. Cyma parva, densa, 2-fid. squamosa. Cor. lacin. revolutis.
3. *flava*. C. fol. planis, connato-perfoliat. lævibus: fl. corymbofo-paniculat. *Syst. veg. ed. 14. Burm. afr. tab. 23. f. 2.*
Sedum &c. Pluk. alm. tab. 314. f. 2.
Ad cap. b. Spei 15.
 Caul. erectus. Fol. non ciliata. Fl. singuli pedicell. Petal. erecta, flava.
4. *pruinosa*. C. fol. subulat. pruinoso-scabris: fl. corymbosis. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 15.
 Planta tota adpersa pruina crystallina. Frutex ped. dichotom. ramulis teretibus, sanguineis. Fol. opposita, carnosa, supra plana, obsolete connata. Corymb. terminal. inæqual. parvi. Petal. lanceol. patentia, alba.
5. *scabra*. C. fol. oppositis, patentibus, connatis, scabris, ciliatis: caul. retrorsum scabro. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 99. f. 117.*
Coryledon &c. Mart. cent. tab. 24.
Ad cap. b. Spei.
 Caul. diffusus, spitham. Fol. lineari-lanceol. plana. Corymb. breves, 2-fid. Cor. lacin. revolutopatient. herbaceo-flavescent.
6. *perfoliata*. C. fol. lanceol-subulat. sessil. connatis, canalicul. subtus convexis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 108. Dill. elth. tab. 96. f. 113.*
Aloe &c. Comm. præl. tab. 23.
In Æthiopia 15.
 Fol. decussata, crassa, glauca. Petal. alba, unguibus minimis. Stam. receptaculo inserta.
7. *fruticulosa*. C. fol. oppositis, subulat. acuris, patent. subrecurvat. caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 15.
 Caul. ped. subdivisus, lævis. Fol. foliis *Juniperi* non maiora, sessilia, teretia, carnosa. Peduncul. terminal. filiform. solitarii, uno, alterove fol. pari, subumbell. Bract. oppositæ, minutæ. Fl. parvi, campanul. albi.

220 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

8. *tetragona*. C. fol. subulat. subincurvis, obsolete 4-gonis, parentibus: caul. erecto, arborecente, radicante. *Syst. veg. ed. 14.*

Cotyledonoides &c. *Bradl. succ. 3. tab. 11. f. 4^r.*

In Æthiopia.

Caul. 3-4-ped. ramosus, rufescens, erectus, fibris radicans. Fol. cruciatim posita, crassitie pennæ anserinæ, sursum leviter arcuata. Peduncul. terminal. teres, nudus. Cyma fastigiata, ramosiss. 3-fid. Cor. alba. Anth. purpur.

9. *dichotoma*. C. fol. connatis, tereti-subulat. integris, remotis: caul. fruticoso, erecto, ramofo: corymb. composito. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

10. *obvallata*. C. fol. opposit. sub lanceolat. cultratis, approximat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Simil. sequenti, & præcipue fl. Differt caul. brevior, palmari: fol. ma. duplo longioribus, minime basi contractis, confertiss. nec spatio remotis, marginibus (præcipue recentiorum) tenuissime crenulat. minime obliquis, ut in sequenti.

11. *cultrata*. C. fol. oppositis, obtuse ovat. integerr. subcultratis, obliquis: paribus connatis, remotis. *Syst. veg. ed. 13. Dill. elth. tab. 97. f. 114.*

In Æthiopia h.

Caul. ped-cubital. parum ramosi, tortuosi, ni sustententur procumbent. usque ad medium nudi, subfusci. Rami geniculati. Fol. crebra, decussata, crassa, glabra, rigida, utrimq. læte virent. *Anacampser.* similia. Fl. racemosi, parvi, muscosi, albid, odore mellis, qui non explicantur.

12. *Cotyledon*. C. fol. subrotund. carnos, supra punctat. caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Misc. 2. tab. 19.*

Habitat

Tota planta glabra. Truncus carpi crassitie, fuscescens, teres, in ramos inconcinne divisus plurimos, teretes, fusco-virent. Truncus, & rami articulati, articulo superiore obtuso, pyxidato. Fol. opposita, sublesfil. spatulato-ro-

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 221

tun. crassa, integerr. glauca, patentia, alia obtusiss. alia minimo mucrone acuta. Cymæ terminal. in omnibus ferme ramulis, dichotomæ. Pedunc. compressi, glauco-virent. Bract. ad divisionem peduncul. parvæ. Fl. numerosi, odori. Cal. parvus, glaucus, lacin. concavis, apice ferrugineo-rubris. Pet. magna, lanceol. acuta, plana, in principio alba, demum rosea.

13. *pinnata*. C. fol. pinnat. caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

In China 5.

Frutex rufescens, lævis, ramis alternis. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. 7-9: petiolul. cordata, acuta, integerr. lævia. Panicul. axillar. fol. brevior, rubicunda. Fl. rubri.

** *Herbacea*.

14. *centauroides*. C. caul. herbac. brachiato: fol. cordatis, sessil. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ethiopia.

Caul. palm. terebintifol. subpubesc. Fol. sæpius opposita, carnosa, lucida, supra punctis excavata. Fl. corymbosi, purpur. Fol. *latiora* C. *dichotomæ*. Fl. *min.*

15. *dichotoma*. C. caul. herbac. dichotomo: fol. ovat-lanc: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. *Herm. Lugd. tab. 553.*

In Ethiopia ☉.

Caul. vix palm. simplex, rotundus, superne ramifolius, pallide virefc. Fol. opposita, crassiuscul. succulenta. Fl. stellati, purpur. intus crocei, fundo maculis cordiform.

16. *glomerata*. C. caul. herbac. dichotomo, scabro: fol. lanceol. fl. ultimis fasciculat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei ☉.

Caul. erectus, palm. teres, purpurasc. Fol. opposita, sessil. carnosa, acutiusc. patentiss. Fl. e dichotomia solitar. subpeduncul. magnitudine *Polycarpi*. Terminal. ut in *Valeriana locusta*. Petal. alba. *Folia passim basi subciliata. Planta adulta rufescens, exceptis petiolis.*

17. *strigosa*. C. caul. herbac. erecto, dichotomo: fol. obovat. strigosis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Ethiopia ☉.

122 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

Caul. spitham. subhispidus. Fol. opposita, acuta, lineata, integerr: inferior. sæpe petiolata. Petal. ovata.

18. *muscosa*. C. caul. herbac. prostrato: fol. opposit. ovatis, gibbis, imbricatis: fl. sessil. solitar. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia ☉.

Caul. filiform. raro ramosi. Fol. minima, sessil. obtusiusc. carnosæ. Fl. axillar. solitar. præ cæteris speciebus minutiss. longitudine folior.

19. *ciliata*. C. fol. oppositis, ovalibus, pleniusscul. distinctis, ciliatis: corymb. terminal. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 98. f. 116.*

In Æthiopia 24.

Fol. *Sempervivi vulg:* sed min. ciliis albis obsita; radicalia cruciata. Caul. breves, furculis dodrantal. in geminos plerumq. peduncul. divisi. Fl. C. *perfoliatæ* min. luteoli.

20. *punctata*. C. fol. oppositis, ovatis, punctat. ciliatis: inferioribus oblongis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia.

Caul. teres, simpl. lævis. Fol. disticha, sessil. carnosæ, subtus convexa. Corymb. axillar. breviss. fastigiati. Cor. campanul. alba, limbo reflexo. Anth. purpureæ.

21. *subulata*. C. fol. subulat. teretibus, patentibus: caul. herbac. *Syst. veg. ed. 14.*

Spiræa &c. *Pet. gar. tab. 89. f. 3.*

Sedum &c. *Herm. Lugd. tab. 332.*

Ad cap. b. Spei ☉.

Caul. dodrant. 2-fid. testus vaginis folior. truncat. ciliatis. Fol. uncial. alterna, obtusa, carnosæ, cartilagineo-ciliatæ. Spicæ terminal. capitatæ, subsessil. involuc. imbricato. Petal. alba.

22. *alternifolia*. C. fol. serrato-dent. planis, alternis: caul. simpliciss: fl. pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. asf. tab. 24. f. 1.*

In Æthiopia.

Caul. 2-pedal. laxi; purpur. hirsuti. Fol. sessil. ovat-cuspid. Fl. axillar. solitarii, breviter peduncul. Cal. magnus, latus. Cor. flava.

23. *rubens*. C. fol. fusiform. subdepressis: cyma 3-4-fid. foliosa: fl. sessil. staminibus reflexis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 82.*

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 223

Sedum annuum, minimum &c. *Magnol. Monsp.*
cum ic.

In Europa australi, pascuis saxosis ☉.

Caul. digital pilis raris viscosis, sæpe ramosus.

Fol. sparsa, oblong. obtusa, carnosa, cinerea,
apice rubente, patentia; infer. quaterna. Cyma
ramis recurvis. Fl. testil. Cor. alba, subtrun-
linea villosa, rubente. Fruct. purpurasc. stel-
latus, ex filicul. 5, aristatis.

Statura simil. Sedo annuo.

24. *verticilla-*
ris. C. caul. herbac. fol. patentibus: fl. verticillat,
aristat. *Syst. veg. ed. 14.*

Sedum &c. *Magnol. Monsp. tab. 237.*

In Europa australi ☉.

Caul. diffusus, digital. oppositè ramosiss. subin-
carnatus. Fol. conferta, opposita, testil. oblong-
ovat. gibba, minutissime papulosa, apice sca-
bra. Fl. axillar. testil. minutiss. sæpius 5. Cal.
subulat. Petal. 5. calyce breviora, medio ru-
bra. Stam. breviss. apice rubra. Stigm. rubra.

25. *nudicaul-*
is. C. fol. subulat. radicalibus: caul. subnudo. *Syst.*
veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 98. f. 115.

In Æthiopia ☿.

Caul. herbac. dodran--pedal. 4. fol. cinctus. Fol.
multa, cespitosa. Pedunc. terminal. verticilla-
ti, plerumq. 4. Fl. capitati, parvi, muscosi,
herbacei.

26. *orbicula-*
ris. C. sarmentis proliferis, determinate foliosis: fol.
imbricat. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth.*
t. b. 100. f. 118.

In Æthiopia ☿.

Fol. radical. rosulas formantia, ovata, acutiuscul.
gibba, carnosa, lævia, retrorsum ciliata, ciliis
tenuissim. cartilagin. Rad. emittit fila lateralia,
decumbent. propagines apice formantia. Scap.
erect. vix fol. longior. Spica brachiato-verticill.
Fl. parvi. Petal. rubro-albicant. Stigm. purpur.

27. *pellucida.* C. caul. repente, flaccido: fol. oppositis. *Syst.*
veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 100. & 119.

In Æthiopia.

Caulic. palm-ped. teretes, glabri, dilute rubent.
geniculati. Fol. *Portulaca*, crassa, succulenta,
sed acutiora, dilute virid. inferior. arcte sibi
imposita; in florescente planta exarescunt, &
decidunt. Fl. terminal. cymosi, axill. 2-3. al-
bido-purpur.

224 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

38. *columnaris*. C. caul. pollic. fol. imbricat. rotundis : fasciculo subrotun. terminali. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Burm. afric. tab. 9. f. 2.*
Ad cap. b. Spei.
Fol. horizontal. imbricata, carnosæ. Cor. tubulosa, limbo 5-fid. lineari, patente.
39. *barbata*. C. fol. connat. articul. barbatis, imbricatis, hemisphær. caul. subrotun. fl. verticillat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
30. *argentea*. C. fol. connat. ovatis, integris, argenteis : caul. tecto : corymb. supradecompos. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
31. *vestita*. C. fol. connatis, deltoidibus, obtusis : caul. tecto : fl. terminal. capitatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
32. *corallina*. C. fol. connatis, deltoidibus obrutis : caul. tecto : fl. umbellat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
C. *vestita*, & *corallina*, mira structura folior. similes corallinis Zoophytorum.
33. *retroflexa*. C. fol. connat. oblong. remotis, planis : caul. simpl. cyma composita, pedicell. retrofract. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Var. fl. rubro, & luteo.
34. *deltoides*. C. fol. connat. deltoidibus, acutis, patulis : caul. tecto : fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Fig. foliorum ut in *Mesemb. deltoideo*.
35. *cordata*. C. fol. petiolat. cordatis : caul. folioso : fl. terminal. folitar. pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
36. *montana*. C. fol. connat. ovatis, acutis, ciliat. caul. subnudo : fl. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
37. *mollis*. C. fol. connatis, tereti-triquetris, glabris, molli-
libus : caul. erecto, simplici : corymb. trichotomo, suprav. composito. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

38. *crenulata*. C. fol. connat. lanceolat. punctatò-crenulat. caul. folioso : corymb. decomposito . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
39. *alpestris*. C. fol. connat. ovatis , acut. quadrifariam imbricat. capitul. pedunculat. caul. folioso . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
40. *pyramidalis*. C. fol. connat. ovatis , acutis , quadrifariam imbricat. capitul. sessilibus . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Planta pulchra .
41. *spicata*. C. fol. connatis , lineari-subulat. scap. subnudo : spica verticillata ; verticill. inferioribus remotioribus . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
42. *turrita*. C. fol. connat. quadrifariam imbricat. ovat-oblong. acutis , ciliat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
43. *rupestris*. C. fol. connat. ovatis , integris , glabris : corymb. supradecompos. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
44. *thyrsiflora*. C. fol. perfoliat. ovatis , ciliat. patulis : corymb. composito , attenuato . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
45. *capitella*. C. fol. connat. oblongis , cartilagineo-ciliat. patulis : capitulis verticillat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
46. *pubescens*. C. fol. connat. ovatis , acutis , villosis : caul. ramoso : fl. corymbosus . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
47. *cephalophora*. C. fol. connat. lineari-oblong. obtusis , integris : capitul. lateralibus , pedunculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
48. *tomentosa*. C. villoso—scabra : fol. connatis , lanceolat. villosis , ciliatis : caul. subnudo , terminato spica verticillata . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
49. *Cotyledonis*. C. fol. connat. oblong. tomentosis , ciliatis : caul. subnudo : fl. corymbosus , adgregatis . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

226 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

Ad cap. b. Spei.

Diffinēda a C. Cotyledone Jacq. supra relata.

30. *teſſa*. C. fol. connatis, ovatis, obtusis, cinereo-lamel-
lolis: ſcapo nudo: capitul. terminali. *Syſt.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

31. *perforata*. C. fol. oppoſito-p. rfoliat. ovatis: caul. ſimplic. ſl.
pedunculato—ſubverticillat. *Syſt. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Caul. ſesquiped. nudiuscul. teretes, rubicundi.
Fol. quandoq. cordata, acutiusc. margine æ-
quali, lævia; radic. l. adproximata, ſuperne
ſenſim min. Racemus terminal. longus. Fl.
gomerati, parvi.

*Inſcius, Crasſulæ numeroſæ novæ, in Suppl. re-
latae utrum ad fruteſcent. aut herbaceas refe-
rendæ ſint, p. uictis exceptis, omnes, & ſingulas
iundim huc colloco*

alba.

C. fol. oppoſitis, vaginantibus, lanceol. *Syſt. veg.*
ed. 14. Forſk. Æg.

In Arabia.

Caul. ſpitham. ſimpl. Fol. conferta, ſesquipollic.
plana, virid. margine cartilagineo ciliata, pa-
pillis hyalinis, filiform. adproximat. unius ſe-
rici, ſere perpendicular. ad ſilium. Pedunc.
terminal. ruſceſcent. ſquamofi, dichot. articulat.
bracteis 2. lineari-lanceolat. ſub quavis dichot-
toma. Fl. corymboſi, pedicell. Cor. alba.

perſilata.

C. fol. ſubrotund. in medio a caule perſilatis, ad-
proximatis, rubro-punctul. *Scop. Delic. Inſub.*
ſuſc. 3. tab. 6.

Habitat 24.

Caul. fruticofus, tenuis, baſi nudus, mox ſupra
radicem parce ramofus. Fol. carnoſi, ſupra
plana, ſubtus convexa, patentia, ſolitaria,
ſibi vicina, ut diſtancia unius ab alio vix li-
neam geometricam ſuperet; a tenui caule,
tamquam a filo acus ope traiecta videantur.
Racemus terminal. denſus, 2—unc. ramis pri-
mis oppoſitis, ex vagina parva prodeuntibus:
quorum ramificatio dichotoma. Ramuli ſqua-
moſi. Floſculus inter binos quoſque ramulos.
Fl. alterni, ſeſſiles. Cal. ſemi 5-ſid. Cor. late

PENTANDRIA PENTAGYNIA. 227

campanul. luteola, in senio rufo--rubra. *An C. perforata. Lin. Suppl. ? sed caul. non simplic. nec fl. glomerati.*

473. MA-
HERNIA. Cal. 5--dentat. Petal. 5. Nectar. 5. obcordata, filamentis supposita. Caps. 5--locul.

1. verticillata. M. fol. verticillat. linear. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, diffusus, ramis filiform. Fol. sæpe 8--10. vix divisa, aut pinnatifid. *Modus fructificandi Hermannia, terminalis, peduncul. sæpe 2-fl. Petal. lutea.*

2. pinnata. M. fol. tripartito-pinnatifid. *Syst. veg. ed. 14.*

Ketmia &c. Comm. rar. tab. 7.

Cistoides &c. Pluk. mant. tab. 344. f. 3.

In Æthiopia h.

Caul. procumb. fruticosus, glaber, fusco--spadic.

Fol. linear. angusta, acuta, integerr. & 3-fid.

mixta, verticillata 6--8-unguicular. sessil. patent.

glabra. Peduncul. lateral. & terminal. 2--fl.

Bract. subulata. Fl. penduli, sulphurei. *An eadem cum priore? Hermannia adfinis, sed ne-*

caria diversum genus exposcunt.

474. SIBBAL-
DIA. Cal. 10-fidus. Petal. 5. calyci inserta. Styli e latere germin. Sem. 5.

1. procumbens. S. procumb. foliol. 3-dent. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 32.*

Fragaria &c. Sibb. Scot. 2. tab. 6. f. 1.

Pentaphylloides &c. Pluk. alm. tab. 212. f. 3.

In alpihus Lapponia, Scotia, Sibiria, Helvetia &c. 24.

Caulicul. pl. humil. 3-unc. 1-3-fl. vaginofi. Fol.

radicalia, iuniora sericea, adulta calva, ter-

nata, apice retuso, & tridentato. Cal. glaber,

lanceolat. connivens, venosus. Petal. acumin.

calyce non maiora, flava. *Habitus Potentilla.*

2. erecta. S. erecta; foliol. linear. (plerumq.) multifid. *Syst. veg. ed. 14.*

Pentaphylloides &c. Amm. ruth. tab. 15.

In Sibiria.

Fol. quandoq. 3-fid. Flos purpurascens, vel al-

bis. *Var. fl. ampliore.*

3. altaica. S. fol. tricuspidat. fl. solitariis. *Syst. veg. ed. 14.*

Lin. Suppl. Ad. Petrop. an. 1773. tab. 18. f. 2.

In alpihus Altaicis.

Fol. linear. Cal. cylindr. Cor. purpur.

POLYGYNIA.

475. MYO-
SURUS. Cal. 5-phyll. basi adnatus. Nectar. 5. subu-
lata, petaliform. Sem. numerosa.
1. *minimus*. M. fol. gramineis, integerrim. *Syst. veg. ed.* 14.
Gmel. it. 2. tab. 31. Fl. Dan. tab. 406.
Caulis muris. Dod. pempt. Lob. ic. 40.
In Europæ collibus apricis, aridis ☉.
Caul. 3-unc. nudus, simpl. fragilis. Fol. subcre-
nate inflexa, plana, tenera, glabra, læte vi-
rent. Capitul. spicatum, viridi-subfuscum. Cor.
flavo-virefcens.
-

NOVA GENERA..

MONOGYNIA.

LICANIA.

- Cal. Periant. 2-phyll. minimum.
Cor. 1-petal. turbinata, limbo patente, 5-dent.
denticul. acutis.
Stam. Filam. 5. fauci cor. inserta. Anth. 2-locul.
Pistil. Germ. subrotund. villosum. Styl. longus,
setaceus, incurvus. Stigm. obrusum.
Perc. Drupa mollis, carnosæ, ovata, fibrosa,
glabra, 1-locul.
Sem. Nux 1-sperm. lignosa, coriacea, fibrillis
cooperta.
incana. L. *Aubl. Guian. tab. 45.*
In Caribæis b.
Arb. 4-5-ped. superne ramosa. Fol. alterna,
subsessil. ovata, acumin. integerr. supra virid.
subtus incana, stipulata. Spicæ axill. & ter-
minal. Cor. alba. Drupa candida, cum punctis
rubris, edulis.

RAPANEA.

Cal. Perian. 1-phyll. minimum, 5-6-dentat.
Cor. 1-petal. tubo breviss. receptaculo pistilli inferro; limbo 5-fid. lacin. subrotund.
Stam. Filam. 5-6. tubo ad basin lingulæ lacinia inferta. Anth. oblong. 4-gon. 2-locul.
Pistil. Ger.u. subrotund. Styl. breviss. Stigm. obtusum.

Peric. Bacca sphaerica, 1-locul.

Sem. 1. sphaericum.

Guianensis. *R. Aubl. Guian. tab. 46.*

In Calenna, & Guiana h.

Frutex 5-ped. superne ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata, crassa, integerr. glabris. Fl. fasciculati, subsessil. sparsi supra corticem ramorum, & ramusculor. Cor. alba. Bacca violac.

PORAQUEIBA.

Cal. Perian. 1-phyll. minimum, 5-dent.
Cor. 1-petal. 5-part. lacin. oblong. ovat. acutis, supra concavis, subtus convexis.
Stam. Filam. 5. crassa, subtus convexa, intus concava, utrimq. marginata.
Anth. quasi articulatae, oblong. 4-gonae, 2-locul. & sic coalitae rotam molendinam referunt.

Pistil. Germ. subrot. Styl. brevis. Stigm. 3. ovata.

Peric.

Sem.

1. *Guianensis.* *P. Aubl. Guian. tab. 47.*

In Guiana h.

Arb. 50-ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, glabra. Fl. axillar. spicati, minimi, albi.

TAPURA.

Cal. Periant. 1-phyll. 6-part. lacin. ovat. concavis.

Cor. 1-petal. 2-labiat. lab. super. oblon. erecto, concavo, apice 3-dent. lab. infer. 2-part. lobis brevibus, obtusis; receptac. pistilli inserta.

Stam. Filam. 5. duo ad latera lab. superior. 2. breviora tubo cor. sub lab. superior. quantum longiss. ad basin lab. inferioris.

Pistil. Germ. ovatum, 3-gonum. Styl. longus, incurvus, hirsutus. Stigm. 3-lobum.

Peric.

Sem.

1. *Guianensis.* T. Aubl. Guian. tab. 48.

In Guiana.

Frutex 12-ped. ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata, acumine obtuso, glabra. Stipul. breves, deciduæ. Fl. congesti ad basin folior. supra petiolum, sessil. parvi. Cor. flava.

BACOPA.

Cal. Perian. 2-phyll. 5-part. lacin. 2. oppositis, oblong. acutis, concavis; 2-inferior. reflexis, subrotun. acutis; unica super. latiore, subrotun. undulata.

Cor. 1-pet. tubus brevis, ad faucem ampliatus, calyc. parieti interno insertus: limb. 5-fid. lacin. oblong. ovat.

Stam. Filam. 5. ad faucem tubi intra divisuras cor. inserta. Anth. longæ, cuspidatæ, 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, basi calyc. fundo adnatum. Styl. brevis. Stigm. capitat. convexum.

Peric. Caps. membranc. 1-locul.

Sem. numerosa, minutiss.

1. *aquatica.* B. Aubl. Guian. tab. 49.

In Caienna.

Caul. pl. cylindrac. nodosus, succulentus: e nodis exeunt radiculæ capillar. Fol. opposita, sessil. amplexicaul., oblong. acuta, concava, crassa, glabra, virid. Fl. alterne axillar. solitar. peduncul. Intra cal. bract. 2. carnosæ. Cor. violac.

P O S O Q U E R I A .

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. Tubus longiss. disco supra germen insertus, paulo supra basin incurvus; reliqua sua parte pendulus: faux ventricosa, villosa: limb. 5-fid. lacin. oblong. angustis, obtus. reflexis.

Stam. Filam. 5. brevia, lata, apice incurvo, intra divifuras cor. inserta.

Anth. oblon. utrimq. acutæ, incurvæ, 2-locul. basi filament. adnexæ.

Pistil. Germ. calyc. fundo adnatum, disco coronatum.

Peric. Bacca ovata, carnosæ, calyc. coronata, 1-locul.

Sem. Plurima, subrotun. angulosa, in pulpa rubra dulci nidulantiæ.

1. *longiflora*. P. Aubl. *Guian. tab. 51.*

In Caribæis ß.

Frutex 5-6-ped. ramosus. Rami oppositi, nodosi, tomentosi. Fol. opposita, petiol. ovat. oblonga, acuta, integerr. glabra. Stipul. ad basin petioli. Fl. terminal. corymbosi, peduncul. Cor. alba. Bacca lutea.

M O U R O U C O A .

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-part. lacin. subrotun.

Cor. 1-petal. infundibulif. tubus oblong. disco germinis insertus: limbus patens, 5-fid. lacin. amplis, subrotun.

Stam. Filam. 5. fauci tubi inserta, lobis opposit.

Anth. oblon. obtus. incumbent.

Pistil. Germ. conicum, disco cinctum. Styl. longus. Stigm. bilamellat.

Peric. Capl. ovat-oblon. fibrosa, coriacea, calyce ad basin tecta, 2-3. locul.

Sem. unicum, oblong. rufescens, extus convexum, intus planum, in quolibet loculo.

1. *violacea*. M. Aubl. *Guian. tab. 54.*

In Caribæis ß.

Frutex sarmentis longiss. supra altissim. arbores expansis, & propendentibus. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, semiplicata, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. corymbosi, longe peduncul. ampli. Cal. violac. Cor. cœrul. Caps. striata, rufesc.

SIPANE A.

Cal. Periant. 1²-phyll. turbinat. striatum, ad apicem contractum; limbo 5-part. lacin. angustis, acutis.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus long. disco supra germen insertus: faux ventricosa: limbus 5-fid. expansus, subrotund.

Stam. Filam. 5-brevia, tubo inserta.

Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. calyci adnatum, disco coronatum. Styl. longus, filiform. Stig. 2.

Peric. Caps. orbiculata, striata, infera, 2-partibil. lacin. calycin. coronata, singulo loculo 2-valv. valvul. dissepimento oppositis.

Sem. plurima, minutiss.

pratenfis.

S. Aubl. Guian. tab. 56.

In Caienna, & Guiana 24.

Caul. pl. 1-2-ped. ramosi, nodosi, partim erecti, partim supini, radicales. Fol. opposita, subsessil. lanceol. acuta, integerr. asperiuscula. Stipul. ad basin petiolor. ovatae, acutae. Fl. terminal. corymbosi, 5-6-7. Cor. carnea.

RONABEA.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dentat.

Cor. 1-petal. tubus longus, ad faucem ventricosus, disco supra germen insertus: limbus 5-fid. lacin. acutis, patulis.

Stam. Filam. 5. brevia, tubo inserta. *Anth.* oblong. 2-locul. intra faucem reconditæ.

Pistil. Germ. ovat. calyci adnatum disco coronatum. Stylus longitudine tubi. Stigm. 2-lamellatum.

Peric. Bacca ovata, striata, umbilicata, 1-locul.

Sem. Officula oblong. striata, hinc convexa, inde plana, 1-sperm.

PENTANDRIA MONOGYNIA: 233

latifolia. R. caulibus flexuosis: fol. ovatis, acutis, e viridi, & cœruleo variegatis: fruct. striato, nigricante. *Aubl. Guian. tab. 59.*

In Guiana h.

Frutex. Caul. pl. 2-3-ped. simpl. tortuosi, nodosi. Fol. opposita, breviter petiol. integerr. Stipul. utrimq. intra basin petioli, lata, acuta. Fl. 2-3-4-5-6. axill. subsessil. Cor. alba.

creda. R. caulibus tenuioribus: fol. ovat. acutis, tenuioribus: fl. min. e luteo-virentibus. *Aubl. Guian.*

In Guiana.

T A P O G O M E A.

Cal. comm. Vagina biloba, lobis retroflexis; 5. squamis violac. latis, subrotund. concavis; una quinta interiore, & acutiore.

Cal. proprius. Perian. 1-phyll. 5-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. tubus oblong. fauce ventricosus; disco biglanduloso, supra germen insertus: limbus patens, 5-fid. lacin. subrotund.

Stam. Filam. 5. breviss. tubo ad basin inserta.

Anth. oblong. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. minimum, angulatum, inferum; calyci adnatum, disco biglanduloso coronatum.

Styl. longitudine tubi cor. ad apicem 2-part.

Stigm. 2. obtusa.

Peric. Bacca angulosa, 1-locul.

Sem. Officula 2. hinc plana, inde convexa.

Recept. comm. fl. paleaceum, planum, paleis numerosis, angustis, violac. persistent. Fl. in capitulum collecti.

violacea. T. capitulo fl. globoso, squamoso: fl. & fructu violac. *Aubl. Guian. tab. 60.*

In Sylvis Guianæ 24.

Caul. 1-2-ped. ramis oppositis, nodosis. Petioli vagina breviss. amplexicaul. Fol. opposita, ovat-oblong. acuta, nervis purpurascens. integerr. glabra, & reflexa.

samentosa. T. fl. capitatis, involuc. amplo, purpureo-violac. obvolutis. *Aubl. Guian. tab. 61.*

In Caribæis h.

- Fruticul. 3-4-ped. erectus, ramosus, nodosus, tomentosus. Fol. ampla, longe petiol. ovata, acuta, integerr. villosa. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ, villosæ, lobis 2-fid. Fl. terminal. corymbosi. Involuc. 1-phyllum, patens, concavum, villosum. Reliqua ut in priore.
- purpurea.* T. caulibus repentibus: fol. lanceolat. linea alba supra notatis, subtus hirsutæ rufescent. *Aubl. Guian. tab. 63. f. 3.*
In Guiana 24.
 Caul. decumbent. villosi. Fol. opposita, subsessil. ovata, acuta, supra glabra, virent. venis rubris. Stipul. utrimq. ad basin petiolor. Fl. terminal. capitati. Cal. villosus. Cor. & bacca purpurasc.
- alba.* T. caulibus decumbentibus: fol. ovatis, supra partim virid. partim rufescent. subtus cinereis. *Aubl. Guian. tab. 62. f. 4.*
In Guiana 24.
Differt a priore fol. petiolat. subrotund. glabris &c. fl. purpur. aut albis: fructu rubro.
- glabra.* T. fol. ovat. acutis, glabris: capitulo fl. hirsuto. *Aubl. Guian. tab. 63.*
In Guiana 24.
 Fruticul. erectus, ramosus, glaber, ramul. villosi, rufescent. Fol. opposita, petiol. integerr. subtus pallide virent. Stipul. amplexicaul. oblonga, biloba, lobis 2-fid. Capitul. terminal. longe peduncul. Fl. cœrulescent. Bacca oblong. ovata, striata, cœrul. Receptacul. paleaceum.

CARAPICHEA.

- Cal.* Perian. minimum, 1-phyll. turbinat. 5-dentat.
- Cor.* 1-petal. infundibulif. tubus oblong. disco supra germen insertus: limbus 5-fid. lacin. brevibus, acutis.
- Stam.* Filam. 5. longa, extra cor. prodeuntia, fauci tubi infra lacin. inserta. Anth. subrotund. 2-locul.
- Pistil.* Germ. inferum, minimum, calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. longiss. 2-part. Stigm. 2. acuta.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 235

Peric. Caps. angulosa, 2-partibil. 2. locul. singulo locul. 1-ferm.

Sem. 2. oblonga.

Capitulum terminale, involucat, pedunculat. *Involuc.* 4-phyll. foliol. 2. inferior, latus oppositis, concavis: 2. super. opposit. acutis.

Guianensis. *C. Aubl. Guian. tab. 64.*

In Caribæis h.

Frutex 5-6-ped. ramulis nodosis. *Fol.* opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. *Stipul.* 2. utrimq. ad basin petiol. *Cor.* alba.

S I M I R A.

Cal. *Perian.* 1-phyll. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. tubulosa, disco supra ovarium inserta: limbus 5 fid. lacin. subrotun.

Stam. *Filam.* 5. tubo cor. inserta. *Anth.* 2-locul.

Pistil. *Germ.* ovatum, calyc. denticulat. disco coronatum. *Stylus* longus, tenuis, apice 2-part. *Stigm.* obtusa.

Peric. *Bacca* ovata, cal. denticulat. coronata, 2-locul.

Sem. solitaria.

tindoria. *S. Aubl. Guian. tab. 65.*

In Guiana h.

Arb. 10-12-ped. superne ramosa, cortice extus rufescente, intus rubente. *Fol.* ampla, opposita, subsessil. ovata, acuta, integerr. glabra, subtus pallide virent. nervis transversal. purpurascant. *Stipul.* 2. oppositæ, longæ, acutæ. *Fl.* terminal. racemosi. *Cor.* alba.

O U R O U P A R I A.

Cal. *Perian.* 1-phyll. tubulosum, 5-dent. basi subrotun. crassiuscul.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus longus, angustus, disco supra germen insertus: limbus 5-fid. lacin. subrotund. extus villosis.

Stam. *Filam.* 5. breviss. ad faucem tubi inserta. *Anth.* oblon. 2-locul. in tubi orificio.

Pistil. Germ. disco coronatum, subrotun. calyc. fundo adnatum. Stylus tenuis, longissim. Stigm. capitatum, oblong. bifidum.

Peric. . . . 2-locul.

Sem. plurima.

Guianensis. O. Aubl. *Guian.* tab. 68.

In Guiana h.

Frutex sarmentosus, supra arbores scandens.

Fol. opposita, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. utrimq. ad basin petioli triangularis. Supra folia aculei 2. incurvi. Capitul. sphaeric. axillar. & terminalia. Cor. varii col. albi, viridis, rubri, lutei, nigricantis, odora.

B E R T I E R A.

Cal. Periant. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. tubus brevis, disco supra germen insertus; limb. 5-fid. lacin. æqualibus, oblong. acutis.

Stam. Filam. 5. breviss. tubo ad faucem inserta.

Anth. oblong. 2-locul.

Pistil. Germ. inferum, subrotun. calyc. fundo adnatum, disco coronatum. Styl. longitudine tubi. Stigm. bilamellatum.

Peric. Bacca orbiculata, calyc. denticul. coronata, 2-locul.

Sem. plurima, subrotun. septo medio utrimq. adfixa.

Guianensis. B. Aubl. *Guian.* tab. 69.

In Guiana h.

Frutex 6-7-ped. ramis, & ramuscul. tomentosis. Fol. opposita, breviter petiol. adnata, ovata, acumin. supra virid. subtus tomentoso-ciner. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ Fl. terminal. racemosi. Cor. alba.

N O N A T E L I A.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent. denticul. acutis.

Cor. 1-petal. tubulosa, disco supra germen inserta; limbo 6-fid.

Stam. Filam. 5. tubo inserta. *Anth.* oblon. 2-locul.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 237

- Pistil.* Germ. inferum, calyc. fundo adnatum, dilco coronatum. Styl. longus, 2-part. Stigm. 2. obusa.
- Peric.* Bacca sphaerica, 5-locul.
- Sem.* Officula 5. angulata.
- officinalis.* N. fol. ovatis, acutis; calyc. involucro 3-phyll. *Aubl. Guian. tab. 70. f. 1.*
In Caienna 24.
- paniculata.* N. fol. ovatis, acutis: fl. calycibus nudis. *Aubl. Guian. tab. 70. f. 2.*
In Caienna 24.
- longiflora.* N. fol. lanceol. glabris: cor. tubulosa: fructu rufescente. *Aubl. Guian. tab. 71.*
In Guiana 24.
- racemosa.* N. fol. ovatis, acutis, petiolat. involuc. calyc. 4-phyll. *Aubl. Guian. tab. 72.*
In Guiana h.
- violacea.* N. fol. amplis, ovatis, acutis; calyc. involuc. 4-phyll. fructu violac. *Aubl. Guian. tab. 75.*
In Guiana h.
- lutea.* N. fol. ovatis, acutis; tubo fl. praelongo. *Aubl. Guian. tab. 74.*
In Guiana h.
- Frutex ped. & ultra, superne ramosus. Fol. pe-

tiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. amplexicaul. 2-lobæ. Fl. terminal. racemosi. Cor. lutea.

SABICEA.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. villosum, apice contracto: limb. 5-fid. lacin. oblon. acutis.

Cor. 1-petal. hypocraterifor. tubus longus, tenuis, disco supra germen infertus: limb. 5-fid. lacin. oblong. acutis.

Stam. Filam. 5. brevia, tubo cor. inserta ad apicem.

Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. inferum, calyci adnatum. Styl. longus, filiform. Stigm. 5. oblong.

Peric. Bacca orbiculata, villosa, calyc. laciniis coronata.

Sem. plurima, minutiss. coronata.

cinerea.

S. caul. volubil. fol. ovat. acutis, subtus albidis: tubo fl. prælongo. *Aubl. Guian. tab. 75.*

In Guiana, & Caienna h.

Frutex. Caul. ramosi, villosi. Fol. opposita, petiol. integerr. supra virid. villosa, subtus tomentoso-incana. Stipul. utrimq. ad basin petiol. subrotun. Fl. axillar. 4-5. & ultra, subsessiles. Quilibet flos intra 2. fol. alba. Cor. alba, extus villosa. Bacca rubra.

aspera.

S. caul. volubil. fol. ovat. acutis, subtus villosis, asperis. *Aubl. Guian. tab. 76.*

In Guiana h.

Differt a priore caulibus asperis, villosis: fol. lanceol. acutis, supra punctatis, virid. cor. 4-5-fid.

PATIMA.

Cal. Perian. 1-phyll. limbo integro, sub 5-sinuato.

Cor.

Stam.

Pistil. Germ. inferum, calyc. fundo adnatum.

Styl. Stigm.

Peric. Bacca subrotun. calyc. margine coronata, 4-5-6-locul.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 239

Sem. plurima, minutiss. in pulpa molli nidulantia.

Guianensis. P. Aubl. *Guian.* tab. 77.

In Caribæis U.

Caul. pl. 3-ped. recti, simpl. tubulosi. *Fol.* opposita, longe petiol. ovat-oblong. acuta, integerr. glabra. *Stipul.* brevis ad basin petioli. *Fructus* pl. axillar. peduncul. virides.

ROPOUREA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotund. rufescentibus: extus glabrum, intus villosum.

Cor. 1-petal. 5-fid. lacin. subrotund. tubus brevissim. receptaculo pistilli insertus.

Stam. 5. villosa, cor. inserta intra divisuras.

Anth. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. villosum *Styl.* longus. *Stigm.* 3-4.

Peric. Bacca 4-locul. villosa.

Sem. plurima, in pulpa lutea, dulci, eduli nidulantia.

Guianensis. R. Aubl. *Guian.* tab. 78.

In Caribæis h.

Frutex 12-15-ped. *Fol.* ad nodos verticillata, plurima, impari-pinn. declinata: foliol. 6. ampla, alterna, ovat-oblong. acumine obtuso, subsessil. integerr. glabra. *Aculeus* brevis, paulo supra axillam singuli folioli. *Fl.* cespitosi, numerosi, sessil. supra, & intra basin folior. *Bacca* lutea.

VOYRIA.

Cal. Perian. 1-phyll. turbinat. 5-dent.

Cor. 1-petal. hypocraterifor. tubus longus, basi, & apice ventricosus, disco pistilli insertus: limbus patens, 5-fid.

Stam. Filam. 5. breviss. faucibus tubi inserta.

Anth. oblong. sulcatæ, 2-locul.

Pistil. Germ. conicum. *Styl.* longitudine tubi cor. *Stigm.* capitat. obtusum, concavum.

Peric. Caps. oblong. 1-locul. 2-valv. *Sem.* numerosa, minutissima.

- rosea*. V. fl. geminatis, lacin. cor. acutis. *Aubl. Guian. tab. 83. f. 1.*
In Guiana 24.
 Radix tuberosa. Caul. simpl. in terra delitescens, 4-gon. nodosus. Squamul. amplexicaul. acutæ. Pedunc. 2-3-4-5-raro 1-fl. Cor. incarnata.
- cærulea*. V. fl. geminatis; lacin. cor. rotundat. *Aubl. Guian. tab. 83. f. 2.*
In Guiana 24.

BASSOVIA.

- Cal.* Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. subrotund. acutis.
Cor. 1-petal. tubus breviss. disco germinis insertus: limbus 5-fid. patens, lacin. ovat. acutis.
Stam. Filam. 5. tubo cor. inserta.
Anth. crassæ, 2-locul.
Pistil. Germ. subrotund. disco insidens. Styl. brevis. Stigm. crassiuscul. obtusum.
Peric. Bacca ovata.
Sem. plurima, minuta, in pulpa nidulantia.
- sylvatica*. *B. Aubl. Guian. tab. 85.*
In Guiana.
 Caul. 3-4-ped. Rami pl. erecti, brachiati, ramosi, radicales. Fol. ampla, alterna, petiol. ovat-acuta, integerr. glabra. Fl. axill. corymbosi, exigui, subvirid. Bacca viridis.

MARIPA.

- Cal.* Periant. 1-phyll. profunde 5-part. lacin. subrotund. concavis, mutuo incumbentibus.
Cor. 1-petal. tubulosa: tubus longus, basi ampliatus, receptaculo germinis insertus: faux patens, ventricosa: limbus 5-fid. lacin. patulis, subrotund. crenatis.
Stam. Filam. 5. brevia, tubo inserta.
Anth. longæ, 2-locul.
Pistil. Germ. ovatum. Styl. longus. Stigm. pelatatum.
Peric. . . . 2-locul.
Sem. 2. angulata, in quolibet locul.
- scandens*. *M. Aubl. Guian. tab. 91.*
In Caribæis b.

Frutex

PENTANDRIA MONOGYNIA: 241

Frutex farmentis longiss. supra arbores scandentibus; ramulis propendentibus. Capreolus spiritaliter intortus, lignosus. Fol. alterna, petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. terminal. panicul. Cal. cinereus. Cor. alba.

R I N O V E A,

Cal. Perian. 1-phyll. villosum, 5-part. lacin. oblongis, acut.

Cor. Petal. 10. concava, ovato-oblonga; 5. infer. ma. 5. super. interiora min.

Stam. Filam. 5. brevia, petal. superioribus ad basin inserta.

Anth. oblong. 2-locul. 2-valvæ, valvul. b. si ad apicem dehiscentibus.

Pistil. Germ. subrotund. villosum. Styl. oblong. villosus. Stigm. obtusum.

Peric.

Sem.

Guianensis. R. Aubl. Guian. tab. 93.

In Guiana h.

Arb. 6-7-ped. superne ramosa, ramul. alternis, Fol. alterna, petiol. erecto-oblong. acuta, dentata, glabra, stipulata. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Cor. alba.

R I A N A.

Cal. Periant. 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotund. 2-cutis.

Cor. Petal. 10. ovata, acuta, receptac. pistilli inserta; 5. infer. 5. super. min. intermedia.

Stam. Filam. 5. breviss. basi petalorum inferior. inserta.

Anth. ovato-oblong. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, 5-striatum, villosum. Styl. carnosus. Stigma capitatum, obtusum.

Peric.

Sem.

Guianensis. R. Aubl. Guian. tab. 94.

In Guiana h.

Frutex 10-ped. Rami erecti, nodosi. Fol. oppo-

Tem. II.

Q

fitra, petiol. ovat-obl. acuta, denticul. rigida, glabra. Stipul. 2. breves, oppositæ. Fl. alterni, in spica terminali. Cor. alba.

CONOCHORIA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. oblong. acutis.
Cor. Petal. 5. erecta, ovat-oblong. lateribus mutuo sibi incumbentia, tubumq. referentia, apice 5-lacinata, lacin. acutis, reflexis. Ad basin singuli perali foliol. concavum.

Stam. Filam. 5. breviss. ad basin petalor. inserta.
Anth. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. Styl. flexuosus, tenuis.
 Stigm. capitat.

Peric.

Sem.

Flavescens.

C. Aubl. Guian. tab. 95.

In Caribæis h.

Frutex 3-4-ped. superne ramosus, ramis undiq. sparsis, nodosis. Fl. opposita, breviter petiol. ovata, acuta, integerr. glabra. Fl. terminal. spicati, alteroi. Cor. flavescens.

TOUROUBEA.

Cal. Perian. 5-6-phyll. foliol. subrotun. carnosus.
 Bract. carnosæ, 3-lobæ.

Cor. Petal. 5. subrotun. carnosa, reflexa, receptacul. pistilli inserta.

Stam. Filam. 5. basi lata, singula singulis petal. incumben. receptaculo inserta.

Anth. subrotun. minim. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, 5-striarum. Styl. brevis.

Stigm. crassiuscul. planum, 5-radiat. radiis acutis.

Peric. 5-locul.

Sem.

Guianensis.

T. Aubl. Guian. tab. 97.

In Guiana h.

Arbuseul. ramis sarmentosis. Fol. alterna, petiol. ovata, emarginata, apice acuto, crassa, integerr. glabra. Fl. spicati, remoti, alterni, peduncul. Bract. coccinea. Cal. luteus, Petal. sulphur. Filam. lutea. Anth. nigra.

PAYPAYROLA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. subrotun. acutis.

Cor. Petal. 5. oblong. angusta, erecta, tubum mentientia, apicibus reflexis, uno mai: emarginato; disco infra germen inserta.

Stam. Filam. 5. erecta, disco inserta.

Anth. oblong. coalitæ, 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. disco insidens. Styl. longus. Stigm. 2-lob.

Peric. 2-locul.

Sem.

Guianensis. *P. Aubl. Guian. tab. 99.*

In Caribæis h.

Frutex 12-15-ped. ramosus. Fol. ampla, alterna, petiolat. ovat. acuta, integerr. glabra, stipulata. Fl. axillar. & terminal. spicati. Cor. flava.

A M A N O A.

Cal. Perian. minimum, 1-phyll. 5-part. lacin. ovat. subrotund. concavis.

Cor. nulla.

Stam. Filam. 5. breviss. receptaculo germinis inserta.

Anth. crassæ, 2-locul.

Pistil. Germ. triangulare. Stigm. 3-gon. concavum, fimbriatum.

Peric.

Sem.

Guianensis. *A. Aubl. Guian. tab. 101.*

In Guiana h.

Arb. 60-ped. superne ramosiss. Fol. breviter petiol. ovat-acuta, integerr. glabra. Stipul. 2. exiguae, lanceol. Fl. in axilla squamul. in spicam flexuosam, axillar. & terminalem alterne dispositi, congesti, minimi, sessil. virescent.

A M B E L A N I A.

Cal. Perian. breviss. 1-phyll. 5-part. carnosum, lacin. acutis.

Cor. 1-pet. tubus cylindrac. basi amplius, re-

Q ij

ceptacul. germinis insidens: limbus 5-fid. patens, lacin. inæqualibus, subrotund. undulatis, acutis.

Siam. Filam. 5. breviss. versus fundum tubi inserta.

Anth. sagittatæ, 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. Stylus oblong. 4-gonus.

Stigma crassum, capitato-ovat. striatum, orbiculo plano insidens, ad apicem bicuspidatum.

Peric. Bacca ovat-oblong. acuta, rugosa, glabra, 2-locul.

Sem. tubrotunda, compressa, aspera, dissepimento adfixa.

acida.

A. Aubert. Guian. tab. 104.

In Caienna, & Guiana h.

Arb. 8-ped. superne ramosa, ramis rectis, oblong.

Fol. opposita, breviter petiol. petiolis semiamplexicaul. ovat-oblong. undulata, integerr.

glabra. Fl. axillar. corymbosi. Corymb. subsessil. 3-4-fl. Cor. subalbida. Bacca flava, in

aqua macerata edulis. Sem. ferruginea.

PACOURIA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. subrotund. acutis, carnosis.

Cor. 1-petal. tubus brevis, receptacul. pistilli insertus: limbus 5-fid. lacin. subrotund. undulatis, mutuo sibi incumbentes.

Siam. Filam. 5. breviss. tubi versus basin inserta.

Anth. cuscitate.

Pistil. Germ. subrotund. Styl. brevis, 4-gonus.

Stigma crassum; capitato-rotund. striatum, orbiculo plano insidens, ad apicem bicuspidatum.

Peric. Bacca ampla, carnosae, crassae, pyriform. 1-locul.

Sem. plurima, crassa, durissima, in pulpa nidulantia.

Guianensis.

P. Aubl. Guian. tab. 105.

In Caribæis h.

Frutex. Rami oblongi, farmentosi, volubil. nodosi. Fol. opposita, breviter petiol. petiolis subamplexicaul. ovat-acuta, undulata, integerr. glabra. Fl. axillar. racemis volubil. Cor. flava. Bacca, & pulpa flava. Succus plantæ viscosus.

GERUMA.

- alba*. Cal. 1-phyll. Cor. 5-petal. Pericarp. 4-locul.
2-spermum.
G. Forsk. Æg.
In Arabia.
Fol. alterna, ovali-oblong. subserrata. Petal.
alba.

ARNEBIA.

- indurica*. Cal. Perian. 5-part. erectum, lineare, acutum,
persistens.
Cor. 1-petal. tubus cylindric. limbus 5-fid. pa-
tens, obtusus, fauce aperta.
Stam. Filam. 5. Anth. 3. longiores in fauce cor.
2. breviores.
Pistil. Germ. 4. Stylus filiform. longitudine tubi.
Stigm. 4-fid.
Peric. nullum. Cal. erectus, fovens sem.
Sem. 4. extrorsum plana, verticalia triangular.
introrsum convexa, tota glabra.
Hac nota, & stigmati radiis differt a Litospermo,
cui similis.
A. fol. lineari-lanceol. hirsutis: caul. erecto.
Forsk. Æg.
In Arabia.
Radix extus rubra, cutem tingens. Caul. semi-
spitham. basi ramosus, hirsuto-hispidus, teres,
rufescens. Fol. infer. ma. pollicar. sessilia,
caulin. minus hirsuta. Spicæ terminal. secun-
dæ: bractæ filiform. Cal. villosus. Cor. ca-
lyce longior, obscure violac.

CATHA.

- Cal. Perian. 1-phyll. 5-dent. crateriforme, mar-
gine villosa, fuscum, obtusum, cor. duplo
brevius.
Cor. 5-petal. infera, erecto-patens ovalis obtu-
sa. Nectar. cyathiform. inter stam. & germen,
breve, anulatum, viride, a germine diver-
gens, margine undulato.
Stam. 5. erecta, cor. breviora.

Pistil. Germ. globosum. Styl. brevis. Stigma acutum.

Peric. Capf. oblong-cilindric. 3-locul.

Sem. 3. in quolibet loculo.

. . . . *C. Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Arbor. ramis axillar. alternis, ramulos. Fol. 2-pollic. breviter petiol. opposita, in ramis magnis alterna, ovat-lanceol. patentia, serrata, plana, rigida, nitida, glabra. Pedunc. axillar. oppositi, terminal. solitarii, ad angulos rectos dense dichotomi, flosculo parvo, pedicellato ex singula dichotomia. Petal. alba.

spinosa. *C. fol. ovatis. Forsk. Æg.*

In Arabia.

Fol. alterna, ovata, obtusiusc. subcrenata, glabra. Spinæ in ramis recentibus nullæ; in veterioribus axillar. solitariæ. Pedunc. axillar. dichotomi. Fl. parvi, albi.

MELHANIA.

Cal. Perian. duplex: exterius 3-phyll. foliol. 2. oppositis; tertium ad alterum latus, ovat-acuminat. basi margine reflexa. Interius 5-phyll. foliol. lanceol. extrorsum villosis, cor. adpressis, æqualibus.

Cor. Petal. 5. cuneata, retusa, longitudine calycis, campaniform. Nectar. corona circa basin gemina cui inserta filamenta, emittens 5. lacin. patenti-linear. obrusas, cor. breviores, flavescens.

Stam. Filam. 5. filiform. flava.

Anth. erectæ, lanceol. longitudine filament. fulvæ.

Pistil. Germ. superum, globoso-ovatum, villosum, albidum. Stylus filiform. longitudine germin. viride. Stigm. 5. stylo breviora, filiform. patentia.

Peric. Capf. globosa, villosa, calyc. cincta, 5-locul. 5-valv. 4-sperm. angulis dehiscens.

Sem. 4. in quovis loculo, cuneata, punctata, punicea.

velutina. *M. Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Frutex diffusus, cubit. Rami iuniores tomentosi.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 247

Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. serrata, mollia, utrimq. villosa, subius venis elatis valde reticulata. Stipul. 2. villosæ, cineræ. Pedunc. axillar. foliatar. villosi, cinerei, in umbella 4-fl. terminati. Pedicell. 1-fl. Cor. flava.

MÆSA.

Cal. Perian. duplex; exterius inferum, 2-phyll. minimum, persistens: interius 2-termini adnatum, conicum, 1-phyll. persistens, limbo 5-dent.

Cor. 1-petal. supera, campanulata, 5-fid. lacin. subrotund. concavis, patentibus.

Stam. Filam. 5. breviss. filiform. cor. inserta.

Anth. ovata, erecta, didimæ.

Pistil. Germ. globosum, calyc. immersum. Stylus crassus, teres. Stigm. truncatum.

Peric. Bacca infera, globosa, 1-locul. polysper. calyce coronata.

Sem. subrotunda.

..... *Mæsa. Forsk. Æg.*

In Arabia h.

Arb. medioc. magnitudinis, ramis striatis, verrucosis. Fol. 4-pollic. alterna, petiol. lanceol. patent. serrata, glabra. Racemi compositi. Cor. alba.

HYPERANTHERA.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. tubo breviss. campanul. lacin. 5. coloratis, concavis, glabris, ciliatis.

Cor. Petal. 5. inæqual. calyc. futuræ inserta, obtusa, petalo uno maiore, superne sita, plano: 4. min. æqual. sunt, versus latus interius sita, in apice cochleariform.

Stam. Filam. 5. antherifera, subulata; superiora longiora. Filam. 4. alia subulata, reliquis breviora, sine anth.

Pistil. Germ. subulatum, 6-gonum, villosum, superum. Stylus inferne attenuatus, villosus, superus, teres. Stigm. acutum; 3-dentat.

Peric. Legum. spitham. teres, subcarinat. articulatione incrassatum.

Q iv

248 PENTANDRIA MONOGYNIA.

monodynamia, H. Forsk. Æg.

In Arabia h.

Cassiam æmulatur flaminibus, cor. irregulari, & leguminibus. Arbor magna. Rami tomentosi. Fol. ad ramorum apices propinqua, ped. 2-pinn. Rachis comm. ped. pinnæ 5-iugæ cum impari: rudimentum foliolor. cochlearifor. petiolatum inter par singulum: pinnæ spitham. exterior. breviores, teretes: foliol. 6-8-iuga, opposita, petiolo filiformi, ovata, plana, integra, glabra. Cor. alba, medio violac.

C A D A B A.

Cal. Perian. 4-phyll. lacin. ovato-acumin. concavis, patentibus, deciduis.

Cor. 4-petal. ungues patentes, filiform. lamina lanceol. undulata, quandoq. nulla. Nectarium inter receptaculum, & laciniam calyc. superiorem, tubulosum, apice lingularum, planum.

Stam. Filam. 5. inæqual. filiform.

Anth. lanceol. acumin.

Pistil. Pedicellus filiform. incurvus, flaminibus longior, elevans germen cylindric. Styl. nullus. Stigm. obtusum, villosum.

Peric. Capf. pedicellata, cylindrica, 1-locul. 2-valv. valvulis revolutis.

Sem. plura, reniform. pulpa triplicis seriei imbricata.

rotundifolia. C. fol. orbiculat. glabris. Forsk. Æg.

In Arabia h.

Arbor grandis. Fol. alterna, petiol. basi crassa, quandoq. subrepanda, plana, glabra, sæpe apice emarginata, Cor. o Nectar. curvum, basi latius, viride, lingua supra fulva, subtus flava. Fructus 2-pollic. glaber, pennæ anserinæ crassitie, torulosus, virid. valvulis post dehiscenciam intus rubris. Sem. nigra, pulpa rubra.

farinosa. C. fol. ovat. oblong. Forsk. Æg.

In Arabia.

Fol. alterna, semipollic. obtusa, integra, plana. Racemi terminal. Nectar. parvum, album, lin-

PENTANDRIA MONOGYNIA; 249

gua tubo angustiore revoluta. Petal. 4. undulata.
glandulosa. C. ramis, foliis, calyc. pistill. glandulis villosis. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Fol. semipollic. oval-acut. non emarginata, scabra. Peduncul. terminal. subramosi. Caps. semipollic. pedicell. ovar-oblong. hispida, fetis clavatis.

CHIMARRHIS.

Cal. Perian. margine integro, coronante germen, persistens.

Cor. infundibulif. tubo breviss. limbo 5-fid., lacin. lanceolat. concavis, obtusis, inferne lineola longitudinali media hirsutis, patentibus.

Stam. Filam. 5. subulata, basi hirsuta, infra divifuras limbi, longitudine cor.

Anth. erectæ, ovals.

Pistil. Germ. subrotun. inferum, 6 yl. filiform. longitudine flaminum. Stigm. obtusum, 2-fid.

Peric. Caps. subovata, obtusa, coronata, 2-locul. 2-valv. valvis sæpe 2-fid.

Sem. folitar.

cymosa. C. Jacq. *Amer.* p. 61.

In Martinica h.

Arbor procera, comosa. Rami primarii horizontal. Fol. in apice ramorum plerumq. 8-10-pedal. opposita, petiol. lanceol-oblonga, utrimq. acuminata, integerr. nitida. Fl. racemi cymosi, axillar. oppositi, & folitar. terminales plerumq. quaterni, numerosi, parvi, albid, inodori. Caps. parvæ.

VISCOIDES.

Cal. Perian. minimum, 1-phyll. 5. dent. acutum, coloratum, germi insidens, persistens.

Cor. 1-petal. hypocraterif. tubus cylindric. superne leviter ampliatus, erectus, longiss. limbus 5-fid. lacin. parvis, lanceol. patentiss.

Stam. Filam. 5.

Pistil. Germ. subrotun. coloratum, inferum. Stylus filiform. longitudine flaminum. Stigm...

- Bacca*
Sem.
pendulum. V. Jacq. Amer. tab. 51. f. 1. ed. piñ. tab. 73.
 In Martinica sylvis h.

Planta fruticosa, ramosa, in truncis arborum seniorum par. sitica, ramis pendul. Fol. plus, minus sesquipollic. opposita, petiol. lanceol. subulcata, acumin. integerr. avenia, subdisticha, crassa, nitida. Racemi axillar. & terminal. corymbosi, compositi, penduli, rubent. Fl. semipollic. inodori, calyce, germineque rubris; cor. alba.

R U Y S C H I A.

Cal. Perian. 5-phyll. persistens, lacin. subrotun. obtusis, concavis, conniventibus, imbricatis, auctum basi squam. 2. lacin. confimilibus, & inter easdem appendice obovato, acuto, perpendiculariter dependente.

Cor. Petal. 5. ovata, obtusa, planiuscula, reflexa, calyce triplo longiora.

Stam. Filam. 5. subulata, plana, patula, petalis breviora.

Anth. oblong. incumbent.

Pistil. Germ. ovat-subrotun. Stylus nullus. Stigm. 4-gonum, cruciforme, planum.

Peric. Bacca

Sem.

Cusiaefolia. R. Jacq. Amer. tab. 51. f. 2.

In Martinica sylvis h.

Planta suffruticosa, 2-ped. arboribus parasitica.

Fol. 4-pollic. alterna, breviter petiol. obverse ovata, obtusa, integerr. crassa, nitida, avenia. Racemi terminal. 9-pollic. simplic. erecti.

Fl. parvi, inodori. Cor. purpur.

Guianensis. Ruyschia.

Souroubea Guianens. Aubl. Guian. tab. 97.

In Guiana h.

Arbustula. Fol. alterna, petiol. ovata, apice acuto, emarginata, crassa, integerr. glabra. Fl. spicati, remoti, alterni, solitar. peduncul. Bractea coccin. Cal. luteus. Cor. sulphur.

BÆOBOTRYS.

Cal. Perian. duplex; exterius 2-phyll. foliol. minimis, subrotund. concavis: interius 1-phyll. campanulat. breve, interum, germini adnatum, 5-fid. lacin. ovatis, persistentibus; post efflorescentiam conniventibus & fructum coronantibus.

Cor. 1-petal. tubulosa, calyci inserta: tubus breviss. limb. erectus, 5-fid. lacin. breviss. rotundat.

Stam. Filam. 5. breviss. in medio tubi.

Anth. cordatæ.

Pistil. Germ. globosum, semisuperum. Styl. breviss. cylindric persistens. Stigm. obtusum, apice operculatum.

Peric. Bacca globosa, calyci accreta, subicca, 1-locul.

Sem. plura, angulosa, adfixa receptac. column. in fundo baccæ.

Confer. *Masa* Forsk. *Æg. Cent.* III. gen. 9. p. 66.

nemoralis. *B. Forst. gen.*

In Insulis maris austral.

GENIOSTOMA.

Cal. Perian. inferum, turbinat. persistens, 5-fid. lacin. brevibus, acutis.

Cor. 1-petal. tubulosa: tubus dilatatus, calyce longior: faux villosa-barbara: limb. patens, 5-part. lacin. ovat. acutis, longitudine tubi.

Stam. Filam. 5. brevia, in fauce cor. Anth. oblong. e cor. eminentes.

Pistil. Germ. ovatum. Stylus filiform. tubo longior. Stigm. cylindric. obtusum, fulcarum.

Peric. Capsula? oblong. 2-locul. polysper.

Sem. plurima, subangulata, receptac. filifor. imposita.

rupestris. *G. Forst. gen.*

In Insulis maris austral.

DENTELLA.

- Cal.* Perian. superum, 5-part. foliol. subulat.
Cor. 1-petal. tubulosa, calyce longior: tubus sensim ampliatus in limbum 5-fid. patentem, lacin. acutis 3-dent. denticulo intermedio productiore.
Stam. Filam. 5. brevia, subulata, ad basin tubi inferta.
Anth. parvæ.
Pist. Germ. inferum, villosum. Styl. brevis, cylindric. crassiuscul. Stigm. 2. stylo crassiora, longiora, patentia.
Peric. Caps. infera, globosa, calyce coronata, 2-locul.
Sem. plurima, ovata.
D. Forst. gen.
In Insulis maris austral.

repens.

LOPANTHUS.

- Cal.* Perian. 1-phyll. tubulosum, 5-fid. persistens; lacin. parvis, æqualibus, acutis.
Cor. Petal. 5. spathulata: unguis tenues longitudine calyc. lacin. subrotund. patentibus.
Stam. Filam. 5. subulata, longitudine cor.
Anth. erecto-incumbent.
Pist. Germ. oblong. conicum, villosum. Styl. brevis, cylindric. parum clavatus, papulosus. Stigm. vix emarginatum.
Peric. 1-locul. villo longo obfitum.
Sem. 1. involucreat. ovatum, glabrum, in fundo calyc.
Obs. Genus proximum *Waltheriæ*.
L. Forst. gen.
In Insulis maris austral.

tomentosus.

CARPODETUS.

- Cal.* Perian. turbinat. germini adnatum, 5-dent. dentibus subulat. deciduis.
Cor. Petal. 5. parva, ovata, calyc. margine inferta.

PENTANDRIA MONOGYNIA. 253

Stam. Filam. 5. brevia, subulat. calyc. margin. inferta.

Anth. subrotund.

Pistil. Germ. inferum. Styl. filiform. staminibus longior. Stigm. capitato-depressum.

Peric. Bacca globosa, sicca, e margine calyc. adnato anulo quasi cincta, 5-locul.

Sem. aliquot subangulata.

ferratus. *C. Forst. gen.*

In Insulis maris australis.

G Y N O P O G O N.

Cal. Perian. minimum, inferum, persistens, semi-5-fid. lacinul. erectis, linear. acutis.

Cor. 1-petal. contorta: tubus cylindric. ventricosus, ad faucem coarctatus: limb. planus, 5-part. lacin. ovat-cordat.

Stam. Filam. 5. breviss. tubo supra medium inferta.

Anth. erect. linear. intra tubum.

Pistil. Germ. ovat. Styl. filiform. tubo dimidio brevior. Stigm. globosum, didymum, apice villosum.

Peric. Bacca subglobosa, pedicellata, coriacea, nucleo foera.

Sem. Nucleus cartilagineus, 2-locul. seminibus subsolitar.

Obs. Nucleus plerumq. abortiens, semin. destitutus: germina secla, 2-locular. locul. 2-sperm.

stellatum. *G. fol. verticillat. Forst. gen.*

In Insulis maris austral.

scandens. *G. fol. oppositis. Forst. gen.*

In Insulis maris austral.

D I G Y N I A.

M A T E L E A.

Cal. **P**erian. 1-phyll. turbinat. 5-part. lacin. oblong. acut.

Cor. 1-petal. tubus breviss. receptac. pistilli infertus: limb. 5-fid. patens, lacin. subrotundis, mutuo incumbentibus.

Stam. Filam. 5. breviss. tubo ad basin inserta.
Anth. in capitul. 5-gon. connatæ, 2-locul. intus
 dehiscentes.

Pistil. Germ. 2. ovata, alterum abortivum. Styli
 2. breves. Stigm. incurva, concava.

Peric. Siliqua ovat-oblon. acuta, 5-gona, verru-
 cosa, 2-valv. 2-locul. septo medio mem-
 branaceo.

Sem. plurima, plana, marginibus crenatis, murus
 incumbent. septo medio adnexa.

palustris.

M. fol. oblong--ovat. acuminat. fl. axillaribus.
Aubl. Guian. tab. 109. f. 1.

In Guiana 24.

Caul. pl. 2--ped. erecti, nodosi. Fol. opposita,
 longe petiol. angusta, inregerr. Fl. corymbosi.

Cor. subvirid. *Var. fol. amplioribus: calyce ma-
 & cor. viridi.*

latifolia.

M. fol. ovat--oblon. fl. axillar. *Aubl. Guian.
 tab. 109. f. 2.*

In Guiana 24.

Caul. 2-3-ped. quandoq. ramosi. Fol. opposita,
 latiora, petiol. semipollic.

DICHONDRA.

Cal. Perian. inferum, 5--part. foliol. lanceol.
 apice patentibus.

Cor. 1-petal. subcampanul. profunde 5-part. lacin.
 lanceolat. longitudine calyc.

Stam. Filam. 5. subulata, cor. breviora.

Anth. ovatæ.

Pistil. Germ. 2. pilosa. Styli 2. filiform. longi-
 tudine staminum, interius e basi germinum
 orti. Stigm. capitato-depressa.

Peric. Capsl. 2. subglobosæ, 1-locul. 1-sperm.

Sem. folitar. subglobosa.

repens.

D. Forst. gen.

In Insulis maris austral.



UMBELLIFERÆ.

GINGIDIUM.

Cal. **I**nvoluc. foliol. sub 6. linearibus. Involucc. magnitudine, & numero involuc. foliol. lanceol.--subulat.

Perian. proprium 5--dent. minimum, dentibus subulatis.

Cor. generalis flosculosa, flosculis radii fertilibus; disci abortientibus.

Proprie. Petal. 5. ovat--lanceol. inflexo apice cordata.

Stam. Filam. 5. cor. breviora, patentia.

Anth. subrotund.

Pistul. Germ. ovatum. Styli 2. divaricati, longitudine flamin. Stigm. simplic.

Peric. Fruct. ovato-truncat. 8--striatus, 2-partibil.

Sem. 2. hinc plana, inde convexa, striata.

G. Forst. it.

In Insulis maris austral.

montanum.

DANAA.

Character consistit in fructu didymo, & semin. binjs subrotund. non striatis, atque nucleum liberum non continentibus.

aquilegifolia. **D. All. Fl. Ped. tab. 63.**

Ligusticum alterum &c. Lob. ic. 786.

In saxosis apricis collium, & montium Taurinensium 24.

Rad. composita. Fol. radical. plura. Caul. erectus, subnudus, parum ramosus, striatus, glaber, teres, virid. Fol. petiolo palmari, tereti, & striato, qui in alios 3 uncial. dividitur medio longiore: qui deinde in 3 alios breves dividuntur subfoliaceos, quorum quilibet suum foliolum gerit, profunde 3--fid. lateral. 2-lob. aut etiam 3--fid. medio profunde 3--fido: lobi ovati sunt, dentati. Fol. glabra, subtus nervis veluti reticulata. Umbella terminal. Involuc. ex foliol. 8. linear, inæqual, aristatis. Umbel-

lulæ 15, radiis sub 20, involucc. 3--phyll. ex foliol. ut in: universali. Petal. alba, ex ovata forma in caudam abeunt linearem, emarginatam. Sem. nigra, nitida, lævia, matura subrugosa: immatura loco striarum lineæ virides.

TRIGYNIA.

SAGONEA.

Cal. **P**erian. 1--phyll. 5--part. lacin. oblong. acutis.

Cor. 1--petal. campanif. receptaculo germin. inserta: limb. 5--fid. lacin. subrotun. acutis.

Stam. Filam. 5. cor. basi inserta.

Anth. oblon. nutantes, incurvæ, utrimque fuscata.

Pistil. Germ. subrotun. Styli 3. Stigm. subrotun. capitata.

Peric. Caps. sub 3-gon. 3-locul.

Sem. plurima, minutiss. placentæ adfixa.

palustris.

S. Aubl. Guian. tab. 111.

In Caribæis 24.

Caul. pl. recti, 3-ped. simplic. cylindrici. Fol. alterna. subsessil. ovat-lanceol. longe acumin. integerr. glabra. Fl. axillar. numerosi, breviter peduncul. Cor. cærul.

TACHIBOTA.

Cal. Perian. 1--phyll. 5--part. lacin. oblon. acutis, persistent.

Cor. Petal. 5. oblong. acuta, receptac. pistil. unguibus inserta.

Stam. Filam. 5. intra petal. receptaculo imposita.

Anth. subrotun. 2-locul.

Pistil. Germ. 3--gon. Stigm. 3.

Peric. Caps. 3-gon. 3-locul. 3-valv. valvul. septis dissepimento longitudinali.

Sem. plurima, minuta, nigra.

Guianensis.

T. Aubl. Guian. tab. 112.

In Caribæis 5.

Frutex

PENTANDRIA TRIGYNIA.

257

Frutex 7-8--ped. Rami pl. sparsi, hirsuti, rufescent. Fol. alterna, subsessil. ovata, acuta, integerr. glabra. Stipul. 2. ad basin petioli, angustæ, acumin. Fl. axillar. spicati, alterni, remoti, hirsuti, peduncul. Cor. alba. Caps. nigra, calyce obvoluta.

A R U B A.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-6-part. lacin. ovata, acutis.
Cor. Petal. 5-6. ovata-oblong. obtusa, calyc. ad ambitum disci inserta.

Stam. Filam. 5-6. raro 8. foliol. villosis, disco inserta.

Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. 3-4-5-6. connata extus convexa, disco carnoso insidentia. Styli 3. conniventes. Stigm. sulcata, aut 2-part.

Peric. Caps. 3-4-6. laterales, distantes, ovatae, disco carnosio insertæ, 1-locul.

Sem. solitarium.

Guianensis. A. Aubl. *Guian. tab.* 115.

In *Guiana* h.

Frutex 6-ped. ramis alternis, undiq. sparsis. Fol. simplic. alterna, sessil. foliol. 3. petiol. comm. adnexus, ovatis, oblong-acumin. emarginatis, undulatis, integerr. rigidis, glabris. Fl. axillar. & terminal. racemosi. Bract. 2. ad basin fl. Cor. viridis.

PENTAGYNIA.

G O U P I A.

Cal. **P**erian. minimum, 1-phyll. 5-dent.
Cor. Petal. 5. disco pistil. inserta, lanceol. intus lamellam ab apice pendentem operientia.

Stam. Filam. 5. breviss.

Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. Styl. nullus. Stigm. 5. acuta.

Tom. II,

R

258 PENTANDRIA PENTAGYNIA.

- Peric.* Bacca globosa, 5-striata, 1-locul. calyc. fundo adnata.
Sem. 3-4 5. hinc convexa, inde plana.
glabra, *G. Aubl. Guian. tab. 116.*
In Caribæis h.
 Arbor excelsa, superne ramosa, & diffusa. Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. acuta, integerr. glabra. Stipul. minutæ, acutæ. Fl. axill. corymbosi, exigui, lutei. Baccæ nigræ.
tomentosa, *G. Aubl. Guian.*
In Guiana h.
 Differt a priori fol. hirsutis. *Cortex, & fol. valde amara,*

PIRIQUETA.

- Cal.* Perian. 5-phyll. foliol. ovatis, acutis, extus vilosis, deciduis.
Cor. Petal. 5. subrotund. receptac. inserta, cum calyce alternantia.
Stam. Filam. 5. receptaculo germin. inserta.
Anth. ovatæ, 2-locul.
Pistil. Germ. subrotund. 3-gonum. Styli 5-6. Stigm. plana, carnea, latiusc. 5-striata.
Peric. Caps. ovata, 3-gona, 1-locul. 3-4-valv. valvul. concavis, longitudinaliter dehiscentibus.
Sem. 7-8. subovata.
villosa, *P. Aubl. Guian. tab. 117.*
In Guiana O.
 Caul. 2-ped. ramosus, hirsutus, pilis rufescent. Fol. alterna, subsessil. ovat-oblon. dent. villosa, rugosa. Fl. in axill. superior. ramorum longi, solitar. peduncul. Cor. flava. Sem. fusca.

POLYGYNIA.

SCHÆFFLERA.

- Cal.* **P**erian. minimum, germen umbilicans, peristens, 5-dent. lacin. subulatis.
Cor. Petal. 5. parva, inter calyc. dentes, acuta, decidua.

PENTANDRIA POLYGYNIA. 259

Stam. Filam. 5. filiform. patent. petalis vix longiora.

Anth. subrotund,

Pistil. Germ. globoso-depressum. Styli 8-10, breves, teretes, persistent. Stigm. simplic.

Caps. globoso-depressa, infera, 8-10-locul.

Sem. solitar. semicircular. compressa.

S. Forst. gen.

In Insulis maris australis.

digitata.



CLASSIS VI. HEXANDRIA.

MONOGYNIA.

Fl. calyculati, calyce, corollaque infundib.

* *Musa*. (Conf. *Polygon. monarc.*)

* *Chamaerops*. *Corypha*. (Conf. *App.*)

476. *Lieuala*. Cal. 3-part. Cor. 3-part. Nectar. fertiflor.
Drupa 1-ocul.
477. *Promelia*. Cal. parvus, 3-fid. superus. Pet. 3, lanceol.
Squam. nectarifera ad basin petali. Bacca subrotund. umbilicata, 3-locul.
478. *Tillandsia*. Cal. oblong. 3 fid. inferus, persistens. Cor. campanul. 3-fid. Caps. 1-locul. Sem. pappo longiss. Planta parasitica.
479. *Burmannia*. Cal. prismaticus, angulis membranac. 3-fid. inferus, coloratus. Cor. 3-pet. Caps. oblonga, recta, 3-locul. Sem. minuta.
480. *Lachenalia*. Cal. sub 3-phyll. inferus, coloratus. Cor. 3-pet. receptac. inserta.
481. *Trudechantia*. Spatha foliacea fl. continens. Cal. 3-phyll. inferus. Pet. 3, magna, rotunda, plana. Filam. barbata. Caps. 3-locul.
533. *Bursera*. Cal. inferus, 3-phyll. lacin. parvis, subrotund. concavis. Pet. 3, ovata, acumin. patentiss. Caps. carnosa, ovata, 3-valv. 1-sperm.
540. *Frankenia*. Cal. subcylindric. 5-dent. 10-gonus, inferus, persistens. Cor. 5-pet. Stigm. 6-part. Caps. ovata, calyce tecta, 3-valv. 1-locul.
536. *Ioranthus*. Cal. 0. Cor. 6-fid. lacin. linear. revolutis. Stam. ad apices petal. Germ. inferum. Bacca 1-sperm.
537. *Hullia*. Cal. superus, 6-phyll. segment. oblong. acutis. Cor. tubo cylindrico, longiss. 6-fid. 6-fid. 6-fid. limbo 6-fid. Bacca infera, oblonga, 2-locul. polysperm.

329. *Richardia*. Cal. superus, brevis, 6-part. Cor. monopet. subcylindrica, limbo erecto, 6-fid. Sem. 3, nuda, angulosa, superne coalita.
334. *Berberis*. Cal. inferus, coloratus, 6-phyll. foliol. 3. interioribus maioribus, Pet. 6, subrotunda, ad ungues glandulis 2. Germ. cum stigmate orbiculato, magno, evadit bacca 2-sper.
309. *Leontice*. Cal. inferus, 6-phyll. deciduus. Cor. 6-pet. Pet. 3 inter. minora. Nectar. 6-phyll. unguibus cor. indens, limbo patente. Caps. inflata.
331. *Prinos*. Cal. inferus, parvus, 6-fid. peristens. Cor. rotata, 6-fid. lacin. ovatis. Bacca subrotun. 6-sper.
332. *Duroia*. Cal. cylindric. truncatus, superus. Cor. 6-part. Filam. o. Pomum lispidum.
338. *Canarina*. Cal. superus, 6-phyll. foliol. lanceol. recurvis. Cor. campanul. 6-fid. nervola. Stigmat. 6. Caps. infera, 6-locul. polysper.
339. *Nandina*. Cal. polyphyll. imbricatus. Cor. 6-pet.
330. *Achras*. Cal. inferus, 6-phyll. foliol. ovatis, concavis, deciduis. Cor. ovata, 6-fid. squamis totidem alternis interioribus. Pomum 10-locul. Sem. solitar. hilo marginali, apiceq. unguiculato, nitida.
335. *Capura*. Cal. o. Cor. 6-fid. Stam. intra tubum. Stigm. globosum. Germ. superum. Bacca.
- * *Portlandia hexandra*. * *Lythra ulique*. * *Fumaria cucullaria*.
- Fl. spathacei, seu glumacei.
483. *Hemantus*. Involuc. maximum, 6-phyll. multifl. Cor. tubulosa, 6-part. supera, lacin. linearibus. Bacca subrotun. 3-loc.
485. *Leucium*. Spatha oblonga, obtusa, compressa, marcescens. Cor. supera, campanif. 6-part. lacin. ovatis, apicibus incrassatis. Stigm. simpl. Caps. turbinate, 3-locul.
484. *Galanthus*. Spatha oblong. marcescens. Cor. supera, 3-pet. Pet. concava, Nectar. ex petal. 3. interioribus, parvis, emarginatis. Stigm. simpl. Caps. subrotun.
487. *Narcissus*. Spatha oblong. compressa, marcescens. Cor. supera, 6-pet. æqualis, Nectar. 1-phyll. infundibulif. extra stam. integrum, aut sub 6-fid.
488. *Pancreatium*. Spatha oblong. compressa, marcescens. Cor. supera, 6-pet. petalis lanceolat. Nectar. infun-

- dibulif. longiss. 12-fid. extra stam. Germina omnia sessilia.
491. *Amaryllis*. Flos e sinu magnæ spathæ prodit. Cor. supera, campanul. 6-pet. in plerisque ringens. Stam. inæqualia, declinata. Stigm. 3-fid. Inflexio petal. stam. & pistillor. mire variat in hoc genere.
499. *Crinum*. In spatha bifolia fl. umbellati. Cor. supera, infundibulif. 6-part. basi tubo flexo; lacin. 3. exterioribus uncinatis. Stam. distantia. Germen fundo cor. tectum.
482. *Pontederia*. Spatha multifi. Cor. monop. 6-fid. plerumq. ringens; lab. super. 3-fid. inferiore 3-part. Stam. 3 apici, 3 tubo cor. inserta. Caps. carnosæ, 3-locul.
492. *Bulbocodium*. Cor. infera, infundibulif. 6-pet. unguibus longiss. angustis, staminifer. Caps. acuminata, supera. Differt a *Colchico* petal. 6, stylo 1, caps. minus divisa.
486. *Tulbagia*. Cor. infera, infundibulif. 6-fid. Nectar. coronans faucem, cylindric. 3-phyll. foliol. 2-fid. magnitudine limbi. Caps. supera, ovata. Spatha oblong. 2-valv. membranac.
494. *Allium*. Spatha comm. membranac. cornuta. Fl. in umbella simplici. Pet. 6, æqualia. Stigm. acutum.
493. *Aphyllanthes*. Cal. ex squamis imbricatis constans, tubulosus. Cor. infera, 6-pet. tubulosa, limbo patente. Filam. fauci cor. inserta. Stigm. 3-fid. Caps. supera, turbinata, 3-angular. Differt a *Junco* sola cor.
502. *Hypoxis*. Cal. gluma 2-valv. Cor. 6-part. persistens, supera. Caps. 2 corolla coronata, basi angustior.
503. *Ehrharia*. Cor. infera, glumacea, duplex. Nectar. patet. Fl. nudi.
521. *Alstromeria*. Cor. 6-pet. subbilab. petal. 2 inferioribus basi tubulosis. Stam. declinata. Caps. subrotund. mucronata, 6-angular. Sem. plurima, globosa, subumbilic. punctis clavatis tecta.
522. *Gethyllis*. Cal. o. cor. supera, 6-part. Bacca radicalis, clavata, 1-locul.
532. *Hemerocallis*. Cor. infera, campanulata, tubo cylindrico, subirregul. 6-part. limbo superne magis reflexo, lacin. 3 interioribus latioribus. Stam. declinata,

320. *Agave*. Cor. supera, erecta, regular. 6-fid. lacin. lanceol. Filam. plerumq. cor. longiora, erecta. Caps. oblong. 3-locul. Fol. carnosâ, succulenta.
319. *Aloe*. Cor. infera, erecta, 6-fid. oblong. tubo gibbo; limbo patente; fundo nectarifero. Filam. receptac. inserta. Caps. oblong. Fol. carnosâ, succulenta.
317. *Aletris*. Cor. infera, tubulosa, 6-angul. 6-fid. lacin. lanceol. acutis, patentibus. Stam. inserta laciniarum basi. Caps. 3-locul.
314. *Polyanthes*. Cor. infundibulif. incurva, 6-fid. æqualis, lacin. ovatis. Filam. cor. fauci inserta. Germ. in fundo cor. Caps. subrotun.
313. *Convallaria*. Cor. infera, 6-fid. limbo reflexo, patente, lacin. ovaris. Bacca ante maturitatem maculosa, 3-locul. 3-sper.
315. *Hyacinthus*. Cor. infera, varia, tubulosa, ventricosa, 6-fid. limbo reflexo. Pori 3 melliferi ad apicem germinis. Stigm. obrutum.
316. *Phormium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Pet. 3. exteriora breviora.
307. *Asphodelus*. Cor. infera, 6-pet. stellata, petal. basi conglutinatis. Nectar. ex valvul. 6 germen regentibus. Stigm. capitat. Caps. carnosâ, subrotun. 3-loba.
308. *Anthericum*. Cor. infera, 6-pet. patens. Pet. oblong. obtusa. Caps. ovata.
304. *Ornithogalum*. Bractæ loco calyc. Cor. infera, erecta, 6-pet. persistens, supra medium patens. Filam. alterna, basi dilatata, sæpe tricuspidata.
305. *Scilla*. Bractæ loco calycis. Cor. infera, 6-pet. patens, decidua, petal. ovaris. Filam. filiformia, non lata. Caps. subovata, trifurca.
306. *Cyanella*. Cor. infera, 6-pet. concava, pet. 3 interioribus propendentibus. Stam. infimum declinatum, longius.
312. *Dracena*. Cor. infera, 6-pet. erecta. Filam. medio subcrassiora. Bacca 3-locul. 3-sper.
310. *Pollia*. Cor. infera, 6-pet. Petal. 3 exteriora maiora, concava; 3 inter. inflexa. Bacca polysper.
311. *Asparagus*. Cal. o. Cor. parva, infera, erecta, campanif. 6-pet. Pet. unguibus coherentia, 3 interioribus apice reflexis. Bacca rotund. 3-locul. 6-sper.

498. *Gloriosa*. Cor. infera, 6-pet. longa, caudata, reflexa, undulata. Styl. obliquus. Capf. ovata, pellucida.
499. *Erythronium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Petal. lanceol. supra medium reflexa, alternatim incumbentia. Nectar. tuberculis 2, petal. alternorum bisi adnatis. Stam. minima. Stigm. 3-fid. Capf. subrotund. Sem. oblonga.
497. *Uvularia*. Cor. infera, hypocraterif. 6-pet. erecta. Pet. longa, lanceol. acuta. Nect. rii f. vae baseos petali. Filamen. breviss. Styl. femibifid. Stigmatibus reflexis. Capf. oblong. Sem. subrotund. compressa.
496. *Fritillaria*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. basi fovea nectarifera. Stam. longitudine cor. Stigm. 3-fid. patens. Capf. 3-gon. Sem. plana.
495. *Lilium*. Cor. infera, campanulata, 6-pet. Petal. basi incumbentia, & angusta, linea longitudinali, nectarifera. Capf. oblong. sulcata, 3-gon. valvulis pilo cancellato connexis.
500. *Tulipa*. Cor. campanul. 6-pet. basi late cava, petal. oblongo-cuspidatis, concavis. Stigm. triangul. angulis divisis. Capf. 3-gon. Sem. plana.
518. *Yucca*. Cor. infera, 6-pet. campanul. patens. Pet. magna, ovata, concava. Filam. erecta, cor. longiora. Styl. o. Capf. oblong. 3-fulca, 3-locul. Fol. carnosa, succulenta.
501. *Albuca*. Cor. infera, 6-pet. Pet. 3. exter. patentia, integra; 3. inter. emarginata. Stam. 3. sterilia. Stigm. cinctum 3. cuspidibus.
525. *Lindera*. Cor. infera, 6-pet. Capsula.
489. *Maffonia*. Nectar. inferum. Cor. 6-pet. nectario inserta. Fl. incompleti.
526. *Orentium*. Spadix cylindric. multifi. Cal. segmentis subrotundo-angulatis, persistentibus. Cor. 6-pet. nudæ. Styl. o. Folliculi 1-sperm.
524. *Acorus*. Clava ex uno fol. digitiform. fl. sessilibus undique recta. Cal. 6-phyll. foliol. obtusis, superne crassioribus, persistentibus. Styl. breviss. Capf. 3-gon. 3-locul. 3-sper.
527. *Calamus*. Cal. 6-phyll. conicus, persistens, segmentis 3. exterioribus latioribus. Cor. o. Bacca globosa, exarida, 1-sper. retrorsum imbricata.
528. *Juncus*. Cal. 6-phyll. foliol. coloratis, siccis, glumosis. Cor. o. Capf. 3-valv. 1-locul. polysper. Her.

HEXANDRIA MONOGYNIA: 263

ba graminoides. Fl. glomerato-spicati, paniculati.

341. *Peplis*. Cal. campanulat. 12-fid. Petal. 6, parva, calyci inserta, interdum nulla. Caps. cordata, 2-locul. polysper.

DIGYNIA.

344. *Falkia*. Cal. 1-phyll. Cor. 1-pet. Sem. 4.
 345. *Atrapha-* Cal. 2-phyll. coloratus, persistens. Petal. 2, sub-
xis. brotum. sinuata. Stigmat. capitata. Sem. 1, compressum, calyce tectum.
 342. *Gahnia*. Calyc. gluma 2-valv. irregular. Nectar. 2-valv. filam. involvens. Stigm. dichotomum.
 343. *Oryza*. Calyc. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. 2-valv. subæqualis, femini adnascens.

TRIGYNIA.

Fl. inferi.

354. *Colchicum*. Cal. spatha radicalis. Cor. 6-petaloidea, tubo radicato, longo, tenui, angulato, lacin. erectis, æqualibus, ovato-lanceol. concavis. Caps. 3. connexæ, inflatæ. Num. flum. & spatha simplici differt a Croco.
 351. *Melanchium*. Cal. o. Cor. plerumque 6-pet. Petal. oblonga; patentia. Filam. ex elongatis unguibus cor. Caps. 3-gon. 3-locul.
 352. *Medeola*. Cal. o. Cor. 6-part. Petal. ovat-oblong. æqualia, patentia, revoluta. Bacca 3-cocc. 3-sper.
 355. *Helonias*. Cal. o. Cor. 6-pet. subconica. Pet. oblong. æqualia. Styli recurvi. Caps. 3-locul.
 353. *Trillium*. Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet. calyce paulo maior; Bacca subrotund. 3-locul.
 350. *Triglochin*. Cal. 3-phyll. deciduus. Petal. 3 calyciform. Styli 3, aut 6, plumosi. Caps. oblon. 3-6, basi dehiscentes. Fol. graminea. Fl. racemosi.
 346. *Rumex*. Cal. 6-phyll. foliol. duorum ordinum, quorum 3 exter. 3 interiora. Sem. 1, triquetrum, nudum. Dantur species, in quibus sexus est tota planta distinctus.
 348. *Scheuchzeria*. Cal. 6-part. patens. Cor. o. Styli o. Caps. 3, inflatæ, compressæ, 2-valv. 1-sperm. Fol. graminea. Fl. subpaniculati.
 349. *Wurmbea*. Cal. 6-part. Cor. o. Caps. 3-locul. polysperm.

Fl. superi.

447. *Flagellaria*. Cal. 6-part. lacin. ovaris. Cor. o. Bacca subrotunda. coronata, 1-sper. *Adfinitas proxima Calami.*

TETRAGYNIA.

556. *Petiveria*. Cal. 4-phyll. persistens, foliol. linear. obtusis. Cor. o. Sem. 1, aristis uncinatis.

POLYGYNIA.

557. *Alisma*. Involuc. 3-phyll. fl. colligens. Cal. 3-phyll. Cor. 3-pet. Pericarpia plura. Fl. paniculati, pedicellis verticillatis.

MONOGYNIA.

476. *LICUALA*. Cal. 3-part. Cor. 3-part. Nectar. fertiforme. Drupa 1-locul.
 1. *spinosa*. L. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Ad. Stock. 1732. Diff. nov. gen. plant. Rumph. amb. 1. tab. 9. In Amboina h.*
 Caudex ulnaris, superne divisus in 6. ramos, quorum quisque 6--ulnar. & in apice folium gerit expansum, in radios divisum, qui omnes ad suum ortum separantur. Laterales hi 14. radii sunt angusti, & non ultra 3. digit. lati, superne obrusi, & quasi disrupti. Surculus longitudine rami, inferne vaginis obvolutus: ex eius summo simpl. oritur caul. in 5. min. divisus. Fl. spicati parvi.
477. *BROMELIA*. Cal. 3-fid. superus. Petal. 3. Squama nectarifera ad basin petali. Bacca 3-locul.
 1. *Ananas*. B. fol. ciliato-spinosis, mucronat. spica comosa. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 1. tab. 57. Trew. chret. tab. 2. Black. tab. 567. Knorr. del. hort. 2. tab. A. 1. 2. Sabb. hort. 1. tab. 72. Anassa. Rumph. amb. 5. tab. 81. Kapa-Thiakka. Hort. Mal. 11. tab. 1. 2. b. Ananas aculeatus &c. Black. tab. 568.*

c. *Ananas acide virens* &c. *Dill. elth. tab. 21. f. 22.*

In nova Hispania, Surinamo &c.

Fol. radical. 2. ped. longa, sesqui-poll. lata, rigida, dilute virid. Caul. ped. teres, 2-3. foliol. obtus. Fruct. terminal. oblongo-rotund. piniform. tuberculis bullatus, ex quibus exeunt flosc. c. coerul-purpureasc. Fruct. intense flavus. Caro albido-flavesce. sapore iucundiss.

2. *Pinguin*. B. fol. ciliato-spinosis, mucronat. racemo terminali. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehr. tab. 31.*

Ananas &c. *Pluk. man. tab. 258. f. 4.*

Pinguin. Dill. elth. tab. 240. f. 311.

In Jamaica, Barbados &c.

Fol. magis expansa, in centro rubentia. Scap. 2-3-ped. pyramidal. tomentosus. Fl. numerosi, sub 2-pollic. Petal. pulchre rosea. Fruct. sub-pollic. flavescens, sapore acidulo, non grato.

Pro sepibus vivis, ut possent fere inde mania fieri.

3. *Karatas*. B. fol. erectis fl. acaulibus, sessil. adgregatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. 2. pida tab. 260. f. 24. quoad fl. & fructum. Hort. tab. 31. 32.*

In Amer. meridion. &c.

Fol. radical. longiss. humanam altitud. superantia, subulato-linear. mucronata, canalicul. ciliato-spinosa, spinis sursum arcuatis, & pungent. basi villo ferrugineo obsita. Fl. 200-300. inodori. Cor. rosea. Fruct. ovalis, non edulis. Stolones inter fol. peracto fructu procumbentia, subulato-filiformes, radicales, propagantes plantam.

4. *lingulata*. B. fol. serrato-spinosis, obtusis: spicis alternis. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 64. f. 1.*

In Amer. meridion. &c.

Fol. radical. sessil. lingulata, arundinacea, creberr. avenia. Scap. simpl. subnudus. Spicæ multæ, laterales.

5. *nudicaulis*. B. fol. radical. dentato-spinosis: caulinis integerr. (inermibus). *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. 62.*

In Amer. merid. &c.

Fol. radicalia lauss. sese amplectentia, canalicu-

lata: caulina lanceol. nervosa. Fl. pyramidal.
Fruct. oblongi.

6. *humilis*. B. subacaul. fl. adgregatis, sessil. axillis stolonifer. *Syst. veg. ed. 14.*

Habitat

Fol. mucronata, ciliato-spinosa, congeneribus similia, sed omnium rigidiss. breviora, magisque patent. Fl. sub 30. cœrul. in centro fol. Fruct. minor. non grati.

7. *Acanga*. B. panicula diffusa; fol. ciliato-spinosis, mucronat. recurvatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Caraguata. *Pis. Bras. tab. 91.*

Mexo-cotl. *Herm. mex. Moris. Hist. 3. f. 4. tab. 22. f. 7.*

In Brasilia 24.

Fol. longiss. angustiss. & aculeata. Fl. fig. digiti, col. albo-flavesc. Fruct. racemosi, dispersi. Sem. rotunda, nigra, carne spongiosa, acida. *Distinguenda itaque a B. Karatas.*

478. *TILLANDSIA*. Cal. 3-fid. persistens. Cor. 3-fid. campanulata. Caps. 1-locul. Sem. papposa. *Planta parassitica.*

1. *utriculata*. T. culm. paniculato. *Syst. veg. ed. 14.*

Viscum &c. *Stoun. Jam. hist. 1.*

In Amer. meridional. arboribus 24.

Fol. *Aloes* in orbem posita, alia cliis inclusa, 2-pedal. cum dimidio, basi in utricul. conniventia, apice mucronato. Caul. 3-4-ped. e folior. medio, rectus, ramosus. Fl. sparsi, pallide lutei, seu herbac. Stam. purpur. Caps. longæ, triangul. e viridi fuscæ.

2. *serrata*. T. fol. superne serrato-spinosis: spica comosa. *Syst. veg. ed. 14.*

Caraguata &c. *Plum. ic. 75. f. 1.*

In Amer. merid.

Fol. longiss. aliquot pedes longa, crassa, excavata, lata basi sese invicem involvent.

3. *lingulata*. T. fol. lanceol-lingulat. integerr. basi ventricosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Am. tab. 62. ed. picta tab. 92.*

Caraguata &c. *Plum. ic. 74.*

Viscum &c. *Stoun. Jam. hist. 1. tab. 120.*

In Amer. merid. arboribus vetustis.

Colligit aquam, & servat.

Culm. erectus, simpl. foliosus. Fol. radicalia,

multa, ped. basi concava, integerr. nitida.
Fl. terminal. glomerati, 3-poll. lutei, ino-
dori. Caps. fuscae.

4. *tenuifolia*. T. fol. filiform. integerr. spica simplici, laxa.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. am. tab. 63. ed. picia
tab. 93.

Renealmia &c. Plum. ic. tab. 238. f. 2.

Viscum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 122. f. 1.
In Amer. merid. arboribus.

Scapus superne pl. spicas lateral. imbricatas emit-
tens. Fol. erecta. Fl. coerul.

5. *paniculata*. T. fol. radical. brevissim. caul. subnudo; ramis
adscendentibus, subdivisis. Syst. veg. ed. 14.

Renealmia &c. Plum. ic. 237.

In Amer. merid.

Caul. ramosiss. Fol. multa, linear. integerr. Fl.
terminal. erecti. Petal. contorta, ac retrosle-
xa. Stam. longiss.

6. *polystachia*. T. culmo spicis imbricatis, lateralibus. Syst. veg.
ed. 14.

Viscum &c. Cates. car. 2. tab. 89?

In Amer. calidiore.

Culm. erectus, 3-pedal. foliosus. Fol. multa,
infer. 2-ped. lineari-subul. integerr. canalicul.
basi lata, & ventricola. Spicae sub 10-ped.
coccineae. Spathae coccin. totas spicas regen-
tes. Fl. solitar. sessil. inodori. Cor. coerul.

7. *monostachia*. T. fol. linear. canaliculatis, reclinatis: culmo
simplic. imbricato: spica simplici. Syst. veg. ed.
14.

Renealmia &c. Plum. gen. ic. 238. f. 1.

In Amer. merid.

Fol. ex lata basi imbricata. Fl. nivei.

8. *recurvata*. T. fol. subulatis, scabris, reclinatis: culmis 1-fl.
gluma 2-fl. Syst. veg. ed. 14.

Viscum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 121. f. 1.

In Jamaica arboribus.

Dispositio fol. ut in prima specie. Fol. longa,
angusta, Pini sylv. æmula, lanuginosa. Caul.
3-unc. nudus, incanus. Cal. canescens. Cor.
purpur.

9. *usneoides*. T. filiform. ramosa, intorta, scabra. Syst. veg.
ed. 14.

Viscum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 122. f. 2-3.

Cuscuta &c. Pluk. alm. tab. 26. f. 3.

Camanbaya. *Pet. gaz. tab. 62. f. 12.*

In Virginia, Jamaic. Brasiliae arboribus.

Caul. c. pl. media plerumq. parte ramo superficialiter adhærentes; filamentis ulnaribus, crispis, ad imitar barbae senis. Caulic. 2-3-unc. ramosi, cum filamentis eiusdem longitudinis, albis. Fl. in summis ramulis.

decumbens. T. fol. ovar lanceol. *Forsk. Ægyp.*

In Arabia 24.

Caul. decumbens. Fol. *Commelineæ æmula*, sed longitudinaliter punctato-striata, crassiuscula. Fl. violac. Filam. valde villosa. *An ergo Tournefortia? Var. fol. lanceol. vaginant. alternis, ciliatis.*

479. BUR- Cal. prismat. coloratus, 3-fid. angulis membra-
MANNIA. naceis. Petal. 3. Caps. 3-locul. oblong. recta.
Sem. minuta.

1. *disticha.* B. spica gemina. *Syst. veg. ed. 14. Burm. zeyl. tab. 20. f. 1.*

In Zeylonæ paludosis.

Habitus Antherici. Fol. radicalia, plura, graminea, seu ensiform. Caul. erectus, semiped. simplex, fol. minimis, alternis vestitus. Spicæ terminal. simplic. divaricatæ, secundæ. Fl. parvi, cœrul. Caps. ventricosa.

2. *biflora.* B. fl. gemino. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia paludosis.

Caul. humilior, nudus, capillaceus. Fol. angusta. Fl. purpur. apicibus luteis.

480. LACHE- Cal. sub 3-phyll. inferus, coloratus. Cor. 3-pet.
NALIA. receptaculo inserta.

1. *tricolor.* L. *Syst. veg. ed. 14. Ad. helv. vol. 9. tab. 3. f. 3. Jacq. icon. pl. rarior. tab. 3.*

481. TRA- Cal. 3-phyll. Pet. 3. Filam. villis articul. Caps.
DESHANTIA. 3-locul.

1. *virginica.* T. erecta, lævis: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14. Ephemerum. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 4. In Virginia 24.*

Caul. palm. geniculat. Fol. radicalia 2-3. longa. & quasi graminea, mucronata, nervosa, margine aspero: caulina ad genicula amplexicaul. Bract. umbella longiores. Pedunc. inæqual. apice incrassati. Ph. ampli. Cal. villosus. Cor. purpuro-cœrul.

2. *malabari-
ca*. T. erecta, lævis: peduncul. solitar. longiss. *Syst.*
veg. ed. 14.
Tali-pulli. *Hort. mal.* 9. tab. 63.
In Malabar.
Caul. rotundi, geniculati, virides. Fol. grami-
nea. Petal. cuspidata, cœrul-purpur.
3. *nervosa*. T. scapo 1-fl. *Syst.* veg. ed. 14.
In Suratte?
Caul. diffusi, palm. Fol. vaginant. lanceol. pol-
licar. conferta. Pedunc. terminal. filiform. sub-
1-fl. Bract. obsoleta, a fl. remota. Flos ma-
gnus. Cal. scarifus, 3-nervis. Petal. ovata,
lata, multinervia. Stam. pilis violac.
4. *geniculata*. T. procumb. hirsuta. *Syst.* veg. ed. 14. *Jacq. amer.*
tab. 64. ed. 2. *picte* tab. 95.
In Amer. merid.
Caul. geniculati, herbac. Fol. alterna, vaginant
cordato-acumin. integerr. nervosa. Panicul.
axill. & terminal. dichotomæ. Fl. parvi. Cor.
alba.
5. *axillaris*. T. caul. ramoso: fl. sessil. lateralibus. *Syst.* veg.
ed. 14.
Ephemerum &c. *Pluk. alm.* tab. 174. f. 3.
Nir-pulli. *Hort. mal.* 10. tab. 13.
In India.
Caul. basi repens, ascendens. Fol. linear. acuta,
patentia, vaginis coloratis, longius ciliatis.
Fl. solitar. parvi. Cor. infundibulif. cœruleo-
purpurasc. Stam. pilis articulatis.
6. *crisata*. T. repens, lævis; spathis 2-phyll. imbricatis.
Syst. veg. ed. 14. *Jacq. hort.* 2. tab. 137.
In Zeylona ☉.
Planta elegans, habitu Commelinæ comm. Caul.
diffusi, teretes, læves, ramosi. Fol. lanceol.
recurvata, crassa, pinguia, lævia, vaginis
striatis. Spathæ 2-fl. fl. sessil. lunatæ, 4-6.
parium, secundæ. Cal. cor. brevior, villosus.
Petal. sessil. ovata, cœrul. Filam. pilis cœrul.
articulatis. Styl. clavatus. Stigm. rubulosum,
crenatum. *Tota planta in aquis adnata succo
muscoso donatur.*
7. *papilion-
cea*. T. repens, lævis: spathis 3-phyll. imbricatis.
Syst. veg. ed. 14. *Burm. Ind.* tab. 7. f. 11.
In India ☉.
Radix fibrosa. Caul. 3-pollic. articulati, ad ge-

nicula radicans. Fol. lineari-lanceol. subtus pilosa, erecta, sessil. basi subciliata: vagina breviss. latiuscula. Spatha cordata, margine subciliata; sub qua foliol. 2. lanceol-lunata, super. breviora; inter quæ flos, carinæ loco: inter prædicta 2. foliol. alia proditura spatha, cum suis foliol. nondum conspicuis; sic spatha refert fl. papilionac. Cor. violac. non cœrul. Simil. priori, sed fl. cor. longiora.

- ¶. *speciosa*. T. fol. oppositis, connatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cop. b. Spei.

Caul. 2--ped. lævis, sub genicul. lanatus. Fl. verticilli remoti. Fol. sub verticillis opposita, ensiformi--lanceol. connata, margine parum lanata. Petal. 3. exteriora lanceol. rigidiora; interiora 3. teneriora.

482. PONTE-Cor. 1-petal. 6-fid. bilabiata (plerumq.). Stam. DERIA. 3. apici; 3. tubo cor. inserta. Caps. 3-locul.

1. *ovata*. P. fol. ovatis: fl. capitatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Narukilo. Hort. mal. 11. tab. 34.

In Malabaræ aquosis 24.

Caul. rotundi, subcomplanati, superne unico nodulo instructi. Fol. ampla, oblong-rotunda, cuspidata, venis tenuissim. paralellis; supra satore virid. & nitentia, subrus dilutiora.

2. *rotundifolia*. P. fol. orbiculato--cordat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Surinamo.

Fol. radical. petiol. quandoq. renifor. obtusa, avenia. Fol. caulinum unicum, ex cuius petioli vagina exit pedunc. digital. femiteres. Spatha terminal. 1--phyll. ovata, persistens. Spadix hispidus. Spica peduncul. ovata, breviss. fl. pedicellat. fere imbricata in capitulum. Cor. fauce, & magnitudine flosc. neutri *Centaurii Cyani*.

3. *vaginalis*. P. fol. cordat. racemo (post efflorescentiam) cernuo. *Syst. veg. ed. 14.*

Plantaginis &c. Pluk. alm. tab. 215. f. 4.

Olus &c. Rumph. amb. 6. tab. 75. f. 1.

In Ind. orient. aquosis 24.

Radix fasciculata, fibrosa, ferrugin. Scap. nullus. Fol. radicalia vix cordata, acumin. nervosa, lævia, petiolat. pollicar. Petiol. longiss. supra medium

medium parum dilatati, rima laterali. Racemus lateral. simpl. fol. brevior, e vagina petioli. Fl. 4-5. alterni, breviter pedicell. secundi. Styl. clavatus.

4. *cordata*. P. fol. cordat. fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Gladiolus &c. *Pes. gar. 1. tab. 1. f. 12.*
 Sagittæ &c. *Morif. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 8.*
 Plantagini &c. *Pluk. mant. tab. 349. f. ult.*
In Virginia aquosis 24.
 Radix fibrosa, aggregata. Caul. spitham. simpl. Petiol. vaginantes. Fol. *Sagittariæ* similia, 2-cuta, nervosa, pubescentia. Fl. spica e rima vaginæ caulinx, basi involuta bract. Cor. purpuro-cœrul.

5. *hastata*. P. fol. hastatis: fl. umbellat. *Syst. veg. de. 14.*
 Carim-gola. *Hort. Mal. 11. tab. 44.*
 Sagittæ &c. *Morif. Hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 7.*
Pluk. alm. tab. 220. f. 8.
In India 24.

Caul. simpl. herbaceus, in medio tumidior. Fol. e medio caulis, quasi ex utriculo prodeunt. Pedunculus ex scapo hiant, subspicatus. Spatha lanceol. infra spicam, viridis. Fl. remotiuscul. alterni, sessil. Scillæform. Cor. regular. Germ. superum, ovatum.

483. HÆ-
 MANTHUS. Involuc. 6-phyll. multifi. Cor. tubulosa, 6-part. supera. Bacca 3-locul.

1. *coccineus*. H. fol. linguiform. planis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 64.*

Narcissus &c. *Herm. mex. tab. 899.*

Ad cap. b. Spei 24.

Radix tuberosa, non edulis. Caul. ex vaginis fol. clausis, albis, violaceo-guttatus. Fol. sessi-spitham. ovali-oblon. integra, nervosa, virid. rachis subtrus violaceo-guttata. Spatha dentata. Setæ longæ inter pedicellos.

2. *punicus*. H. fol. lanceolat-ovat. undulat. erectis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. Trew. chret. 44.*

Hyacintho &c. *Seb. mus. 1. tab. 12. f. 1. 2. 3.*

Saiyrium &c. *Swert. flor. 1. f. 13. Morif. hist. 3.*

f. 12. tab. 12. f. 11. Rudb. elyf. 2. p. 120. f. 3.

In Guinea 24.

Radix ex gemino tubere. Caul. dodrant. ex albivirens, cum maculis purpur. Fl. nunc satore, nunc dilute coccinei, tandem incarnati.

Tom. II.

S

274 HEXANDRIA MONOGYNIA.

3. *carinatus*, H. fol. linear. carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei 24.
4. *pubescens*, H. fol. linguiform. villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei 24.
484. GALANTHUS, Petal. 3. concava. Nectar. ex petal. 3. parvis,
 1. *nivalis*. G. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 313.*
Knorr. del. 1. tab. S. 15. n. 2. Clus. pann. 181.
182.
Leucoium &c. Tabern. ic. 614.
Erangelia / Renealm. Sp. tab. 96.
Narcissus 6. Cam. epit. 956.
Ad radices montium Verona &c. 24.
Radix tunicata. Scapus 3-8-unc. anceps, basi
fol. 2. involutus, 1.-fl. Vagina albida. Fol.
sublinear. triquetra, basi flavescent. Spatha
longa, marcescens. Petal. elliptica, alba. Ne-
ctar. supra medium extus cum macula viridi,
cordiform. Caps. ovata, obtusa.
485. LFCO- COR. campaniform. 6-part. apicibus incrassata.
 COIUM, Stigm. simp.
1. *vernum*. L. spatha 1-fl. stylo clavato. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. Austr. 4. tab. 312. Knorr. del. 1. tab. S.
15. n. 1. Ruab. elyf. 2. p. 95. f. 1. Clus. hist.
1. p. 169. Tabern. ic. 613.
Narcissus VII. &c. Camer. epit. 957. Matth.
In Germania, Italia &c. pratis umbrosis ad ri-
vulos 24.
Radix bulbosa. Scap. cubital. angulatus, fistulo-
sus, striatus. Fol. porracea, radical. polita,
nitida, satore virent. Spatha marcesc. Fl. ter-
minat. nutantes. Petal. alba, apice extus vi-
rescente, odora.
2. *aestivum*. L. spatha multifi. stylo clavato. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. Austr. 3. tab. 203. Clus. hist. 1. p. 170.
Polyanthemum. Renealm. Sp. tab. 100.
In Pannonia, Hetruria &c.
Fol. huius lata, ut in L. verno, nec filiform. ut
in sequent. Scap. anceps, foliis altior. Fol. li-
near. Fl. penduli. Petal. elliptica, alba, cum
macula virescente.
3. *autumnale*. L. spatha multifi. styl. filiform. *Syst. veg. ed. 14.*
Clus. hist. 1. pag. 170.
Tricophyllum. Renealm. Sp. tab. 100.
In Lusitania 24.

Scapus ped. Spatha oblong. lineari-lanceol. 2-fl.
Pedunc. inæqual. Cor. tubulosa.

486. TULBAGIA. Cor. infundibulif. limbo 6-fido. Nectar. coronans
facem, 3-phyll. foliol. 2-fid. magnitudine lim-
bi. Caps. supera.

1. *alliacea*. T. fol. subfiliformibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. hort. 2. tab. 115. huc pertinet.*
Ad cap. b. Spei 24.

Radix bulbosa. Fcl. radicalia, plurima, linear.
subcarnosa. Scap. pedal. Spatha umbellifera,
2-valv. Fl. cernui, fusco-purpur.

Differt a sequenti statura ma: & nectar. 6-den-
tato. Fol. trita odorem alliaceum fatidum spi-
rant.

2. *cepea*. T. fol. lanceol-linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. supp.*
Ad cap. b. Spei 24.

Radix ex tubercul. connatis. Fol. radical. 1-2-
ped. plurima, linear. obtusa, nitida, læte vi-
rent. Scap. unicus, leviter compressus, obso-
lete anceps. Spatha membranac. 2-valv. alba,
sub 15-fl. formans umbellam raram, inæqua-
lem. Cor. lacin. erectis, lanceolat. rigidis, e
rufo ferrugin.

487. NARCISUS. Petal. 6. æqual. Nectar. infundibulif. 1-phyll. in-
tegrum, aut leviter 6-fid. Stam. intra nectar-
ium.

1. *poeticus*. N. spatha 1-fl. nectar. rotato, breviss. scariofo,
crenulato. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. 1. tab. N. 4. Dod. pempt. 223.*

In Italia, Helvetia &c. pratis montanis subhumidis.

Scap. pedal. & ultra, rectus. Spatha lacera.
Petal. alba. Nectar. limbus cinnabarinus, vel
luteus.

2. *Pseudonarcissus*. N. spatha 1-fl. nectar. campanul. erecto, crispo,
æquante petal. ovata. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 227. f. 12.*

Bulbocodium &c. Bauh. hist. 2. p. 593.

In Europæ nemoribus, & collinis pratis 24.

Scap. cubit. subanceps. Fol. crassa, lata, obtu-
sa, carinata. Flos grandis, flavus. Nectar.
plicatum, 6-fid. petal. concolor, & æquale.
Var. fl. pleno.

3. *bicolor*. N. spatha 1-fl. nectar. campanul. margine patu-
lo, crispo, æquante petala. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. clys. 2. p. 71. f. 9. ap 71*

In Europa australi 24.

S ij

Simil. priori, sed petal. alba. Nectar. satore luteum, maius, limbo patulo, undulato, crenato. Fol. vix palmar. Flos magnus. Petal. cordat-ovata, alba.

4. *minor.* N. spatha 1-fl. nectar. obconico, erecto, crispo, 6-fid. æquante petal. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Rudd. elyf. 2. p. 72. f. 11. Barr. ic. 976. Pseudo-Narcissus &c. Clus. hist. 1. p. 165. Bulbocodium &c. Bauh. hist. 2. 597.*

In Hispania 24.

Adfinis valde N. Pseudo-Narcisso, sed triplo omnibus partibus minor. Scapus vix striatus. Spatha virens. Flos magis nutans. Petal. basi inter se distincta, recta, lanceol. nec obliqua, aut ovata.

5. *moschatus.* N. spatha 1-fl. nectar. cylindrico, truncato, subrepando, æquante petal. oblon. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania 24.

Petal. alba. Nectar. cylindric. flavum, moschum olens.

6. *triandrus.* N. spatha sub-1-fl. nectar. campanul. crenato, dimidio petalis brevior; stamin. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Rudd. elyf. 2. p. 72. f. 12.*

In Pyrenæis 24.

Magnitudo N. poetici, sed fol. dimidio angustiora, canaliculata. Cor. tota nivea. Petal. ovato-oblong. Nectar. margine inæqualiter crenulato. Stam. raro 6. Anth. luteæ.

7. *orientalis.* N. spatha sub 2-fl. nectar. campanul. 3-fid. emarginato, petal. triplo brevior *Syst. veg. ed. 14. Rudd. elyf. 2. p. 52. f. 2. Clus. hist. 1. p. 154.*

b. N. oriens. &c. Rudd. elyf. 2. p. 54. f. 5.

c. N. albus &c. Rudd. elyf. 2. p. 50. f. 1.

N. latifolius &c. Clus. hist. 1. p. 155.

In Oriente 24.

Species latifolia facie Tarzette. Cor. alba. Nectar. erectum, flavum.

8. *trilobus.* N. spatha submultifl. nectar. campanul. sub 3-fid. integerr. petalis dimidio brevior. *Syst. veg. ed. 14. Rudd. elyf. 2. p. 61. f. 3.*

In Europa australi 24.

Simil. N. Junquillæ, sed nectar. cylindric. obsolete trilobum. Petala pallida. Nectar. flavum.

9. *odorus*. N. spatha subbiflora; nectar. campanul. 6-fid. lævi, diuidio petalis brevior: fol. semicyliandric. *Syst. veg. ed. 14.*
In Europa australi 24.
 Scap. fere sesquiped. anceps. Fol. ut in N. hispanico. Flos luteus. Nect. concolor. *Var. fl. albo, sulphur. pleno &c. ut videre est in Rudb. elys. &c.*
10. *salathinus*. N. spatha multifi. nectar. campanul. subæquante petal. fol. planis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 60. f. 3.*
Narcissus IX. &c. Clus. hist. 1. p. 158.
In Europa australi, Oriente 24.
Simil. N. Tarzetta, sed petal. paulo ma: & acutiora. Flos flavus.
11. *Tarzetta*. N. spatha multifi. nectar. campanul. plicato, truncato, triplo brevior petalis: fol. planis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. N. 3. Rudb. elys. 2. p. 57. f. 11.*
N. latifolius, fl. albo. 1. 2. Clus. hist. 1. p. 155.
In Gallia, Hispania &c. maritimis, subhumidis 24.
 Fol. disticha. Cor. tubus viridis.
12. *Bulbocodium*. N. spatha 1-fl. nectar. turbinato, petalis mag. genitalibus declinat. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. Elys. 2. p. 73. f. 3. 7.*
Pseudo-Narcissus &c. Clus. hist. 1. p. 166.
Inter Ulyssiponem, & Hispalim 24.
 Nectarium magnum, aureum.
13. *serotinus*. N. spatha 1-fl. nectar. 6-part. breviss. fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 64. f. 8.*
N. autumnalis &c. Clus. tab. 252.
In Italia, Hispania, Barbaria 24.
 Planta parva. Flos albus.
14. *Junquilla*. N. spath. multifi. nectar. campanul. brevi: fol. subulat. *Syst. veg. ed. 14.*
N. juncifolius &c. 2. Clus. hist. 1. p. 159.
In Hispania, Oriente 24.
 Flos luteus.
- dubius*. N. spath. multifi. petal. ovatis: nectar. campanul. integerr. petal. triplo brevior. *Gouan. Illus. Rudb. Cam. tab. 31. f. 2.*
In sylvis 24.

N. Tazetta duplo humilior. Scap. lineatus, apice subanceps. Fol. 5-6. linear. palmaria, scapo breviora. Petal. & nect. album.

hispanicus. *N.* scapo ancipiti, exstriato, 1-fl. nectar. 6-fid. parulo; lobul. dentatis. *Guian. Illust.*
In Hispania 24.

Scapus dodran-fesquiped. Fol. longitudine fere scapi, plana. Cor. minima, basi extus e flavo-virens. Petal. subæqual. lanceol. obliqua, lutea; exterioribus 3. paulo latioribus, inagisque acumin. Nectar. cylindric. petalis vix longius, concolor, post anthesin longius.

488. PAN-CRATIUM. Cal. est spatha. Petal. 6. Nectar. infundibulif. 12-fid. Stam. nectario imposita.

1. *xylicum*. *P.* spath. 1-fl. petal. reflexis. *Syst. veg. ed. 14.* Narcissus &c. *Herm. Lugd. tab. 693. Comm. hort. 1. tab. 38. Rudb. clyf. 2. p. 179. f. 7.* *Lilium indicum. Rumph. amb. 6. tab. 70. f. 2.* Catulli-pola. *Hort. mal. 11. tab. 40.*
In India 24.

Bulbus oblongo-rotund. pallidus. Fol. Narcisso breviora. Cor. 6-gona, candida, odora.

2. *mexicanum*. *P.* spatha biflora. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 222. f. 289.*

In Mexico 24.

Scapus dodrant. Fol. dodrant. trifid. reclinata, dilute virid. glauca. Cor. alba.

3. *caribæum*. *P.* spatha multifi. fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.* Narcissus &c. *Comm. hort. 2. tab. 87. Martyn. cent. tab. 27.*

In Jamaica, Caribæis 24.

Bulbus tunica exter. subrubra. Fol. 2. ped. longa, 4. digitos transversos lata, nervis longitudinal. Scap. fol. longior, planus. Flos hexagon. albus, odoratus.

4. *maritimum*. *P.* spath. multifi. petal. planis: fol. lingularis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 197.* *Lilio-Narcissus &c. Morif. hist. 3. f. 4. tab. 10. f. 28.*

Hemerocal. *Valentina. Clus. hist. 1. p. 167.*

In locis maritimis 24.

Bulbus extus nigricans, intus albus. Scap. 2-ped. anceps. Fol. 7-8. apice obruso, latitudine pollic. dilute virid. Fl. magni. Petal. lanceol. alba, subtus linea viridi: exter. 3. apice in-

trorsum uncinata. Nectar. angul. 2-part. acuminat. & divaricatis ad latitudinem petal. Germ. media umbellæ, sessil. Stylus declinatus. Filam. inflexa.

5. *declinatum*. P. spatha multifi. scapo compresso, ancipiti: cor. lacin. tubum subexcedentibus: fol. lingulatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. pict. tab. 102. Hort. 3. tab. 11.*

Habuit

Bulbus ovatus. Fol. plura, 2-3-ped. acutiuscula. Scap. longitudine fol. æquis, compressus. Fl. sub 10. aggregati, Vanillam olentes. Spath. membranac. Cor. lacin. linear. patentibus, reflexis, canaliculat. abis, tubo subvivente. Nectar. albens. Anth. flavæ.

6. *carolinianum*. P. spath. multifi. fol. linear. staminibus nectarii longitudine. *Syst. veg. ed. 14.*

Lilio-Narcissus &c. *Catesb. car. 3. tab. 3.*

In Jamaica, Carolina 24.

Scap. 6-7-pollic. Fol. lariuscula, satore virid. lucentia. Cor. tubo ad basin ventricoso, alba.

7. *illyricum*. P. spath. multiflora: fol. ensiform. staminibus nectar. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Trew. chres. tab. 27.*

Narcissus &c. *Seb. thes. 1. tab. 8. f. 1.*

Lilio-Narcissus &c. *Besl. syst. vern. 3. tab. 16. f. 1.*

In Illiria 24?

Fol. *Galanthi* magnitudine. Fl. magni, candidi, odore *Balsami Peruviani*.

8. *littorale*. P. spath. multifi. scapo compresso, ancipiti: cor. lacin. tubo duplo brevioribus: fol. ensiform. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 74. f. 94. ed. picta tab. 101. Hort. app. tab. 73.*

In littoribus arenosis Cartagena 24.

Bulbus pugni magnitudine, foris fuscus. Fol. plura, sublinear. attenuata, acutiuscula, 2-3-ped. integerr. nitida. Scap. axillar. erectis. Fl. 4-10. odore *Vanillæ*. Spatha arida. Cor. inferne pallide virens, superne nivea, lacin. semireflexis. Nectar. inæqualiter emarginat. patens, album. Anth. aurantiacæ.

9. *amboinense*. P. spath. multifi. fol. ovatis, nervosis, petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Narcissus &c. *Rudb. slyf. 2. p. 238. f. 17.*

b. Pancratium foliis &c. Trew. chres. tab. 28.

Cepa &c. Rumph. amb. 6. tab. 70. f. 1.

In Amboina.

Bulbus oblong-rotund. albicans. Scap. sesquiped. & ultra, rotund. Fol. 4-5. longe petiol. magna, lata, acumin. nervis longitudinal. apice coeuntibus, dilute viridia. Fl. sub-12. pedunculat. nivei, inodori. Stam. petalis breviora: in var. longiora.

maximum. P. spath. 1-fl. petal. patent. nectar. ped. Forks.

Æg.

In Arabia 24.

Scapus teres, glaber. Petal. flamin. longiora, acuta, patula, sed non reflexa, et in *P. zeylanico*, alba. Nectar. enorme.

489. MASSONIA. Nectar. inferum. Cor. 6-petal. nectar. inferta.

1. *latifolia. M. fol. orbiculat. glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. Diff. nov. pl. gen.*

Ad cap. b. Spei.

Fol. radicalia, bina, lævia. Fl. aggregat. exscapus. Fruct. non baccatus, sed capsul. membranaceis.

2. *angustifolia. M. fol. lanceolat-oblong. glabris. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. l. c.*

Ad cap. b. Spei.

3. *undulata. M. fol. lanceol. undulatis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Thumb. l. c.*

Ad cap. b. Spei.

4. *echinata. M. fol. ovat. muricatis, pilosis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

490. CRINUM. Cor. infundibulif. 6-part. lacin. 3. exterioribus uncinatis. Germ. fundo cor. tectum. Stam. distantia. In spatha 2-fol. fl. umbellati.

1. *latifolium. C. fol. ovat-lanceol. acuminat. sessil. planis. Syst. veg. ed. 14.*

Sjouanna H. mal. 11. tab. 39. Rudd. elyf. 2. p. 91. f. 12.

In Asia arenosis 24.

Bulbus albicans. Scap. planus, compressus. Fol. 3-4. digit. transversos lata, crassa, striis longitudinal. Fl. 5-6. quatuor, quinq. pollic. candidi, striati, odore debili, sed grato. Anth. filiform, inumbentes.

2. *asiaticum*. C. fol. carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lilium &c. *Herm. Lugd. tab. 683. Rudb. elyf. 2.*
p. 142. f. 10.
Radix &c. *Rumph. amb. 11. tab. 69.*
Belutta pola. Hort. mal. 11. tab. 38. Rudb. elyf.
2. tab. 90.
In Malabaria, Zeylona, America ¶.
Bulbus corculo flavo. Scapus plano-rotund. dilute virid. Fol. bifaria equitantia, ensiform. lata, oblong-acumin. venis longitudinal. viridifusca, ad radicem albicant. Cor. purpurasc. margine albo, lacin. longiss. reflexis. Stam. declinata. Bulbi intra capsul. generantur.
3. *zeylanicum*. C. fol. scabro-dentat. scapo compressiusculo. *Syst. veg. ed. 14.*
Lilio-Narcissus &c. *Ehret. piñ. 5. f. 2. Trew. ehret. tab. 13. Comm. hort. 1. tab. 73. Rudb. elyf. 2. p. 181. f. 9.*
Tulipa &c. *Rumph. amb. 5. tab. 105.*
In India orientali ¶.
Statua C. *americ. Fol. Scillæ officinal. carnosa.*
Spatha 2-valv. præter ramenta aliquot interiora. Cor. tubus scapo concolor, rufescens; limbus albus petalis lanceol. recurvis; subtus rubro-carinatis. Filam. & styl. sanguineus. Germina sessilia.
4. *americanum*. C. cor. apicibus introrsum uncinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lilio-Asphodelus &c. *Comm. rar. tab. 14. Dill. elth. tab. 161. f. 195.*
Lilio-Asphodelus &c. *Comm. rar. tab. 15.*
In America ¶.
Bulbus crassus. Fol. 2. ped. longa, & ultra, palmum lata, carinata, margine undato, dilute virid. Scap. 2-3-ped. subcompressus, ad latus fol. egrediens. Spath. multifi. Fl. primum dilute flavescens, dein albi, odore *Leucoit*.
5. *africanum*. C. fol. sublanceol. planis: cor. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. L. 10.*
Hyacinthus &c. *Breyn. prod. 1. ic. 23. tab. 10. Comm. hort. 2. tab. 67. Seb. thes. 1. tab. 19. f. 4.*
Hyacintho &c. *Pluk. alm. tab. 195. f. 1.*
In Æthiopia ¶.
Bulbus rotundus, subflavus. Scap. 2-ped. rotun-

- dus. Fol. radicalia, in orbem expansa, mucronata, virid. Cor. cœrulea.
6. *tenellum*. C. spath. multifi. fol. filiform. cor. æqualibus. Syff. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pluk. atm. tab. 225. f. 2.
Ad cap. b. Spei 24.
Planta minor *Ornithogalo* mi. Rad. bulbosa. Fol. radicalia, digital. Scap. digital. spiralis, ut in *Antherico spirali*, teres. Umbella ped cell. 3-4. æqualibus, pollic. Spatha linear. membranacea. Fl. magnitudine *Arenaria trinervia*.
7. *obliquum*. C. fol. lanceolat. obliquis; cor. lacin. alternis, extus glandulosis. Syff. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Cor. purpurea.
8. *speciosum*. C. fol. ensiform. cor. campanulatis; lacin. 3. alternis, calloso-ungiculat. Syff. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Fl. magni, umbellati, sanguineo-purpur.
9. *lineare*. C. fol. linear. cor. campanulat. lacin. 2. angustioribus. Syff. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
Fl. magni, albi.
10. *angustifolium*. C. fol. linear. obtusis; cor. cylindricis, lacin. alternis, interglandulosis. Syff. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
11. *falcatum*. C. fol. linear. falcatis, ad oras cartilagineis, scabris. Syff. veg. ed. 14. Jacq. hort. 3. tab. 60.
In promontorio b. Spei 24.
Bulbus ovatus, magnitudine pugni, extus nigricans. Fol. obrufa, crassula, glauca, terræ incumbens. Scap. lateralis, erectus, compressus, rufus. Spath. 2-fol. Fl. umbellati, 7. odori. Cor. albida, cum dorfi media parte rubra. Styl. declinatus, rubens.
-
- caspium*. C. Pall. it. 2. tab. Q.
Ad mare Caspium 24.
Fol. radical. 2-3. lanceol-latiuscula, conniventia, undulata. Scap. erectus, fol. paulo longior, lævis. Spath. 2-phyll. Umbella erecta, convexa. Fl. peduncul. purpureo-albi.

491. AMA- Flos ex sinu magnæ spathæ prodit. Cor. 6-petal. campanulatus. panulata, in plerisque ringens. Stam. declinata. *Inflexio petalor. flam. & pistil. mire variat in hoc gen.*
1. *capensis*. A. spath. 1-fl. remotiss. cor. æquali; flaminibus, pistilloq. rectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Silyrinchium &c. *Corn. Canad. 164. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 23. f. 9. Rudb. elyf. 2. p. 236. f. 17.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Bulbus crociform. reticulo obductus. Fol. *Narciss.*, longitudine scapi. Scap. infra medium vaginans. Spatha acumin. plana. Petal. lanceol. extus cinerea, intus cœrul. circulo flavo divisa, macula nigricante ad unguem. Stam. breviss.
2. *lutea*. A. spath. 1-fl. cor. æquali: flamin. strictis. *Syst. veg. ed. 14.*
Narcissus autumn. ma. Clus. hist. 1. p. 164.
In Italia, Hispania &c. 24.
 Scap. semiped. Petal. lutea. Stam. alterna, breviora.
3. *Atamasco*. A. spath. 1-fl. cor. æquali; pistillo declinato. *Syst. veg. ed. 14.*
Lilio-Narcissus &c. *Catesb. car. 3. tab. 12. Barr. ic. 994. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 24. f. 4.*
In Virginia 24.
 Scap. ped. Fol. angusta, *Narcissina*. Fl. solitar. albi, dilute rosei.
4. *formosissima*. A. spath. 1-fl. cor. inæquali, petal. 3. genitalibusque declinatis. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1742. tab. 6. Knorr. del. 1. tab. N.*
Lilio-Narcissus &c. *Dill. elth. tab. 162. f. 196.*
Narcissus &c. *Rudb. elyf. 2. p. 89. f. 10.*
In Amer. meridian. 24.
 Bulbus fuscus. Fol. *Narcissina*, ped. & ultra, reflexa, subcarinata. Scap. ped. Cor. sanguinea, ad basin herbaceo-albicans, marginibus petal. lateralium linea albida. Squamæ totidem quot filamenta, e receptac. ortæ. *Raro 2-fl. evadit.*
5. *Belladonna*. A. spath. multifi. cor. campanulat. æqualibus, ungue reflexis: genitalibus declinatis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 23.*
Lilio-Narcissus &c. *Seb. thes. 1. tab. 17. f. 1.*
Lilium rubrum. Merian. Surin. tab. 22.
In Caribæis, Barbados, Surinama 24.

Bulbus virid. Scap. teres, subcompressus. Cor. incarnata, fundo viridi-alicante. Petal. 3. exterior. intus apice reverso: 3. interior. basi ciliata. Stylus ruber.

6. *reginae*. A. spath. multifi. cor. campanulat. æqualibus, undulat. genitalibus declinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Mill. ic. tab. 24.

Lilium &c. *Herm. par. tab. 194.*

In Caridæis.

Differt a priore marginibus petalor. undulatis, nec ad unguem recurvatis. Petal. punicea.

7. *undulata*. A. spath. multifi. cor. patulis, petal. undulatis, mucronatis, basi dilatatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. hort. 3. tab. 13. Hill. hort. Keven. tab. 14.
Ad cap. b. Spei 24.

Bulbus subrotundo-ovat. squamosus, extus fuscus, intus albus. Fol. pauca, erectiuscula, linear. obtusiusc. glabra. Spath. 2-phyll. sub 12-fl. Foliol. oblonga, striata, integerr. extus purpur. intus carnea, subpellucida. Petal. patent. rosea, inodora. Stam. declinata.

8. *sarniensis*. A. spath. multifi. cor. revolutis: genitalibus erectis. *Syst. veg. ed. 14.*

Narcissus &c. *Corn. Canad. tab. 158. Rudb. elys. 2. p. 23. f. 14. Ehret. Select. tab. 9. f. 3. Seb. mus. 1. tab. 17. f. 3.*

Lilium &c. *Dugl. monogr. tab. 1. 2.*

In Japonia, nunc in Sarnia insula Angliæ 24.

Bulbus ovatus. Scap. ped. superne virens, inferne punctis atro-purpur. Fl. 9-10. Petal. 2-unc. angusta, cinnabarina, vena sanguinea, lacunarum media discriminante.

Fl. foli meridiano expositi, mille semillas evibrant.

9. *longifolia*. A. spath. multifi. cor. campanulat. æqualibus: genitalibus declinatis: scapo compresso, longitudine umbellæ. *Syst. veg. ed. 14. Ehret. piæ. tab. 13.*

Lilium &c. *Herm. parad. tab. 195.*

In Æthiopia 24.

Bulbus rotund. albus. Scap. spitham. Fol. longa, lata, flexuosa. Petal. satore purpur. nientia, quandoq. diluta.

10. *disticha*. A. spath. multifi. fol. distichis, incumbenti-patentiss. cor. æqualibus, campanulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

- Umbella ut in *Hemantho*. Fl. incarnati.
11. *ciliaris*. A. spath. multifi. fol. ciliatis: cor. 6-part. reflexa. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia.
 Fol. linear. plana, 2-palmar. pollicis latitudine, ciliis albis.
12. *orientalis*. A. spath. multifi. fol. linguiform. cor. inæqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Brunsvigia Heist. cum fig.
Lilio-Narcissus &c. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 10. f. 35.
Narcissus &c. Swert. flor. tab. 1.
In India 24.
 Bulbus maximus. Fol. ad terram strata, ampla, pedal. 2-3-pollic. lata, apice obtuso, subrotund. Scap. palmar. plano-convexus. Fl. veluti umbellati, sub 30, 2-pollic. peduncul. Petal. pallide rubella, seu col. lateritii, striis flavicant. immixtis, inodora.
-
- alba*. A. fol. lineari-lanceol. fl. albo. *Forsk. Suppl. Æg.*
In Arabia 24.
 Spatha 10-fl. Fl. declinati.
- bifolia*. A. fl. singulari, purpur. *Aubl. Guian.*
In Guiana.
492. BULBO-CODIUM. Cor. infundibul. 6-petal. unguibus angustis, stam. miniferis. Caps. supera. *Differt a Colchico petal. 6. stylo unico; capsul. minus divisa.*
1. *vernum*. B. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Retz. Obs. fasc. 2. tab. 1. f. 1.*
Colchicum vernum Clus. hist. 2. app. 203.
In Hispania, Russia 24.
 Bulbus fuscus. Fol. sese mutuo amplectentia, carinata. Plos primum albus, dein dilute purpur. Fl. interdum 4-petal. *tetrandri.*
493. APHYLLANTHES. Cal. ex squamis imbricatis compositus, tubulosus. Cor. 6-petal. caryophyllæa, petalis in tubum, superius limbo patente instructum dispositis. Stigma 3-fid. Capsula turbinata, 3-angular. *Differt a Junco sola cor.*
1. *monspeliensis*. A. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 3. p. 336.*
Cariophyllus &c. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 25. f. 12.
In pascuis fœcis Monspeli 24.

Rad. repens. Culm. pl. 2-palm. simpl. cincti
basi vaginis, uti *Juncus*. Fol. radicalia, grami-
nea. Fl. terminal. solitar. cœrul.

494. **ALLIUM**. Spatha commun. membranac. cornuta. Fl. in
umbella simplici. Petal. 6. æqual. Stigm. acu-
tum.

* *Fol. caulina plana. Umbella capsulifera.*

1. *Ampelopras*. A. caul. planifol. umbellifero: umbella globosa;
petal. carina scabris; flamin. tricuspidatis. *Syst.*
veg. ed. 14.

In Oriente, & in Anglia 24.

Rad. sphaerica, cum bulbis adnatis ex parte infe-
riori. Scap. cubital. & ultra, inferne folio-
sus. Fol. pulposa, succulenta, glauca. Spath.
conica, 1-phyll. decidua. Petal. alba. Stam.
cor. longiora. *Odor Porri.*

2. *Porrum*. A. caul. planifol. umbellifero; flamin. tricuspi-
dat. radice tunicata. *Syst. veg. ed. 14. Black.*
tab. 421. Cam. epit. 321.

b. Porrum sedile Matth. 550.

In vineis Helvetiae, an sponte?

Simil. priori, & forte sola varietas. Rad. bulbo-
sa, subcylindr. ventricosa. Scap. 3-ped. &
ultra, inferne foliosus. Fol. lata, plana, vel
carinata. Spath. subconica, caduca. Umbella
magna, sphaerica, densa. Pedunc. purpur. Pet.
subpurpur. carina scabra.

3. *lineare*. A. caul. planifol. umbellifero: umbella globosa;
flamin. tricuspidat. cor. duplo longioribus.
Syst. veg. ed. 14.

Porrum &c. Gmel. Sib. 1. tab. 13. 14. f. 1.

In Sibiria.

Scap. dodrant-fesquicubit. solidus. Fol. aut vi-
rid. & tenuia; aut crassa, inferne convexa;
acuta, quandoq. obtusa, glauca. Spath. alba,
postquam rumpitur bicornis. Petal. subrubent.
stria longitudinali saturiore.

4. *rotundum*. A. caul. planifol. umbellifero: umbell. subglo-
bosa: fl. lateralibus, nutantibus: flamin. tri-
cuspidat. *Syst. veg. ed. 14.*

Allium, seu Moly. 3. Clus. pann. 216. 218.

In Europa australi 24.

Rad. ex bulbis purpur. & nigris constans. Scap.

3-ped. Fol. graminea. Spatha brevis. Petal. exter. purpur. inter. dilutiora.

5. *vidoriale*. A. caul. planifol. umbellif. umbella rotundata: fol. elliptic. stamin. lanceolat. cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 216. Black. tab. 344.*

A. *angustum*. Cam. epit. 329. Math. 559.

A. *alpinum*. Bauh. hist. 2. p. 356.

In *alpinis Italia, Helvetia, Austria &c.* 24.

Odor *alliaceus*. Bulbus ruber. Caul. pedal. & ultra, inferne cum macula purpur. Fol. radical. 2-3. caulina 2-3. vaginantia: radicalia in alpinis angusta, elliptico-lanceol. in hortis ovata. Spath. brevis, lata. Petal. purpur. vel subalbida, virore tincta.

6. *subhirsutum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. infer. hirsutis: stamin. subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Moly *Diosc. Clus. hist. 1. p. 192.*

In *Africa, Italia, Hispania &c.*

Bulbus exiguus, simpl. Caul. ped.-cubital. Fol. spitham. Spath. brevis. Pedunc. longi, sparsi. Petal. acumin. alba.

7. *magicum*. A. caul. planifol. umbellifero; ramulo bulbifero; stamin. simplic. *Syst. veg. ed. 14.*

Moly ind. *Swert. Fl. 61.*

b. *Caucasus. Lcb. ic. 162.*

Habitat

Bulbus magnus. Caul. 2-cubit. teres. Fol. ampla, unc. lata, obtusa, glauca: caulina subterna. Capitul. bulbiferum. Petal. magna, alba, linea virescente.

8. *obliquum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. obliquis, teretibus: stamin. filiform. fl. triplo longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. 2ib. 1. tab. 9.*

In *Sibiria.*

Bulbus oblong. Caul. 1-3-cubit. apice parum nutans. Fol. omnia caulina, alterna, lineari-lanceol. vaginis teretibus. Capitul. hemisphaeric. sine bulbillis. Spath. globosa, acumin. purpur. Petal. erecta, ovata, concava, alterne laeviora, lutea, carina viridi. Filam. albida. Anth. luteae. Germ. subglobosum.

9. *ramosum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. (saepe) linearibus, subconvexis: umbella globosa: stamin. subulat. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Comm.*

Gott. 1752. tab. 9. & tab. 10. f. 2. Gmel.
Sib. 1. tab. 11. f. 1.

In Sibiria.

Bulbus cylindricus. Caul. ferme 2--ped. teres. Fol. subdodrant. Cephæ odore, & sapore, varientia latitudine, & col. alterna, planiuscul. canalicul. margine obtuso. Spath. alba, striis virid. Petal. ovata, purpurascens. carina saturiore; quandoq. alba. Filam. purpur. Anth. violac. Germ. subrotun. maculis 3. virid. E medio caule ex ala folio opposita ramus nudus, longitudine caulis.

10. *roseum*. A. caul. planifol. umbellif. umbella fastigiata; petal. emarginatis; stamin. breviss. simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Magnol. monsp. tab. 10. Rudb. clyf. 2. p. 166. f. 17.*

In Monspelii, Pedemontis vineis 24.

Fol. linear. plana, longitudine vix scapi. Scap. pedal. teres. Spath. obtusa. Fl. maiores quam in reliquis. Petal. obovat-oblong. obtusa, atro-purpur. Stam. alba. Bulbi ad fructum nulli.

11. *tataricum*. A. caul. planifol. umbellif. fol. semicylindric. umbella plana, stamin. simplicibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Sibiria.

Caul. semipedal. versus basin foliosus, teres, lævis. Fol. vix caule breviora, lævia. Spath. subrotun. 2-valv. marcescens. Umbella fastigiata. Cor. plana, alba, petal. lanceolat. subcarinatis.

** *Fol. caulina, plana. Umbel. bulbifera.*

12. *fatium*. A. caul. planifol. bulbifero: bulbo composito; stamin. tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14. Cam. epit. 328.*

In Sicilia.

Odor olidus. Fol. linear. Umbella subrotunda. Sem. nigra.

13. *Scarodoprasum*. A. caul. planifol. bulbifero: fol. crenulat. vaginis ancipitibus; stamin. tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Germania, Dania &c.

Caul. 3-ped. & ultra. Fol. lata, plana. Umbel. subro-

subrotun. valde bulbifera. Spatha longa, mucronata. Petal. rubra, margine albido.

14. *srenarium*. A. caul. planifol. bulbifero; vaginis teretibus; spatha mucica; stamin. tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 290.*

Porrum &c. *Hall. tab. 2. f. 2.*

Allium, seu Moly montanum &c. *Clus. Pann. p. 212.*

In Thuringia, Helvetia &c. secus torrentes 24.

Odor olidus. Priore angustius & minus. Bulbi etiam in imo caul. qui ante anthesin cernuus, 3-ped. Fol. lata, margine pilis rigidul. ciliata. Spath. bicornis. Umbel. exigua, bulbis atro-purpur. Fl. pauci, exigui, violac.

15. *carinatum*. A. caul. planiuscul. bulbifero; stamin. subulatis, *Syst. veg. ed. 14. Hall. all. tab. 2. f. 2.*

A. *sylvestre* &c. *Bauh. hist. 2. p. 561.*

Ampeloprasum &c. *Lob. ic. 156.*

Allium, seu Moly 2. *Clus. hist. 1. p. 193.*

In Germania, Helvetia &c. montibus 24.

Odor Rap-aceus. Bulbus simplex. Caul. 4-ped. paucifol. Fol. angusta, obtusa, carinata, apice plana, non denticul. subtus striata, sicut & vaginæ: caulina teretia. Spath. longiss. 2-cornis. Umbella capsulifera. Petal. purpur. vel ochroleuca.

*** *Fol. caulina teretia. Umbel. capsulifera.*

16. *sphærocephalon*. A. caul. teretifol. umbellif. fol. semiteretibus; stamin. tricuspidatis, cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

Allium, seu Moly montanum &c. *Clus. hist. 1. p. 195.*

Scorodoprasum &c. *Mich. gen. tab. 24. f. 2.*

In Italia, Sibiria &c. ad rupes, & alpes 24.

Caul. cubit. glauci. Fol. fistulosa, succulenta. Spatha brevis. Umbella sphaerica, dilute jaethina, fl. mediis erectis; lateralibus repandis, etiam pendulis; omnibus parvis. Petal. connivent. sature purpur. ovata, alterna; exteriora paulo breviora, & angustiora.

17. *parviflorum*. A. caul. subteretifol. umbellif. umbella globosa; spath. subulata; stamin. simplic. cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australi 24.

Tom. II.

Pacies A. sphaerocephi. Bulb. oblong. tunicatus. Caul. teres, striatus, foliosus. Fol. subulata, longitudine fere caul. Fl. minimi. Petal. exter. ovata, trifidiora; inter. duplo longiora, lanceol. purpurasc. Stam. & styl. cor. longiores. Spath. 2-phylla.

18. *descendens.* A. caul. subteretitol. umbellifero; pedunculis exter. brevioribus: stamin. tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. ely. 2. p. 160. f. 20. & 165. f. 13.*

In Pedemontio 24.

Ad caulis originem duos adnatos bulbulos habet. Caul. 2 pedal. Fol. fistulosa, supra canaliculata, lata. Vagina 4-fida. Umbella sphaerica. Petal. latius purpurasc. n.

19. *moschatum.* A. caul. teretifol. umbellif. umbella fastigiata, sub. 6-fl. petal. acutis; stamin. simplicibus: fol. fetaceis. *Syst. veg. ed. 14.*

Mely & c. Rudb. ely. 2. p. 166. f. 14.

In Gailo-provincia, Narbona & c. apricus elevatis.

Bubi 1 2. Caul. temiped. Spatha brevis: umbella rara. Fl. maicul. Petal. obscure alben-tia, linea fusca divita, odore grato Ziberki. Fructus pyramidalis.

20. *flavum.* A. caul. teretiusculo, umbellifero: fl. pendulis; petal. ovatis; stamin. cor. longioribus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 141. Rudb. el f. 2. p. 157. f. 6.*

Monspeli, in Austria & c. 24.

Bulbus ovatus, odore, & sapore *Cepæ*. Caul. 1-2-ped. solidus, foliosus, rore glauco. Fol. teretia, supra basin planiuscula. Spathæ valvula altera foliacea, umbella duplo longior. Umbella laxa. Petal. erecta, ovata, obtusa, concava, flaviss. Stam. simplic. cor. duplo longiora. Styl. brevis. Fruct. erecti.

21. *pallens.* A. caul. subteretifol. umbellif. fl. pendulis, truncatis: stamin. simplicibus, cor. æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Gethiondes sylv. Colum. ecphr. 2. tab. 7. f. 2.

In Italia, Hispania & c. ad colles 24.

Caul. 2-ped. teres, lævis. Fol. alterna, longiss. semiteret. heptagona, erecta, fistulosa. Spatha subulata, nervosa. Cor. campanulat. truncata, alba, quandoq. purpurasc. Petal.

erecta, obovata, obtusiss. concava, carina viridi. Stam. simplic. longitudine petalor. Fl. mox ab adolescentia penduli. Styl. breviss.

12. *paniculatum*. A. caul. subteretiusc. umbellif. pedunc. capillari-bus, effulis: spatha longiss. stamin. subularis. *Syst. veg. ed. 14. Hall. opusc. n. 25. cum fig. In Austria, Italia, Helvetia &c. 24.*

An var. prioris? Odor porraceus. Bulbus conicus. Caul. 2-pedal. Fol. subulata, canalicul. In umbella bulbilli plerumq. nulli. Pedunc. longiss. Petal. obovat. purpur.

13. *vineale*. A. caul. teretiuscul. bulbif. stamin. tricuspidat. *Syst. veg. ed. 14.*

A. sylvest. Lob. ic. 156.

Ampeloprasum. Muth.

b. Porrum &c. *Morif. hist. 3. f. 4. tab. 15. f. 4. In Germania, Helvetia, Pedemontio, in arvis colitum 24.*

Bulbus ex multis bulbillis. Scap. sesquiped. Fol. fistulosa. Capitul. arcum bulbis acuminat. recurvis, sæpe in longiora acumina crinitis. Cor. parva, violac. Stam. fetis 2. longis, extra fl. prominentib. Var. capitul. gemino, fl. destituto.

14. *oleraceum*. A. caul. teretifol. bulbifero: fol. semiteret. scabris, subtrus sulcatis; stamin. simplic. *Syst. veg. ed. 14. Hall. all. n. 26. f. 2.*

Allium, seu Moly 3. *Clus. pann. 213. 215.*

In Svecia, Germania &c. 24.

Odor bulbillar. porraceus. Bulbus gracilis, sursum acutus. Caul. cubit. & ultra. Spath. 2-fol. cornubus prælongis, altero longiore. Umbell. pauciss. Petal. exter. acutiora, pallide purpur. interior. latiora, dilutiora. Bulbil. maturi magni, ovaes.

15. *Pallasii*. A. caul. subteretifol. umbellif. umbella difformi; stamin. simplic. cor. æquantibus: stylo breviss. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gott. 1775. tab. 3.*

Habitat . . .

Bulbus globosus, tunicatus, magnitudine Nucis avellanæ exiguae. Caul. sesquipedal. gracilis, foliosus. Fol. longa, semitereti-subul. alterna, vagina pallida, striata, lineis prominentibus, violac. Spath. 2-phyll. Umbella rotundata, interspersis fl. quibuldam abortientibus. Pedunc. longiss. pollic. purpurei, supra incrassati. Cor.

exigua, purpur. Stam. cor. æqual. Filam. purpur, Anth. fuscæ.

**** *Fol. radicalia, Scapus nudus.*

26. *nutans*, A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. subplanis; stamin. tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Porrum &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 12.*

In Sibiria.

Bulbus turbinat. albus, odore *Allii*. Scap. cubit. & ultra, in principio teres, mox compressus. Fol. 4-5. pallide virid. sæpe spiraliter torta. Spatha brevis, globosa. Caput hemisphær. Petal. alba, aut subpurpur. Stam. dentes in antiquo oblitterantur. *Variet. ætate, & loco præ reliquis, ut vix agnoscatur.*

27. *ascalonicum*, A. scapo nudo, tereti: fol. subulat. umbella globosa: stamin. tricuspidatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cepa &c. *Morff. hist. 3. f. 4. tab. 14. f. 3.*

In Palæstina &c.

Statura fere *A. schænoprasii*. Scap. spitham. & ultra, subnudus. Spath. membranac. Fl. min. *A. schænoprasii*. Petal. erecta, ovat-lanceol. cœrul. carina atro-cœrul. Stam. longitudine petalor., alternis latissim. apice 3-fid. Anth. flavæ.

28. *senescens*, A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. subtus convexis, lævibus: umbella subrotunda; stamin. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 11. f. 2.*

Allium, seu Moly &c. 1. *Clus. pann. 220. 221.*

A. saxatile &c. *Boec. mus. 2. tab. 79.*

A. petraeum &c. *Bauh. hist. 2. tab. 364.*

In Sibiria, Helvetia &c. &c.

Bulbus oblong. odore, & sapore *Cepæ*. Caul. 2-3-pedal. angulosi, dein purpur. Fol. obliqua, acumin. crassiuscula, glabra, plerumq. 6. erecta. Petala erecta, distantia, canalicul. inflexa, dilute purpur. Stam. corolla paulo longiora. Umbella numerosa. Fl. non penduli.

29. *odorum*, A. scapo nudo, teretiusc. fol. linear. canalicul. subtus angulatis: umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australi &c.

Bulbus ovatus. Fl. basi connexa in fasciculum stipitatum. Scap. erectus, pedal. Spatha brevis

- cum rudimentis membranaceis inter omnes pedunculis. Cor. alba, odora, carina rufescente. Stam. subulata, simplic. cor. dimidio breviora. Sryl. albus.
20. *angulosum*. A. scapo nudo, ancipiti: fol. linear. canaliculat. subtus subangulatis, umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 423.*
Cepa &c. Gmel. Sib. 1. tab. 143. f. 2.
A. petraeum &c. Bauh. hist. 2. tab. 564.
In Sibiria, Germania, Pedemontii pratis humidiusculis 24.
 Bulbus ovato-oblong. albus. Fol. pedal. & breviora, obruta, quandoq. subtus vix angulata, scap. superne parum angulato-striatus, quandoq. 4-gonus, fol. altior. Spath. membranac. albida. Umbella hemisphaer. densa. Petal. palide purpur. odora, lateribus conniventia; interiora anice patentia.
Differt ab A. senescente, loco natali: fl. maioribus; maiori plantae magnitudine; & fol. minime flexuosis.
31. *nigrum*. A. scapo nudo, tereti (dein compresso-4-gono): fol. linear. umbell. hemisphaer. spath. mucronata, 2-fid. petal. erectis. *Syst. veg. ed. 14. All. Fl. Ped. tab. 25. f. 1. Rudb. elys. 2. pag. 160. f. 21.*
Habitat Algirix, in Gallo-provincia, & Pedemontio 24.
 Fol. radicalia, 2-palmar, pollicem lata, lanceol-linear, saepe 5, vaginantia, odore Allii, plana. Petal. alba, 3. exteriora maiora. Fruct. magnus.
32. *canadense*. A. scapo nudo, tereti: fol. linear. capitulo bulbifero. *Syst. veg. ed. 14.*
In Canada 24.
 Fol. spitham. recta. Scap. vix fol. longior. Spath. ovata, mucronata, acutiuscula. Fl. albidus, pauci, pedicellati. Stam. simplicia, longitudine cor. Anth. rufescent.
33. *ursinum*. A. scapo nudo, superne triquetra: fol. lanceol. petiolat. umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 787. Lob. ic. 159. Cam. epit. 330.*
In Europa nemoribus 24.
 Sapor acerrimus: odor Allii vehemens. Bulbi fascicul. Scap. pedal. inferne semicylindr. Fol. infer. subbina, longe petiol. subped. Umbella

- sub 12-fl. Spatha alba, 2-valv. valvis ovatis. Petal. e viridi-albescent.
34. *triquetrum*. A. scapo nudo, foliisq. triquetris: stamin. simplic. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elyf. 2. p. 159. f. 16. Moly &c. Park. par. tab. 143. f. 4. In Hispania, circa Narbonam, & in alpidibus Pedemontii 24.*
Fol. *Sparganii*, ensiform. Scap. palm. & ultra, erectus, fol. brevior. Spath. 2-valv. lanceol. scariosa. Petal. alba, carina obsolete viridi. Stam. & pistill. petalis dimidio breviora. Anth. flavæ. Stigm. acutum.
35. *Cepa*. A. scapo nudo, inferne ventricoso, longiore: fol. teretibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Habitat
Radix bulbosa, tunicata, orbicul. alba, vel rubra. Scapus, & fol. tubulosa. Petal. alba, vel purpurascens.
36. *Moly*. A. scapo nudo, subcylindrico: fol. lanceol. sessilibus: umbella fastigiata. *Syst. veg. ed. 14. Swert. Fl. 1. tab. 60. f. 2. In Baldo, Pyrenæis &c. 21.*
Petal. flava, patentia; 3 exter. magis, inter. erecta.
37. *multibulbosum*. A. scapo nudo, tereti: fol. lanceolat.-elongat. sessil. umbella fastigiata: petal. omnibus patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 10.*
Habitat
Videtur A. nigrum. Lin. Vix odor Allii; sapor tamen aliquis. Bulbus ex multis bulbillis constans, albus. Fol. radicalia, 1-fesquiped. lato-ensiform. plana, striata. Scap. 2-ped. Umbel. densa, leviter convexa. Petal. alterna, ovalia, obtusa, concava, albescent. cum linea dorsali virescent. Filam. alba.
38. *fistulosum*. A. scapo nudo, adæquante fol. teretia, ventricosa. *Syst. veg. ed. 14.*
Cepa oblonga. Dod. pempt. 687.
Habitat
Radix tunicata. Scap. pedal. in medio ventricosus. Umbell. sphaerica. Pedunc. semunc. Petal. alba, linea virente distincta; 3. exter. breviora.
39. *Scharnoprasum*. A. scapo nudo, adæquante fol. teretia, subulato-filiform. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 689.*

b. Cepa &c. *Gmel. Sib. 1. tab. 15. f. 1. Buxb. cent. 4. tab. 45.*

Allium &c. *Comm. Gott. 1775. tab. 14.*

In alpestribus Sibiria, Pedemontu &c. 14.

Bulbi compressi, longi. Scap. cubi. fistulosus. Fol. fistulosa. Vagina brevis, 2-fol. albi, cum linea purpur. Petal. dilute purpur. nitida.

40. *sibiricum*. A. scapo nudo, tereti: fol. semicylindric. flamin. subulat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sibiria.

Fol. minime angulata. Scapi fol. longiores. Umbella fistulosa. Spatha parva, ovata, scariosa. Petal. ovata, sinu obruso, acuta, alba, carina virescente. Stam. subulata, cor. breviora. Stigm. simpl. Germ. cinereum.

41. *tenuissimum*. A. scapo nudo, tereti, inani: fol. subulat. filiform. capitul. laxis, paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 15. f. 2. 3.*

In Sibiria.

Bulbi tenuiss. dilute violac. Scap. palm-dodrant. tenuis. Fol. ventricosa, glauca. Fl. 6-7-8. breves, pallide rubent.

42. *Chamæmoly*. A. scapo subnullo, nudo; fol. planis, ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Moly &c. *Rudb. clys. 2. p. 166. f. 15.*

Chamæmoly &c. *Colum. ceph. tab. 326.*

Saturnia Marasti.

In Italia.

Bulbus nucis Avellanæ magnitudine, subflavus. Fol. 4-5. vix pedal. ambitu hirsuto. Petal. alba, extus purpurasc. vel virentia.

desertorum. A. fol. caulinis teretibus: umbell. capsulifera; anth. subulat. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Est e minoribus. Petal. albo-rufescent. linea media obscuriore.

cœruleum. A. *Pall. it. 2. tab. R.*

In Dauria.

Bulbus parvus, simplex. Scapi 1-2. sesquiped. teretes. Fol. ad basin scapi vaginant. 2-3-linear. scapis multo breviora. Umbel. sphaerica, dilute cœrul. Petal. basi albida, nervo saturiore.

*altaicum.**A. Pall. it. 2. tab. R.**In montibus altaicis.*

Bulbus natiuſcul. turbinat. ſimplex, tunicis fufcis, radical. longiſſ. ramofiſ. Fol. terna, vaginant. fiſtuloſa, inferius ampla, ſubinflata, ſenſimq. attenuata. Scap. fol. longior, ampliſſ. fiſtuloſus, in medio ſubventricof. Spath. ſimpl. lata. Umbell. parva, confertiſſ. ovata. Petal. albidohyalina, baſi viſcent. Stam. cor. longiora.

monſpeſſul-
-num.

A. ſcapo tereti, ſolido: umbella ſaſſigata: petal. linear. ſtamin. ſubulatis: fol. lanceolat. Gouan. Illuſt. tab. 16.

*In agris.**Habitat A. magici. b.*

Odor nullus, aut debilis Allii. Bulbus albus, tunicis exterioribus nigricant. Scap. longiſſ. 3-ped. ſtriatus. Fol. 4-5-7. radical. ſere cubital. unc. lata, plana, glauca. Spatha globosa, bifariam dehifcens. Umbell. primum hemiſphær. Petal. anguſtiſſ. viſcent. patentia, dein reflexa.

495. LILI-
UM.

Cor. 6-petal. campanul. linea longitudinali neſtarifera. Capſ. oblonga, ſulcata, 3-gona, valvul. pilo cancellato connexis.

1. *candidum.*

L. fol. ſparſis: cor. campanular. intus glabris. Syſt. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 190. Knorr. del. 1. tab. L. Black. tab. 11.

In Helvetia, Palæſtina &c. 24.

Radix bulbosa, ſquamosa. Caul. 2--cubit. ſimpl. reſtus, folioſus. Fol. longa, acumin. undulata. Fl. racemoſi. Petal. candida. Anth. ſulphur.

2. *bulbiſerum.*

L. fol. ſparſis: cor. campanulat. erectis, intus ſcabris. Syſt. veg. ed. 14. Jacq. Auſtr. tab. 226. Knorr. del. 1. tab. L. 4.

In Italia, Auſtria &c. editioribus collibus 24.

Radix bulbosa, eſculenta. Caul. ſeſquiped. etiam maculatus. Fol. alterna, graminea, lanceol. trinervia, ſubhirsuta. Bulbi axill. dilute virid. nitidi. Cor. erecta, purpuro--crocea, albo-punctata, phœnicea. *Var. incana; & altera fl. plena.*

3. *pomponium.*

L. fol. ſparſis, ſubulatis: fl. reflexis: cor. revo-lutis. Syſt. veg. ed. 14. Mill. ic. tab. 65. f. 2. Knorr. del. 1. T. 4.

L. rubrum præcox. Cluſ. hiſt. 1. p. 133.

b. *L. miniatum* &c. *Rudd. clyf.* 2. p. 176. f. 3.

In Pyrenæis, Sibiria, & in Comitatu Nicaensi 24.

Radix candida. Caul. 1-2-cubit. Fol. 2-unc. longa, unam lata, linear. acuta, triquetra, canaliculata. Nectarii rima valde dentata. Petal. cinnabarina.

4. *Chalcedoni*-L. fol. sparsis, lanceolat. fl. reflexis; cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 20.*

L. rubrum &c. *Clus. hist.* 1. p. 131.

Henierocallis &c. *Lob. ic.* 169.

In Persia, Corniola &c. 24.

Odor fœrens. Caul. 2-spirham. torus foliosus. Fol. dense sparsa, fissil. erecto-patent. supra nuda, subtus multinervia. Fl. 1-pl. Cor. miniata, aurantiaca, purpuro-sanguinea &c.

5. *superbum*. L. fol. sparsis, lanceol. fl. ramoso-pyramidatis, reflexis: cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. 2. tab. 11. Catesb. car. 2. tab. 56.*

In Amer. Septentr. 24.

Caul. 2-ped. & ultra, teres, leviss. superne paniculat. Fol. constanter trinervia. Petal. magna, fundo aureo, limbo aurantiaco, punctis nigricant. adperso.

6. *japonicum*. L. fol. sparsis, lanceol. cor. subcampanul. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap. Kamph. am. exot. Fasc. V. pag. 871.*

In Japonia 24.

Caul. 2-ped. simpl. teres, glaber. Fol. alterna, petiol. sesquipalm. integerr. marginata, glabra, subtus pallida, 3-5-nerv. Fl. terminal. reflexo-cernui. Cor. palmar. albida. *Differt a L. albo* = fol. paucis in caule; petiolis longiss. remotis, nervosis; caule debiliore, 1-st.

7. *Martagon*. L. fol. verticillatis: reflexis: cor. revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 4. tab. 351. Knorr. del. 1. tab. T. 6. Camer. epit. 617.*

L. sylvestre. *Dod. pempt.* 201.

In Helvetia, Germania &c. 24.

Bulbus flavus. Caul. inferne pallide virens; superne punctis nigris adpersus, cubital. & ultra. Fl. nutantes, fœtidi. Petal. rufa, vel pallida, punctis nigris mixta.

8. *canadense*. L. fol. verticillat. fl. reflexis; cor. revolutis, campanulat. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 125.*

Morif. hist. 3. f. 4. tab. 20. f. 9. Rudb. elyf. 2. p. 177. f. 3. Catesb. car. 3. tab. 11.

In Canada 24.

Fol. pollic. erecta, lanceol. trilineata. Cor. basi flava, punctis atris.

9. *camfschat-cenfe.* L. fol. verticillat. flore erecto: cor. campanulata: petal. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Canada, Camfschatca.

Rad. squamata. Caul. ped. l. simpl. lævis. Fol. 4-6. sessil. lanceol. Petal. parva, magnitudine *Lilii persici*, ovata, leviter striata, purpurea.

10. *philadelphicum.* L. fol. (superioribus) verticillat. fl. erectis; cor. campanulatis, petal. unguiculat. *Syst. veg. ed. 14. Catesb. car. 2. tab. 38.*

b. L. foliis &c. *Mill. ic. tab. 165. f. 1.*

In Canada 24.

Simillim. priori, sed eius petala ovata, sessil. huius unguibus oblongis, distinctis.

- pyrenaicum.* L. fol. lanceol. sparsis: fl. subumbellat. cor. revolutis. *Gouan. illustr.*

L. montanum, fl. punctato, maculis distincto. *Clus. hist.*

In Pyrenæis 24.

Differt a L. superbo, & canadensi. Odor plantæ gravis e Narcissino-hircinus. Bulbus flavesce. Caul. 2-pedal. Fol. conferta, erecta, adversa, satore virentia in margine exalbido, 7-folata. Fl. 1-2-3. Cor. flava, extus ad basin virefcens. intus punctis prominulis, e nigro-rubro-violaceo purpur.

496. FRITILLARIA. Cor. 6-petal. campanulata, supra unguet cavitate nectarifera. Stam. longitud. cor. Stigm. 3-fid. patens. Caps. 3-gona. Sem. plana.

1. *imperialis.* F. racemo comoso, inferne nudo: fol. integerrim. (nectar. hemisphærico). *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. K.*

Tulsi. *Clus. hist. 1. pag. 127. 128.*

In Persia?

Radicul. horizontales. Caul. 3-4-ped. in medio foliosus, superne coloratus. Fol. decurrentia. Bract. terminal. magnæ. Flos magnus, nutans. Petal. phœnic-rubent. basi nigricante. Cavitas nectarifera alba.

2. *regia.* F. racemo comoso, inferne nudo: fol. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Corona &c. *Dill. elth. tab. 93. f. 109.*

Ad cap. b. Spei 24.

Tuber pyramidatum. Scap. brevis. Fol. radical. in orbem posita, liliiformia, primum sature virent. Petal. herbacea.

3. *nana.* F. racemo comoso: fol. bifariis, amplexicaul. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei 24.

4. *persica.* F. racemo nudiuscul. fol. obliquis. *Syst. veg. ed. 14.*

L. persicum. Rudb. elst. 2. p. 183. f. 1.

L. fusium. Clus. hisp. 1. p. 130.

In Persia? Russia.

Caul. 2--ped. Fol. angusta, infima bina--terna--quaterna, verticillatim opposita.

5. *pyrenaica.* F. fol. infimis oppositis: fl. nonnullis folio interiectis. *Syst. veg. ed. 14. Clus. hisp. 2. p. 256. posth. 10.*

In Pyrenais, Russia 24.

Caul. pedal. Fol. glauca. Petal. parum reflexa, extus col. obsolete, ambitu venis flavescens, intus e viridi-flavescens. Splendentia.

6. *Meleagris.* F. fol. omnibus alternis: caul. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 32. Knorr. 1. tab. F. 2. Rencalm. Sp. tab. 146.*

In Italia, Helvetia, Carniola, Gallia, Austria &c. in pratis alpinum 24.

Caul. pedal. quandoq. maculat. teres, (in spontaneis sæpe 4-5-fl.). Fol. 5-6. graminea, angusta, semiamplexicaul. canaliculata. Flos magnus, Tulipæform. petal. 3. interioribus longior, variegatus, fusco-ruber, plerumq. maculis alternis, pallidiorib. subrotundis; quandoq. albus, vel atro-purpureus &c. *Var. purpurea in luteam mutata est.*

- longifolia.* F. *Hill. Hort. Kewen. tab. 15.*

Ad cap. b. Spei 24.

Fol. radicalia, pedal. lanceol. undulata. Caul. pedal. supra fl. foliosus. Petal. virenscent.

497. *UVULA-RIA.* Cor. 6-petal. erecta, hypocraterif. petal. lanceol. angustis. Nectarii fovea baseos petali. Filam. brevissima. Styl. semibifid. stigmatibus reflexis. Caps. oblong. Sem. subrotunda, compressa.

1. *amplexifolia.* U. fol. amplexicaulibus, mollibus: caule glabro. *Syst. veg. ed. 14.*

Smilax &c. *Barr. rar. tab.* 719. 720.

Polygonatum &c. *Bauh. hist.* 3. p. 531. *Morif. hist.* 3. f. 13. *tab.* 4. f. 11. *Clus. hist.* 1. p. 276.

Laurus alexandrina. *Cam. epit.* 936.

In Helvetia, Italia &c. sylvis montosis 24.

Rad. serpens. Caul. 2-cubit. ramosus, brachiatus.

Fol. distantia, alterna, sessil. Peduncul. florigeri foliar. 1-fl. geniculo flexo. Flos nutans, convergens. Cor. *Medeolæ asparagoidis*. Petal.

per ætatem reflexa, albida, basi rubra. Bacca ovato-triquetra, rubra.

2. *hirta*. U. caul. villosus: fol. amplexicaul. hirtis. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. erectus, ped. teres. Fol. 2-pollic. alterna, cordata, oblong-acum. 7-nervia, patentia, villosa, pilis breviss.

3. *perfoliata*. U. fol. perfoliatis. *Syst. veg. ed.* 14.

Polygonatum &c. *Morif. hist.* 3. f. 3. *tab.* 4. f. 12.

In Virginia, Canada.

Radix alba, pedis cervini formam referens. Caul. subpedal. Fl. pauci, flavescentes.

4. *sessilifolia*. U. fol. sessilibus, absque cirrhis. *Syst. veg. ed.* 14. *In Canada.*

Habitus prioris. Caul. ped. striato-angulat. glaber, ramis subsistigiatis, divaricato-erectis, 2-3-fid. 1-fl. Fol. pollicar. & ultra, lanceolovata, integerr. nervosa, glabra, alterna; at ubi flos ex altero ramo exit, fol. bina adstunt. Fl. terminal. peduncul. 1-2. cernui, albi.

5. *cirrhusa*. U. fol. sessil. apice cirrhosis. *Syst. veg. ed.* 14. *Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. erectus, simpl. teres, articul. striatus, glaber. Fol. ex eadem gemma 2. digital. linear. integra. glabra. E gemma fol. peduncul. cernui. Petal. subpollic. lutea.

498. GLORIOSA. Cor. 6-petal. undulata, reflexa. Styl. obliquus.

1. *superba*. G. fol. cirrhiferis. *Syst. veg. ed.* 14.

Methonica &c. *Herm. Lugd. tab.* 689. *Pluk. alm. tab.* 116. f. 3.

Lilium &c. *Comm. hort.* 1. *tab.* 35. *Rudb. clyf.* 2. p. 178. f. 7.

Mendon. *Hort. Mal.* 7. *tab.* 107. f. 57.

In Malabar 24.

Rad. rectangula, decumb. venenata. Caul. or-
gyal. teres, ramis 2. oppositis, laterilibus.
Caul. postquam ramos emittit, pedunculum e
singulis fol. alis exserit. Fol. alterna, at sub
ramis teria. Flos cernuus, figura Flammæ su-
pra crateres, spectatiss. coccineus, bali flavus,
demum totus coccin. Petal. flava, lanceol.
longa, lateribus undulata, coccin. prope basin
reflexa.

2. *simplex*. G. fol. acuminatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Senegal.

Fol. non cirrhosa, Fl. cœrul.

499. ERY-
THRONIUM. Cor. 6-petal. campanulata, petal. lanceolat. su-
pra medium reflexis. Nectario tuberculis 2. pe-
talor. alternorum, bali adnatis. Stam. mini-
ma. Stigm. 3-fid. Caps. subrotunda. Sem. ob-
longa.

1. *Dens Canis*, E. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 7. Jacq.*
Austr. 5. tab. 9. Knorr. del. 1. tab. H. 8.
Dod. pempt. 203.

*In Liguria, Allobrogibus, Augustæ Taurino-
rum, Sibiria, Virginia &c. ad sylvas umbrosas*
24.

Rad. carnosa, oblong-acumin. dentis canini for-
ma, alba. Scap. semiped. simplex, teres, nu-
dus, ruber, 1-fl. Fol. radical. bina (post ef-
florescentiam) elliptica, petiol. integerr. fus-
co-rubra, virid. maculis variegata. Petal. lan-
ceol. e medio reflexa, alternatim incumbent.
tuberculata, purpur. carnea, alba. *Vur. fl.*
pleno.

500. TULIPA. Cor. campanulata, basi late cava; petalis oblon-
go-cuspidatis, concavis. Stigma 3-angulare,
angulis divisis. Caps. 3-gona. Sem. plana.

1. *sylvestris*, T. fl. subnutante: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed.*
14. Fl. Dan. tab. 375.

b. T. minor. &c. *Rudb. elyf. tab. 112. f. 6.*

c. T. pumilio. 1. 2. 3. 4. 5. *Rudb. elyf. tab.*
109. f. 1. 5.

In Apenninis, Helvetia &c. 24.

Rad. bulbosa. Caul. pedal. teres, 1-fl. Fol. fe-
re ensiform. Petal. ovat-lanceol. acuta, 3. in-
terior. etiam basi villosa, flava, extus vire-
scent. aut ex luteo-purpur. vel oris candidis.
Differt a sequenti, caul. altiore: fol. angustio-

ribus: scapo versus fl. inflexo, & ante florescentiam nutante: sed praecipue flam. filamentis basi valde attenuatis, & supra basin hirsutis: petala minora; interiora margine hirsuta, & flos odoros.

2. *Gesneriana*. T. fl. erecto: fol. ovato-lanceol. S: fl. veg. ed. 14. Knorr, del. 1. tab. T. & T. 1. 2. 3.

In Cappadocia, & Russia 24.

Variet. 140. enumerat Park.

3. *Breyniana*. T. caul. multifi. polyphylo: fol. lineari-lanceolat. Syst. veg. ed. 14.

Silyrinchium &c. Breyn. cens. tab. 36. Rudb. elyf. p. 13. f. 11.

In Æthiopia 24.

Fol. caulina 6-7. alterna, suprema sensim breviora. Fl. 3-4. Petal. basi angustata, ex phoeniceo-suaverubent. Styl. nullus.

4. *biflora*. T. fl. erectis, planiuscul. caul. diphylo, 2-3-fl. fol. lineari-subulat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pallas it. 3. tab. D. fig. 3.

In Dauria 24.

Simil. T. sylvestri, sed minor. Bulbus turbinat.

Caul. digital. supra ipsam terram foliosus. Fol. caul. longiora, succulentiora, magisq. glanca T. sylvestri, alterna, patenti-incurva, canaliculata. Fl. ut in T. sylv. sed minores, odori. Petal. 3. exter. lanceol. extus dilute cyanæa, vel virescent. interior. alba cum nervo dorsali cyanæo; omnia intus basi macula magna fulva.

501. ALBU-CA. Cor. 6-petal. interioribus difformibus. Stam. 6. tribus castratis. Stigma cinctum cuspidibus tribus.

1. *maior*. A. fol. lanceolatis. Syst. veg. ed. 14.

Ornithogalum &c. Rudb. elyf. 2. p. 140. f. 7.

Morif. hist. 3. f. 4. tab. 24. f. 7.

Ad cap. b. Spei 24.

Scap. pedali. & ultra, rotund. glaber, subglaucus. Fol. radicalia, longa, lata, sulcata. Racemus longus. Fl. bracteati, luteo-virent.

2. *minor*. A. fol. subulatis. Syst. veg. ed. 14.

Ornithogalum &c. Herm. par. tab. 209.

Ad cap. b. Spei 24.

3. *spiralis*. A. fol. spiralibus: fl. nutantibus. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Caul. 1-2-fl.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 303

4. *viscosa*. A. fol. linear. villosa-viscosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei.
3. *abyssinica*. A. fol. linear. canaliculatis, glabris. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl. Jacq. ic. rar.
Ad cap. b. Spei.
302. HYPO-
XIS. Cor. 6-part. persistens, supera. Caps. basi an-
gustior. Cal. gluma 2-valv.
1. *erecta*. H. pilosa; capsul. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ornithogalum &c. Pet. gar. 1. tab. 1. f. 4. Pluk.
alm. tab. 250. f. 12.
In Virginia, Canada &c.
Fol. *Caricis*, seu *Junci pilosi*. Scap. fol. bre-
vior, erectus, herbaceus, angulosus, pilosus.
Bract. 2. subulatae, erectae, inter quas fl. 1-
2. sessil. longitudine bractear. Cor. lutea.
2. *decumbens*. H. pilosa; capsul. clavatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Anthericum &c. Mill. dict. tab. 39. f. 2.
Crocus &c. Plum. ic. 108. f. 17
In Amer. meridion. &c.
Caul. decumb. Fol. graminea. Pedunc. axill. lon-
giss. Fl. gemini. Bract. lanceol. pedicellat. lon-
giores. Cor. lutea.
3. *fascicularis*. H. tubis florum longiss. *Syst. veg. ed. 14.*
Allium &c. Ruffel. alep. tab. 2.
In Alepo &c.
Fl. multi, radical. albi, magni.
4. *sessilis*. H. pilosa, acaulis: fructificationibus subradical.
Syst. veg. ed. 14.
Ornithogali &c. Dill. elth. tab. 220. f. 287.
In Carolina.
Fol. longa, angusta, radicalia dodrantal. carina-
ta, dilute virent. vetustiora luteo-virent. tan-
dem xerampelina. Capitul. sessil. oblonga, ob-
tuse 3-gona. Fl. nudi. Petalor. laciniae 3. ex-
terior. latiores, virentes, hirsutae; 3. interior.
angustiores, glabrae, e viridi-lutescent. omnes
culpidatae.
5. *spicata*. H. erecta: fol. ensiform. falcatis, glabris: fl. spi-
catis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
In Japonia.
Rad. fibris fasciculat. Fol. radical. plurima, spi-
tham. scapo breviora, integerr. trinervia, gla-
bra. Scap. ped. erectus, flexuosus, subangu-
lat. villosus. Fl. e medio scapo ad apicem spi-
cati, alterni, remoti, plurimi.

6. *plicata*. H. scap. 1-fl. triquetro: fol. lanceol. plicatis, villosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Bulbus globosus. Fol. ensiform. subciliata, basi, carina, & margine denticul. Cor. flava, extus virescens.
7. *stellata*. H. est *Amaryllis capensis* monente Vahl.
8. *minuta*. H. fol. triquetris, carnosis, glabris: scapis 2-fid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Planta pusilla. Bulbus conicus, ratione plantæ magnus, subtus truncatus, & marginatus, apice squamis linear. connivent. Fol. radicalia, linear. acuta, subcarnosa, scapis longiora, digital. Scap. pl. breviss. teretiuscul. Cor. patens, nivea.
9. *aquatica*. H. fol. linear. scap. umbelliferis, c. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Fol. radicalia, laxa, apice nutantia. Scapi filiform. Fl. in aliis solitar. hermaphrod., in aliis umbellati, mares.
10. *ferrata*. H. fol. canaliculat. glabris, ciliato-ferratis: scap. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
11. *ovata*. H. fol. ovat-lanceol. integris, glabris: scap. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Flos pulchellus, albus.
12. *villosa*. H. fol. lineari-ensiform. villosis: stigmate simplicis, 3-gon. acuto, *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Variat magnitudine.
13. *alba*. H. fol. teretibus, glabris: scap. sub 2-fid. petal. immaculat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Planta parvula.
-
- violacea*. H. fl. violaceis. *Forsk. Æg.*
In Arabia.
 Caul. digiti longitudine. Fl. racemosi, nudi. Pedunc. semipollic. bracteol. squamiform. suffulti.

503. EHR- Cor. infera, glumacea, duplex. Nectar. pateri-
HARTA. forme.

1. *capensis*, E. Thumb. *Ad. Stock.* 1779. *tab.* 8.

In Africa.

Germen omnium pulcherrimum, glabrum. Rad. fi-
brofa. Culm. erectus, fefqui-2-ped. arti-
culat. indivifus. Fol. enfiform. vaginant. mar-
ginata, crifpa; inferior. palmar. difco glabro,
margine fcapro, cartilagineo-crenulado. Pan-
icul. fimpl. oblong. 15-20-fl. Fl. cernui. Glu-
ma calycina bafi colorata; exterior violac. in-
terior pallescens. Paficuli villorum albiffimi,
nitidi. Nectar. & filam. albida. Anth. luteæ.

504. ORNI- Braëtæ loco calyc. Cor. 6-petal. erecta, perf-
THOGALUM. flens, fupra medium patens. Filam. alterna,
bafi dilatata, fæpe tricuspidata.

* *Staminibus omnibus fubulatis.*

1. *uniflorum*. O. fcapo 2-phyll. pedunculo 1-fl. *Syft. veg. ed.*
14. *Ad. nov. Petrop.* v. XVIII. *tab.* 6. f. 3.

In Sibiriæ montibus.

Simil. O. luteo, fed peduncul. indivifus, 1-fl.
Flos dimidio minor *Tulipæ fylv.* fed triplo
maior O. luteo. Petal. lanceol. obtufiufc. lu-
tea, fubtus virid. Fol. caulis 2. altero fup-
eriore, O. lutei duplo maiora.

2. *luteum*. O. fcapo angulofa, 2-phyll. peduncul. umbella-
tis, fimplicibus. *Syft. veg. ed.* 14. *Fl. Dan.*
tab. 378. *Garid. Atx. tab.* 74.

Pyrrochiton. Renealm. fp. tab. 90.

In Europæ cultis, & collibus aridis 24.

Bulbus rotund. Fol. radicalia, pauciff. graminea,
acuta. Braët. 2. umbella longiores. Pedunc.
longi, inæqual. 7. Petal. lineata, intus cum
virore lutea; extus tota virid. obtufa, plerumq.
glabra. *Varietas ma. & minor.*

3. *minimum*. O. fcap. angulato, 2-phyll; peduncul. umbel-
lat. ramolis. *Syft. veg. ed.* 14. *Fl. Dan. tab.*
612. *Bauh. hift.* 2. p. 624.

Hypoxis Renealm. fp. 92.

b. O. *bulbiferum* &c. *Colum. ecphr.* 323. 324.

In Europæ cultis oleraceis.

Simil. priorî, fed petal. acutiora, & dimidio cir-
citer min. unde potius *varietas.*

4. *pyrenaicum*, O. racemo longiff. filament. lanceol. peduncul.
Tom, II. V.

florifer. patentibus, æqualibus: fructiferis scapo adproximat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 103. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 3.*

Stadyoides. Renealm. sp. tab. 90.

In alpinis Austria, Sibiria &c. etiam ad colles descendit 24.

Caul. fere 3 ped. nudus, teres. Fol. 3-4. subpedal. ad terram reflexa, canalicul. & flavesc. Stipul. solitar. albæ. Fl. paruli, subodori. Petal. pallent. linea longitudinali subvirent. quandoq. oris albis; 3. exter. angustior. 3. inter. breviora.

5. *narbonense*. O. racemo oblong. filament. lanceol. membranac. peduncul. floribusq. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Dod. pempt. 222.*

In Italia, Gallia &c. arvis 24.

An varietas prioris? sed minus. Fol. sesquiped. pollicem lata: in priore vix palmar. angustiss. Bract. ovato-lanceol. breviss. Petal. candida, subrus virid. margine albo.

6. *latifolium*. O. racemo longiss. fol. lanceol.-ensiform. *Syst. veg. ed. 14. Conf. Suppl. p. 200.*

In Arabia, Aegypto.

Scapus sesquiped. teres, virid. Fol. pedal. plusquam 2. pollic. lata. Petal. lanceol.-patent. utrimq. alba.

7. *longifraga-æatum*. O. racemo longiss. bracteis pedunculis fere duplo longioribus: fol. lanceolat.-ensiform. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. horti. 3. tab. 29.*

Ad. cap. b. Spei 24.

Differt ab O. pyramidalis bracteis, & fol. latioribus.

8. *comosum*. O. racemo breviss. bract. lanceolat. longitudine fl. petal. obtusis; filament. subulatis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 135. f. 1.*

Habitat

Petala lactea.

9. *pyramidale*. O. racemo conico: fl. numerosis, adscendentibus. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. elys. 2. p. 134. f. 4. Besl. cyfl. vern. 5. tab. 14. f. 2.*

In collibus Lusitania 24.

*** Staminibus alternis, emarginatis.*

10. *arabicum*. O. fl. corymbosis: pedunc. scapo humilioribus: filament. subemargin. *Syst. veg. ed. 14. Rudb.*

elys. 2. p. 130. f. 1. *Clus. hist.* 2. p. 186. *Best.*

cyfl. vern. 5. tab. 12. f. 1.

Melenomphale. Renealm. sp. tab. 90.

In Ægypto, & ad cap. b. Spei 24.

Planta pedal-cubit. gracilis. Fol. *Hyacinthi orient.*

Petal. alba, odora. Nectar. 3-angul. splendens, nigrum, dein viride. Bract. amplexicaul. cordatæ, magnæ. Stam. connata.

11. *thyrsoides.* O. fl. racemosis, confertissim. filament. emarginat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. hort.* 3. tab. 28.

Ad promontorium b. Spei.

Simile priori, sed differt in pl. Planta glabra.

Bulbus albidus. Fol. plura, elongato-lanceol.

acuta, lineata, crassula, debilia. Scapus suberectus, pedal. rore glauco tectus. Racemus

terminal. semiped. densus, thyrsifor. Bract. ad

pedunculos lanceol. aridæ, membranac. Petal.

patula, nivea, cum macula ad basin ex flavo-fuscente, odora. Filam. ochroleuca.

12. *umbellatum.* O. fl. corymbosis: peduncul. scapo altioribus:

filamen. basi dilatatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq.*

Austr. 4. tab. 34.

Bulbus leucanthemos &c. Dod. hist. 221.

Eliocarnos. Renealm. sp. tab. 87.

In Germania, Gallia &c. ad vias, & secus agros

24.

Fol. radical. sub 9. In caul. dodrantali stipul.

maximæ, albæ. Fol. pauca, linear. carinata.

Spatha sub quolibet pedunc. Petal. intus alba,

extus virent. cum limbo albo.

13. *nutans.* O. fl. secundis, pendulis: nectar. stamineo campanifor. *Syst. veg. ed.* *Jacq. Austr.* 4. tab. 301.

Rudb. elys. 1. p. 137. f. 12. *Clus. app.* 2. p.

9. tab. 9.

In Italia, Helvetia, Germania 24.

Caul. apbyll. Fol. pedal. linear. carinata, acumine obtuso, supra læte, subtus cinereo-virent.

Racemus 5-20-fl. Bract. longa, membranaceo-fusca. Petala e viridi-albent.

14. *capense.* O. fol. cordatis, ovatis. *Syst. veg. ed.* 14. *Comm.*

hort. 2. tab. 88.

Ornithogalo &c. Breyn. cens. tab. 41. *Rudb. elys.*

1. p. 138. f. 14.

Ad cap. b. Spei 24.

Radix magna, tuberosa. Fol. radical. 2. longe

V ij

- petiol. lata, nervosa, *Plantagini roseæ* simil.
Scap. sesquiped. rotundus, in cuius medio pedunc. longi, alterni. Petal. primum virid. dein alba. Stam. connexa in cylindrum.
15. *crenulatum*. O. fol. oblong. obrutis, ciliatis: fl. racemosis, erectis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
O. *unifolium*. *Reiz. Obs. fasc. 2. (monente Vahl.)*
Ad cap. b. Spei h.
Bulbus ovatus, magnitudine *Avellanæ*. Racemus paucifl. Fl. alterni, peduncul. bracteati. Cor. patentiss. Petal. lanceol. obtusa, flavescent.
16. *rupestre*. O. fol. filiform. carnosus: scap. paucifl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
17. *ciliatum*. O. fol. ovatis, acutis, ciliatis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
18. *altissimum*. O. fol. oblong. acutis, glabris: racemo 4-ped. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
19. *pilosum*. O. fol. linearis-erisiform. ciliatis: fl. racemosis; peduncul incurvis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
20. *bulbiferum*. O. bulbis axilar. caul. polyphyll. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Pol. ii. 2. tab. Q.*
Ad mare Cassium l.
Fl. & statura simile *O. minuto*. Bulbus mole *Pisi*. Fl. rad. cal. plura, linear. subcarinata. Scap. unicus, fol. longior, 1-fl. Petal. exter. virid. margine flavo, interior. nervo virescente. Circa scapum inferius multa nascuntur fol. basi bulbosa.
21. *circinnatum*. O. hirsutie canescens: fol. linear. recurvat. canalicul. radicali foliatis, caulinis 3. caul. 3-4-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
O. *reticulatum*. *Pall. ii. 3. tab. D. f. 2.*
In Dauria.
Simil. *O. minimo*, sed diffindum. Tota planta, fl. excepto, hirsutie minima canescente tecta.
Bulbus tunicis fibroso-reticulat. vagina cylindrica, laxa. Fol. radicale lineare, crassiuscul. circinnato-contortum. Scap. foliis dimidio brevior, umbellatus. Involuc. 3-phyll. lacin. linear. attenuatis, & circinnatis. Fl. terni, raro pl. O. luteo ma. Petal. 5. exter. ma. acumin.

virid. margine flavo; interior. teneriora, flava, nervo lato, viridi.

12. japonicum. O. racemo spicato, cylindrico, longiss. Scap. striato. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap. Kui-Simira. Kam. am. exot. Fusc. V. p. 872. In Japonia 24.*

Bulbus nucis Avellanæ paulo ma. conicus, albus. Fol. radicalia, scapo breviora, digital. erecta. linear. plana, glabra. Scap. erectus, petal. & ultra, teres, glaber. Fl. erecti, in racemo digital. & ultra, bracteati. Peral. lineam longa, patent. purpureo-cœrul.

- flavum. O. fol. linear. plano-complicatis: fl. racemosis, flavis. *Forsk. Æg.*

In Arabia 24.

305. SCILLA. Bractææ loco calycis. Cor. 6-petal. patens, decidua. Filam. filifor. non lata.

1. maritima. S. nudiflora, bract. refractis (lineari-lanceol.). *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 591.*

S. hispanica. Clus. hist. 1. p. 171.

b. S. rad. alba. Seb. mus. 1. tab. 44. f. 4. 3. Maith.

Ad Hispaniæ, Siciliæ &c. litora arenosa 24.

Radix maxima, bulbosa, tunicata, rubra, vel alba. Fol. lanceol. stricta. Scap. ante fol. longiss. multifi. Fl. albi.

2. Lilio-hyalanthus. S. radice squamata. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pyrenæis, Hispania &c. 24.

Rad. & fol. Liliæ. Cor. cœrul.

3. italica. S. racemo conico, oblongo. *Syst. veg. ed. 14.*

Hyacinthus stellatus &c. Besl. cysl. vern. 42. f. 1. Clus. hist. 1. p. 184.

In locis lapidosis, & umbrosis Comitatus Nicæensis 24.

Bulbi congesti, tunicati. Scap. pedat. Fol. latiora. Racemus pedicellis erectiuscul. Bract. 2. subul. longitudine pedicell. Flos patens, petal. lateribus reflexis, apice obtusis, albis, aut cœrul.

4. peruviana. S. corymb. conico, conferto. *Syst. veg. ed. 14.*

Hyacinthus &c. Rudb. elys. 1. p. 37. f. 1.

Hyacinthi stellatus peruvianus. Clus. hist. 1. p. 182.

Eriophorus peruvian. Clus. hist. 1. p. 173.

In Lusitania, V ii)

- Radix tunicata, lanuginosa. Scap. semiped. teres;
Cor. saturo purpur. senescentes recurvatæ.
5. *amœna*. S. fl. lateral. alternis, subnutantibus: scapo angulato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 3. tab. 218.*
Hyacinthus &c. *Rudb. elyf. 2. tab. 7. Best. cyst. vern. 43. f. 2.*
In Austria, Russia &c. 24.
Scapi pl. in planta culta; sub 3-fl. Fol. sub 4. scapo subæqualia, pedal. lata, mollia. Petal. decidua, cœrul. basi lincol. 2. albis. Germen flavum.
6. *bifolia*. S. fl. erectiuscul. paucioribus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 568. Austr. 2. tab. 117.*
Hyacinthus stellatus &c. *Bauh. hist. 2. p. 679. Fuchf. hist. 837.*
In Gallia, Germania &c. 24.
Bulbus pyriform. squamosus. Scap. 3-8-unc. superne purpurasc. Fol. 2. radical. carinata, basi flava, quandoq. terna, saturo virent. mollia. Fl. sæpe 4. Petal. alterna, cœrul. ovalia, ruberculis terminata. *Var. cor. carnea, exalbida, alba: = spica brevior, multist. stipul. peduncul. & fl. cœrulescent. petal. obusis.*
7. *lusitanica*. S. racemo conico, oblongo: petal. lineatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus &c. *Rudb. elyf. 2. p. 34. f. 4.*
In Lusitania 24.
Simil. *S. amœna*. Scap. teres. Fl. distantes. Petal. elliptica, obtusiusc. patent. cœrul. Stam. petalis paulo breviora. Anth. flavæ.
8. *hyacinthoides*. S. racemo longiss. fl. subverticillat. pedunc. patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Bulbus *eriphorus* or. *Bauh. pin. 47. & antiquorum. Habitat . . .*
Bulbilli ad bulbum principem multi. Scap. 3-ped. a medio fere ad apicem florens. Fol. plana, semiped. longiora. Pedicelli sparsi, filiform. fl. triplo longiores; cœrul. Cor. minima, e violac.-cœrulesc.
9. *autumnalis*. S. fol. filiform. linear. fl. corymbosis; peduncul. nudis, adscendentibus, longitudine fl. *Syst. veg. ed. 14.*
Hyacinthus &c. *Clus. 1. p. 185.*
Ornithogalum &c. *Garid. Aix. tab. 73.*
In Hispania, Gallia, Italia, solo glareoso 24.

Radix tunicata. Scap. palmar. teretiusc. racem-
sus. Fol. compressa. Cor. magnitudine *Pist.*,
dilute purpur.

10. *unifolia*. S. fol. teretiuscul. latere subspicato. *Syst. veg.*
ed. 14.

Bulbus &c. *Bauh. hist. 2. p. 622.*

In Lusitania.

Bulb. orbicular. fuscus, nucus Avellanæ magni-
tudine. Scap. 3-unc. Fol. angustum. Fl. 3.
nivei, odori, limil. fl. *Parnassie palus. Var.*
fol. & scapis binis.

11. *tetraphyl-* S. acaul. fol. quaternis, ovat-lanceol. *Syst. veg.*
la. *ed. 14. Lin. Suppl.*

In Africa.

Rad. bulbosa. Fol. sessil. patent. nervosa, lævia.
Fl. fol. dimidio breviores, peduncul. copiosi.
Petal. lanceol. margine membranac.

1. *japonica*. S. fl. umbella terminali, fastigiata. *Syst. veg. ed.*
14. Thumb. Jap.

In Japonia.

Scap. erectus, palmar. simplex, glaber. Bract.
in scapo, & sub fl. unguicular. membranac.
Petal. unguicul. patent. albo-purpur. Fol. num-
quam visa sunt in planta florente.

306. CYA- Cor. 6-petala; petal. 3. inferioribus propenden-
NELLA. tibus. Stam. infimum declinatum, longius.

1. *lutea*. C. fol. ensiform. ramis erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Convenit cum sequenti, filament. basi in urceolum
natis: anth. una maiore: stigmate simpl. Differt
ab illa, fol. radical. lanceol. nec linear. pedun-
cul. minus divaricat. petal. ma. luteis.

2. *capensis*. C. fol. undulatis; ramis patentiss. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl. Jacq. hort. 3. tab. 35.

Ad cap. b. Spei.

Statura Scilla. Bulbus subrotund. depressus, for-
tidus. Caul. incrassatus, ad telluris superficiem
ramis diffusis. Fol. radical. pauca, basi vagi-
nant, longe lanceol. acumin. glabra, integerr.
supra striata: caulina sessil. lineari-lanc. Fl.
racemosi. Petal. oval. obtusiusc. patentiss. con-
cava, cum quadam purpura cœrulesc. Stam.
petalum ringens mentiuntur.

312. **HEXANDRIA MONOGYNIA.**

3. *alba*. C. fol. lineari-filiformibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
507. ASPHO-DELUS. Cor. 6-petal. stellata, petalis basi conglutinatis.
 Nectar. ex valvulis 6. germen tegentibus.
 Stigm. capitatum. Caps. carnosa, subrotunda, triloba.
1. *luteus*. A. caul. folioso: fol. triquetris, striatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Hort. 1. tab. 77. Black. tab. 23.*
In Sicilia &c.
 Rad. tubercul. Caul. 3-ped. nitidus. Fol. radical. multa, fistulosa, subulata, glauco-virent. caulina vaginosa. Spica densa. Bract. membranac. mascululæ, albæ. Cor. lutea, extus linea viridi. Petal. alternæ, quæ in fl. adhuc dum clauso exteriora fuerunt, sunt duplo reliquis angustiora. Ex his infimum magis distat a proximis lateralibus, quam distant reliqua ab invicem. Stain. declinata, quorum 3. breviora.
2. *ramosus*. A. caul. nudo: fol. ensiform. carinatis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Nov. Comm. Gott. 1776. tab. 7. Black. tab. 238.*
 Asphodelus. *Clus. hist. 1. p. 197.*
 Asfodelo. *Mauh.*
In Europæ collibus apricis &c.
 Radix tuberculosa. Caul. tortilis. Fl. spicati. Petal. alba.
3. *fistulosus*. A. caule nudo: fol. strictis, subulat. striatis, subfistulosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. phyt. tab. 311. f. 1.*
 A. minor. *Clus. hist. 1. p. 197.*
In Gull.-provincia, Hispania, Creta, & Liguria montibus &c.
 Scapi cubital. ramosi. Petal. ovalia, albida.
-
- liburnicus*. A. fol. setaceis. *Scop. Fl. Carn. tab. 12.*
In Carniola.
 Caul. pedal. teres. Fol. basin caulis occupantia, uncial. & ultra, subtriquetra. Fl. uncial. penduli, laxi, lutei, 5. lineis fuscescent. striati.
508. ANTHERICUM. Cor. 6-petala, patens. Caps. ovata.
 * *Fol. canaliculata.*
1. *scrobinum*. A. fol. planiuscul. scapo 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 5. tab. 38.*

Bulbocodium &c. *Raii. Angl.* 3. p. 374. tab. 17. f. 1.

Narcissus autumnal. &c. *Bauh. hist.* 2. p. 662.

Pseudo-Narcissus &c. *Rudb. elys.* 2. p. 64. f. 9.

In alpinis Helvetiæ, Angliæ &c. 24.

Rad. oblong. alba, obducta squamis ramentaceis.

Scap. 4-unc. & paulo ultra. Fol. radical. multa, graminea, linear. gracilia, primum teretia, dein planiuscula: caulina 3-4. alterna, breviora, vaginant. lanceol. minuta, absque spatula. Flos resp. ÷ive magnus, inferus. Petal. ovat-lanceol. alba, lineis rufis, unguibus luteis. Filam. non lanata.

2. *gracum.* A. fol. planis: scapo simplici: fl. corymbosis; filamentis lanatis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Oriente 24.

Bulbus. Fol. linear. glabra, longitudine fere scapi. Scapus fol. 3-4. brevioribus. Corymb. terminal. sub 5-fl. peduncul. intermedio 1-fl. lateralibus 2-fl. Cor. alba, A. *ramosi.* Stam. & styl. cor. brevior.

3. *planifolium.* A. fol. planis: scapo, filamentisq. lanatis. *Syst. veg. ed.* 14.

In Lusitania 24.

Statura A. *graci*, sed fl. min. Filam. non lanata.

Rad. oblong. crassa, flavescens. Fol. radical. linear. striata, subcarinata, apice involuto-subulata. Scap. ramosus, bracteis lanceolat. Peduncul. subracemosus. Fl. rubri, magnitudinis A. *ramosi.*

4. *revolutum.* A. fol. trigonis, scabris: scapo ramoso: cor. revolutis. *Syst. veg. ed.* 14.

Phalangium &c. *Comm. hort.* 1. tab. 34.

In Æthiopia 24.

Rad. fascicular. *Hemanthi punice.* Fol. radical. numerosa, scapo triplo breviora, subulata, striata, patent. Scap. 4-ped. subnudus, obliquus, bracteis 5. adpressis, subulatis. Corymb. terminal. compressus, ramis 6. longis, alternis. Fl. 1-2-3. alterni. Petal. lanceol-ovata, obtusa, alba, extus ad apicem viridi-fusca.

5. *ramosum.* A. fol. planis: scapo (saepe) ramoso: cor. planis: pilis. recto. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Austr.* tab. 161.

- Phalangium, *Lob. ic. 47. Ad. Bernens. 1766. tab. 6.*
In Europæ australioris rupibus calcareis 24.
- Scapus 3-ped. teres, nudus, superne paniculat. glaucus. Fol. ensiform. carinata. Stipul. subaxillar. breviss. Panicula rara, sparsa. Petal. stelliform. alba, extus media linea fusco-virid. Caps. subrotund.
6. *Liliago.* A. (fol. radical. carinatis): scapo simpliciss. cor. planis; pistill. declinato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. tab. 83. Fl. Dan. tab. 616.*
 Phalangium &c. *Morif. hist. 3. f. 4. tab. 1. f. 10.*
Liliago Cordi. Lob. ic. p. 48.
In Helvetia, Germania &c. 24.
Differt a priore. Planta ætate cespitosa. Caul. cubit. simpl. vel ramosus. Fol. ensiformi-linear. acuta: caulinum unum, vel alterum. Racemus rarus, 10-fl. Fl. magni, albi.
7. *Liliastrum.* A. fol. planis: scapo simpliciss. cor. campanulat. stamin. declinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Phalangium. *Dalech. hist. 852.*
In alpebus Helveticis, Allobrogicis 24.
Ad Hemerocallem spectat. Rad. fasciculata, fibris carnosiss. Scap. pedal-cubital. Fol. prælonga, graminea, mollia. Stipul. ovat-lanceol. coloratæ. Spica rarior, unilateral. Flos sensim dilatatus, calyce instructus. Petal. *Lilii candidi*, acumine reflexo, cum puncto viridi, odora.
8. *spirale.* A. scapo spirali. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad. cap. b. Spei, locis glaucosis 24.
Planta aphylla. Folior. rudimenta inferne scapum tegentia. Rad. bulbosa. Scap. palmar. filiform. sub 4-fl. Bract. minutæ, ovatæ. Fl. 3-4. minimi, magnitudine *Polygoni avicular.* ex apice caulis.
- ** *Fol. carnosiss.*
9. *frutescens.* A. fol. carnosiss, teretibus: caul. fruticoso. *Syst. veg. ed. 14.*
 Phalangium &c. *Dill. elik. tab. 231. f. 298.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Caul. pedal. & ultra, ramis alternis. Fol. pedal. & ultra, alterna, vaginant. Fl. longe spicati. Bract. magnæ, ovat. membranac. Petala flava, linea viridi.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 313

10. *alooides*. A. fol. carnosis, subulatis, planiuscul. *Syst. veg. ed. 14.*

Phalangium &c. *Dill. elsh. tab. 232. f. 300.*

Ad cap. b. Spei 24.

Fol. radical. fasciculata, brevia, lata. Pedunc. longi, divergent. Fl. spicati. Petal. saturæ flava, lineæ viridi.

11. *asphodelo-* A. fol. carnosis. subulat. femiteret. strictis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 181.*

ides.

In Æthiopia 24.

Scapus pedal. Fol. numerosa, vix striata, margine aspera, dorso versus alterum latus gibbiflora. Racem. simpl. longus, rarus. Fl. odore corticis Citri. Petal. lutæ cum lineæ viridi.

12. *annuum*. A. fol. carnosis, subulat. teretiuscul. scapo subracemoso. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia ☉.

Differt a priore, cui simile, in eo quod sit annuum; caule, & fol. tenerioribus.

13. *hispidum*. A. fol. carnosis, compressis, hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Asphodelus &c. Mill. dict. tab. 36?

Ad cap. b. Spei 24.

Rad. fibrosa. Fol. semipedal. recurvata, striata. Scap. simpl. hispidus. Racemus bract. lanceolat. hispidis. Petal. alba, carina viridi. Anth. lutæ.

*** *Fol. ensiformibus.*

14. *officragum*. A. fol. ensiformibus: filament. lanatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 42. Gmel. Sib. 1. tab. 18. f. 2.*

Narthecium, E. N. C. 1742. tab. 3. f. 1.

Asphodelus luteus &c. Dod. pempt. 208.

In Europæ borealis uliginosis 24.

Caul. foliosus. Spica laxa. Petal. lutea.

15. *calyculatum*. A. fol. ensiformibus: perianth. trilobis: filam. glabris: fl. trigynis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 36. Gmel. Sib. 1. tab. 18. f. 2. Fl. Lapp. tab. 10. f. 3.*

Phalangium &c. Segu. ver. 2. tab. 14.

In alpidus Helvetiæ, Lapponiæ &c. 24.

Pertinet ad Scheuchzeriæ genus, cum flos sit calve. donatus. Rad. cespitosa. Scap. pedal. simplic. quandoq. intorti. Fol. radical. linear. lævia,

- parum striata, quandoq. in caul. unicum. Fl. 1-2-3. peduncul. floriferis patentibus; fructifer. erectis. Cor. flavescentes, vel alba. Anth. coerul.
16. *japonicum*. A. fol. ensiform. convolutis, glabris: scapo ramoso, angulato: fl. racemosis, cernuis. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.
- In Japonia.
- Fol. radical. ped. erecta, canalicul. integerr. coriacea, glabra. Scap. longitud. folior. erectus, flexuosus, bracteatus, glaber. Fl. albi, decidui.
- In sequentibus divisiones ordinis servari non possunt.
17. *flexifolium*. A. fol. subulat. flexuosus, glabris; caule ramoso. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
18. *muricatum*. A. fol. carnosus, compressis, striatis, muricatis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
- Fol. longa, scabrerr. Scap. 2-pedal. basi hirsutus, dein ramosus.
19. *latifolium*. A. fol. carnosus, lato-ensiform. glabris: racemo longiss. caule simpl. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
20. *cauda felis*. A. fol. canaliculato-ensiform. scapo simpl. racemo oblongo. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
21. *triquetrum*. A. fol. filiform. triquetris, scapo simpl. brevioribus: racemo ovato: Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
22. *ciliatum*. A. fol. ensiform. carnosus-subtriquetris, ciliatis: scapo simpl. racemo longiss. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
- Fol. longissima.
23. *falcatum*. A. fol. carnosus, ensiform. falcatis, glabris: caule ramoso, racemoso. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.
- Fol. terræ adpressa, depressa.
24. *contortum*. A. fol. planis, ensiform. caule ramoso: fl. remotiss. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
- Ad cap. b. Spei.

25. *scabrum*. A. fol. triquetris, ferrulatis: caule ramofo, scabro; peduncul. fructiferis recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

26. *squamum*. A. scapo squamis membranac. tumidis imbricato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei 4.

Rad. tuberota-pendula. Fol. radical. 3. graminea, palmar. in quibusdam transverse plicata. Scap. brevis, pollic. Racem. terminal. e paleis scariosis, hyalnis, acutiss. Cor. infundibulif. extus subpubescens. Caps. globosa, cernua. *Var. fol. hirsutis, & glabris. Planta media inter Hyacinthos, Ornithogala, & Antherica.*

- aphyllum*. A. rad. bulbosa. *Forsk. Æg.*

In Arabia 24.

Rad. bulbis 6-7. pugni magnitudine. Fol. nulla.

- asphodelum*. A. fol. carnosis, teretibus: caps. 3-locul. 2-sperm. *Forsk. Suppl. Æg.*

In Arabia.

509. LEON-
TICE. Cor. 6-petal. Nectar. 6-phyll. unguibus cor. infidens, limbo patent. Cal. 6-phyll. deciduus. Caps. inflata.

1. *Chrysogonum*. L. fol. pinnatis: petiol. comm. simpl. *Syst. veg. ed. 14.*

Leontopetalo &c. Moris. hist. 3. f. 4. tab. 5. f. 3.

Inter Græciæ segetes 24.

Magnitudo sequent. Rad. tuberosa. Caul. ad terram repandi, ramofo. Fol. decussata, apice latiora, divisura fol. Quercus, atro-virent. Fl. dense spicati, lutei.

2. *Leontopetalum*. L. fol. decomposit. petiol. comm. 3-fido. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 3. tab. 15. f. 6.*

In Apulia, Creta, Sicilia 24.

Rad. tuberosa, rotunda. Caul. ramofus, cum lineis pallide purpur. Foliol. circinnatæ fere rotunditatis, glauco-flavefc. Fl. spicati, peduncul. lutei.

3. *Thaliæroides*. L. fol. caulino triternato; florali biternato. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia 24.

Modus crescendi Epimedii. Caul. ped. nudus, terminatus fol. 3. patentiss. petiolat. Petiol. singulus 3-fid. foliol. lateralibus 2. sessil. bilobis; intermedium petiolat. 3-lobum. Racem. simpl. cum 2. lateralibus. Petal. minima, herb. Bacca globosa, coerul.

4. *Leontopetal. fol. simplic. 3-partito-multifid. cor. monopetal. calyculata. Syst. veg. ed. 14. Ad. petrop. tab. 113.*

In India.

Rad. rubrofa, subrotun. extus ciner. intus alba. Scapi plerumq. 4. simpl. cinerei, striis nigricant. in quorum apice fol. ampla, tenuia, late virid. in cæteris duobus fl. multi, in umbellam dense congesti, lutei. Capf. angulata.

incerta.

L. Pallas it. 3. tab. V. f. 2.

In Dauuria 24.

Habitus Leontices, sed fl. visi non fuerunt. Planta mollis, succulenta. Radix tuberosa. Fol. ternata: foliol. vel lateral. 2-lobis, medio 3-lobo: vel lateral. inæqualibus, 4-lobis, terminali 3-part. intermedia parte 3-fida; lateralibus sub-2-fid. Peduncul. circa caulem vaginant. Racem. simpl. pauciss. bractea ad pedunculos singulos amplexicaul. reniformi. Fruct. vesicarii, maximi, extimo inflati, subtus magis ventricosi, & quasi recurvi, toti membranacei, pallidi, vel rubicundi.

510. *POLLIA.* Cor. 6-petal. petal. 3. exterioribus ma. concavis; 3. interioribus inflexis. Bacca polysperma.

1. *japonica.* P. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. erectus. 2-ped. parum ramosus, angulatus, articulatus, villosus-asperatus. Rami breves, alterni. Fol. infimo cauli adproximata; in supremo valde remota, pedalia, (superioribus brevioribus), pollic. latiora, alterna, amplexicaul. ensiform. integerr. longitudinaliter nervosa, patula, subtus albida. Fl. verticillatocorymb. Bractea sub singulo pedunc. alba. Bacca immatura alba, matura coerul.

511. *ASPAGERAGUS.* Cal. o. Cor. 6-petal. erecta, campaniform. petalis 3. interioribus apice reflexis. Bacca 3-locul. 6-sperm.

1. *officinalis*. A. caul. herbac. tereti, erecto: fol. setaceis; stipul. paribus. *Syst. veg. ed. 14. Luow. ed. tab. 78.*
b. A. alutis. Black. tab. 332. Knorr. del. 1. tab. S. 22. Cam. epit. 259.
In Europæ arenosis, pascuis, & sylvis cædis 24.
 Caul. paniculat. Stipul. exterior. solitar. & binæ interior. min. inter quas fol. terna, raro 4-5. Pedunc. gemini, laxi, 1-fl. penduli. Cor. campanul. ex rubro-virid. Bacca rubra, punctulis flavis variegata.
2. *declinatus*. A. caul. tereti, inermi; ramis declinatis: fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei.
Simil. priori, sed altior; fol. pl. duploque longioribus. Caul. annuus. Stipul. solitar. lanceol-subul. basi deorsum mucrone membranac. Fol. 7-10. filiform. patentia.
3. *falcatus*. A. aculeis solitar. reversis; ramis teretibus: fol. ensiform. falcatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Zeyl. tab. 13. f. 2.*
In Zeylona h.
 Caul. 2-ped. teres, ramosus, cinereus. Fol. ij-near. basi angusta, glabra, ex uno puncto multa, in ramulis alterna. Aculei parvi. Racem. axillar. simpl. breves.
4. *retrofractus*. A. aculeis solitar. ramis teretibus, reflexis, retrofractisq. fol. fasciculat. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. amalth. tab. 375. f. 3.*
In Africa h.
 Rami sursum, & deorsum alternatim flexi, teretes, dichotomi, dichotomiis verrucosis, aculeo minuto nutante. Fol. 30. & plura ex singulo puncto, ultimis ramis insidentia. Racemi axill. multifi. Spinæ stipul. deflexæ, ortæ ex stipul. pendulis, demum induratis in aculeos fragiles.
5. *æthiopicus*. A. aculeis solitar. reversis; ramis angulatis: fol. lanceol-linear. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap b. Spei 24.
Simil. A. falcato, sed fol. min. sub 7. nec 3. Stipul. emittunt spinam retro spectantem. Rami flexuosi, quasi fruticosi, virides.
6. *asiaticum*. A. aculeis solitar: caule erecto: ramis filiform.

fol. fasciculat. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 14. f. 4.*

In Asia.

Caul. & rami inermes, excepto aculeo ramo singulo subiecto. Fol. sub 14. ex singulo tuberculo.

7. *albus*. A. aculeis solitar. ramis angulatis, flexuosis: fol. fasciculat. triquetris, muticis, deciduis. *Syst. veg. ed. 14.*

Corduba 3. *Clus. 2. p. 178.*

In Lusitania, Hispania h.

Caul. albus. Spinæ rectæ, patentes, seu reflexæ. Ramuli bini, oppositi.

8. *acutifolius*. A. caul. inermi, angulato, fruticoso: fol. aciform. rigidul. perennantibus, mucronatis, æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Corruda prior. *Clus. hist. 2. p. 77.*

In Lusitan. Hispan. Oriente &c. h.

Simil. A. *aphyllo*, sed fol. sæpius septena, filo vix crassiora; cum illi sæpius terna, triplo crassiora, valdeq. subulata. Fol. punctulis subargent. prædita.

9. *horridus*. A. *aphyll.* fruticosus, 5-gonus, aculeis 4-gon. compressis, striatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania h.

Fol. vix ulla. Aculei longitudine digiti, solitar. remoti, alterni, lignosi, robusti.

10. *aphyllus*. A. caul. inermi, angulato, fruticoso: fol. subulat. striatis, inæqual. divergentibus. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. hort. 4. tab. 53.*

Corruda altera. *Clus. hist. 2. p. 178.*

In Sicilia, Hispan. Lusitan. h.

Spinæ 3-4. ad eundem exortum.

11. *capensis*. A. spinis quaternis; ramis aggregat. teretibus: fol. setaceis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 78. f. 3.*

Ad cap. b. Spei h.

Rad. tuberosa. Caul. fruticosi, filiform. flexuosi, rubicun. Spinæ acutiss. patentes, subrecurvæ. Ramuli ex axillis spicarum, inermes, decidui. Fol. inermia, brevia, in ramulis fasciculata, semiunguicul. Stipul. membranaceæ. Fl. peduncul. Cor. alba.

12. *sarmentifus*. A. fol. solitar. linearilanceol. caul. flexuoso; aculeis

aculeis recurvis (folitariis). *Syst. veg. ed. 14.*
Herm. Lugd. tab. 650. 73.

In Zeylona h.

Adfinis valde Medeolæ asparagoidi. Rad. tuberosa. Sarmenta longiss. in pl. alas divisa. Fol. præ cæteris speciebus longiora, latiora, robustiora. Fl. parvi, albi. Bacca rubra.

13. *verticillaris.* A. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 3. app. tab. 37.*

In Oriente.

Fol. Galii.

- stipularis.* A. stipulis basi mucronat. fol. simplic. subulat. mucronat. *Forsk. Æg.*

In Ægypto.

Caul. diffusus, ramosus, angulatus. Rami patent. angulati. Fol. pollic. conferta, solitar. raro ternata, angulata, patent. rigida, mucrone acuto, flavo, pellucido. Stipul. membranac. pellucidæ. Fl. breviter peduncul. bini, terni, utrimq. axillar. flavicant. Baccæ Juniperinæ, cœrul.

512. *DRA-CÆNA.* Cor. 6-part. erecta. Filam. medio subcrassiora. Bacca 3-locul. 3-sperm.

1. *Draco.* D. arborea; fol. subcarneis, apice spinoso. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 358.*

In India orient. h.

Arbor fol. *Yuccæ*: rami 8-9-cubit. nudi, qui in apice in alios ternos-quaternos ramulos cubit. dividuntur: in quorum apice fol. longa, unclata, pendula. Peduncul. geniculo instructi. Fructus racemosi, Cerasiform. flavescunt.

2. *ferrea.* D. arborea; fol. lanceol. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

In China h.

3. *striata.* D. frutesc. caulescens, erecta: caul. flexuoso: fol. lanceol. oblique falcatis, striatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

4. *terminalis.* D. herbac. caulescens. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Terminalis. Rumph. amb. 4. tab. 34.

In India h.

Fol. fere *Cannæ*. Racem. terminal. compositus. *Turn. II.*

322 **HEXANDRIA MONOGYNIA.**

- Pedice! . folitar. alterni , fl. breviores , cincti
ad basin gluma obtusa . *Arbor dura* .
5. *ensifolia* . D. herbac. subcaulesc. fol. ensiformibus . *Syst.*
veg. ed. 14.
Gladiolus &c. *Rumph. amb. 5. tab. 73.*
In India h.
Caul. ramofus , paniculat. Fol. petiol. enervia ,
fubtus carinata . Ad exortum ramorum foliol.
2. parva , colorata .
6. *undulata* . D. herbac. caulescens , erecta : fol. ovat. acutis ,
multinerviis : fl. axillar. pedunculat. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei .
7. *Medeoloides* . D. est *Medeola Asparagoides* monente Vahl.
8. *erecta* . D. herbac. caulescens , erecta : fol. fetiil. lan-
ceolat. fubulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei .
9. *volubilis* . D. herbac. volubil. fol. lanceolat. *Syst. veg. ed.*
14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei .
10. *graminifolia* . D. herbac. acaulis : fol. linearibus . *Syst. veg.*
ed. 14.
In Asia .
Statira Antherici phalangii . Fol. graminea , val-
de ftriata , fpirham. Scap. vix fol. longior .
Fl. ad fingulos dentes racemi 4-5. pedicellati .
513. **CONVALLARIA** . Cor. 6-fid. Bacca maculofa , 3-locul.

* *Cor. campanulatis .*

1. *maialis* . C. fcapo nudo . *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 70.*
Ludw. ed. tab. 87. Sabb. hort. 1. tab. Knorr.
del. 2. tab. C. 3. Fl. Dan. tab. 854.
Lilio convallio . Matth.
In Europa septentrion. fylvis 24 .
Fol. radical. plerumq. bina , vaginant. lato-lan-
ceol. vel ovata . Scap. dodrant. Fl. fpicati ,
unilateral. cernui . Cor. parva , globofa , api-
ce reflexo , alba , odora . *Var. duplex* . Bacca
rubra ,
2. *japonica* . C. fcap. nudo , ancipiti : racemo cernuo . *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Japonia 24 .
Variet. duplex, ma. & min. Fol. radical. plura ,
10. & ultra , linear. inferne attenuata , trigo-
na , inde plana , integerr. ftriata , recurva ,

2-ped. l. & ultra. Scap. spitham. anceps, 4-gon. cernuus, apice floriterus, glaber, tenuissime striatus. Racemi fl. peduncul. secundis. Pedunc. aggregati, 2-6. Bract. alba. Petal. alba. Bacca magnitudine *Pisi*, coerul.

b. Barba serpentina. *Kämpf. am. exot. Fasc. V.* pag. 824.

In *Japonia* inter frutices.

Rad. tuberculata. Fol. radical. inferne membrana tenuissime involuta, linear. acuta, striata, integerr. incurvata, secunda, glabra, palmar. & ultra, semilineam lata. Scap. fol. duplo brevior, anceps, glaber. Fl. ut in priore, sicuti bacca.

3. *spicata*. C. scap. nudo, striato: racemo spicato: fl. aggregatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In *Japonia*,

Radix fibrosa. Fol. radical. linear. inferne attenuata, obtusiusc. valde striata, glabra, scapo longiora. Scap. palmar-ped. erectus, striato-angulatus. simpl. glaber. Racem. digital. Cor. subglobosa, glabra, violac.

** Cor. infundibulifor.

4. *verticillata*. C. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 86. Dod. pempt. 345.*

In *Europa septent. saltibus, precipitiis* &c.

Caul. cubital. simpl. vel ramosus, erectus, fistulosus. Fol. terna-quaterna, elliptica, graciliora. Pedunc. axill. etiam ramosi, penduli, usque 6-fl. Fl. min. subvirid. Bacca violac.

5. *Polygonatum*. C. fol. alternis, amplexicaul. caul. ancipiti: peduncul. axillar. sub 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 377. Ludw. ed. tab. 47. Knorr. del. 2. tab. P. 4. Sabb. hort. 1. tab. 7. Burr. ic. 711.*

Poligonato, *Mutth.*

In *Europa septent. nemoribus* &c.

Radix tuberosa, geniculata, serpens. Caul. cubit. angulatus. Fol. elliptic-lanceol. lata, nervosa, nutant. subtus glauca. Cor. tubulosa, albida, apice virescente, quandoq. duplex. Bacca mollis, purpur.

6. *latifolia*. C. fol. alternis, amplexicaul. acuminatis: caul.

X ij

angulato: pedunc. axillar. multifi. *Syst. veg. ed. 14 Jacq. Austr. 3. tab. 232.*

In Austria.

Habitus, & pedunc. *C. multiflora*. Rad. & fol. *C. maislis*.

7. *multiflora*. *C.* fol. alternis, amplexicaul. caul. tereti: pedunc. axill. multifi. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 152. Mill. ic. tab. 101. Black. tab. 251. Sabb. hort. 1. tab. 6.*

Polygonatum latifol. 1. Clus. hist. 1. p. 275.

In Europa septent. nemoribus 24.

Caul. 3-ped. simpl. arcuatus, cernuus. Fol. vix amplexicaul. elliptico-lanc. molliora, ma: quam in priore. Fl. min. Pedunc. compressi, 6-8-fl. Cor. alba, lacin. subcordat.

*** *Cor. rotatis.*

8. *racemosa*. *C.* fol. sessilibus: racemo terminal. composito. *Syst. veg. ed. 14.*

Polygonatum &c. Corn. Can. tab. 37. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 4. f. 9. Pluk. alm. tab. 311. f. 2.

In Virginia, Canada 24.

Scap. squamatus, fasciculatim racemosus. Bract. lanceol. sub quolibet fasciculo. Fol. ampla, alterna. Pedicelli conferti, patent. Fruct. rubri.

9. *stellata*. *C.* fol. amplexicaul. plurimis. *Syst. veg. ed. 14. Polygonatum &c. Corn. Can. tab. 33. Moris. hist. 3. f. 13. tab. 4. f. 7.*

In Canada 24.

Rad. geniculata, alba. Caul. pedal. & ultra. Fol. vulgari acutiora, pinguiora, minus nervola, utrinq. virid. Fl. in summis fol. stellati, lutei, dein spicam efformantes. Bacca rubens.

10. *trifolia*. *C.* fol. amplexicaul. ternis: racemo terminali, simpl. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 1. tab. 6. In Sibiria sylvis 24.*

Rad. ut in *Lilto convallio*. Caul. palmar. Fol. caulina 2-3-4. ovata, vel sublancoel. Fl. 5-9. albi. Bacca rubra.

11. *bifolia*. *C.* fol. cordat. fl. tetrandis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 291. Mill. ic. 1. 105.*

Lilium convallium &c. Barr. ic. 1212.

In Europa boreal. pratis 24.

Scap. erectus, palmar. simpl. Fol. 1-2-3. alterna, petiol. Racem. terminal. Cor. ovato-lanceol. rotata, alba. Baccæ rubent.

314. POLY- Cor. infundibul. incurva, æqual. Filam. cor. fauci
 ANTHES. inserta. Germ. in fundo cor.
 1. *tuberosa*. P. fl. alternis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. T. 12.*
Hyacinthus indicus &c. Rudb. ely. 2. p. 39. f. 4.
b. Hyacinthus &c. Clus. hist. 1. p. 176. Ruab. ely. 2. p. 39. f. 2.
Amica nocturna. Rumph. amb. 3. tab. 98.
In Java, Zeylona &c.
 Caul. 2-cubit. Fol. alterna, lata basi caulem amplectentia, subulata, integerr. radical. humifusa. Fl. spicati, candidi, odore gravi. *Var. fl. pleno.*
315. HYA- Cor. campanul. 6-fida, limbo reflexo: pori 3,
 CINTHUS. melliteri in apice perminis. Stigm. obtusum.
 1. *non scriptus*. H. cor. campanul. 6-part. apice revolutis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 61. Knorr. del. 2. tab. H.*
In Europæ nemoribus &c.
 Rad. bulbosa, tunicata. Fol. radical. longa, integerr. etiam reflexa. Scap. teres. Spica pauciflor. cernua. Bract. 2. Cor. cœrul. vel alba.
 2. *cernuus*. H. cor. campanulat. 6-part. racemo cernuo. *Syst. veg. ed. 14.*
H. hispanicus. Clus. Hist. 1. p. 177.
In Hispania &c.
Simil. priori, sed minor. Differt fol. magis linear. minus lunceolat. erectioribus: racem. magis nutant: cor. incarnata, nec cœrul. minus revoluta, et si reflexa, ut in illo: pistil. staminibus brevioribus; bracteis saturatius incarnatis. Cor. huic basi ventricosior.
 3. *serotinus*. H. petal. exterior. subdistinctis; interior. coadunat. *Syst. veg. ed. 14.*
H. obsoleti &c. Clus. hist. 1. p. 177. 178.
In Hispania, Mauritania, Liguria &c.
 Racemus secundus. Fl. tristi col.
 4. *viridis*. H. cor. exterioribus lacin. subulat. longissim. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gottin. 1781. tab. 5.*
Ad cap. b. Spei.
 5. *amethystinus*. H. cor. campanul. semi 6-fid. basi cylindricis. *Syst. veg. ed. 14. Rudb. ely. 2. p. 27. f. 8.*
H. minor &c. Bauh. hist. 2. p. 387.
In Hispania? Russia &c.
 Fol. angusta, Cor. amethystina.

6. *revolutus*. H. cor. campanul. 6-part. revolutis: fol. oblong. undulat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
7. *orientalis*. H. cor. infundibulif. semi-6-fid. basi ventricosis.
Syst. veg. ed. 14.
In Asia, Africa &c.
 Bractæ 2. parvæ sub pedunculo. *Variet. innumera petal. multiplicat. & col. diverso.*
8. *corymbosus*. H. cor. infundibuliform. corymbosis, erectis: scapo fol. brevior. *Syst. veg. ed. 14.*
In cap. b. Spei pascuis &c.
 Rad. bulbosa. Fol. radical. linear. angustiss. digito breviora, sæpius 3. Racem. longiss. laxis, peduncul. supremis coloratis, deciduis. Fl. inferior. fordide pallentes; superior. violac.
9. *romanus*. H. cor. campanulat. semi-6-fid. racemosis: flamin. membranac. *Syst. veg. ed. 14.*
H. comosus &c. Bauh. hist. 2. p. 384.
Roma.
 Fol. longiss. latitudine digiti. Racem. longus, teres, fl. numerosiss. Bract. minutæ, membranac. muticæ. Cor. alba. Anth. cærul.
10. *Muscari*. H. cor. ovatis, omnibus æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Muscari obsoletiore fl. Clus. hist. 1. p. 178.
In Asia, nunc in Europa &c.
 Fol. radical. 5-6. humifusa, oblique inflexa, sulcata, succulenta. Scap. teres. Bractea una sub peduncul. altera supra ipsum. Fl. racemosi. Cor. ex purpuro-virens, aut saturo purpurasc. Moschi odore.
11. *convallarioides*. H. scap. capillari: cor. ovatis, pendulis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Fl. absque foliis, lutei.
12. *monstrosus*. H. cor. subovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
b. H. fancestus &c. Col. ecphr. 2. tab. 12.
In Gallia &c.
Videtur var. sequentis. Fl. paniculati, monstrosi, purpurei.
13. *comosus*. H. cor. angulato-cylindric. summis steril. longe pedicellatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 126.*
H. maximus &c. Bauh. hist. 2. p. 371.
Jacinto Matth.
In Europa australis agris &c.

Scap. ped. cubit. Fol. ped. dodrant. lata. Spica longiss. etiam ped. cœrul. Fl. inferior. cylindrici, paruli, basi ventricosa, fusco-subvirid. fere *Muscari*: superior. minuti, vix dehiscetes, violic. sicuti pedicelli.

14. *botryoides*. H. cor. globosis, uniformibus: fol. canaliculato--cylindric. strictis. *Syst. veg. ed. 14.*

Hyacinthus. III. *Clus. hist. 1. p. 181. Lob. ic. 108.*

In Italia, Helvetia, Carniola &c.

Differt a sequenti fol. erectis, & fl. inodoris. Fol.

3. lineas lata. Racem. uncial. densus, 20-30-fl.

Fl. magni, nutantes, læte amethystini, ore albo.

15. *racemosus*. H. cor. ovatis; summis sessilibus: fol. laxis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 2. tab. 187. Knorr. del. 1. tab. T. 8.*

H. botryoides 1. Clus. hist. 1. p. 181.

In Europa australi 24.

Scap. 3-4-unc. sub fl. cœrul. Fol. semipedal. lineam lata, laxa, decumbent. Racemus densus, 40-50-fl. Pedunc. & cor. cœruleo-nigresc. odore debili *Prunorum*.

16. *lanatus*. H. cor. lanatis: caule ramoso. *Syst. veg. ed. 14. Habitat . . .*

16. PHORMIUM. Cor. campanul. 6--petal. Petal. 3. exter. breviora.

1. *tenax*. P. fol. plurimis: inflorescentia ramosa. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen. Cook. vol. 2. tab. 96. Mill. ic. nov. tab. 2. fig. optima.*

In nova Zeelandia.

Incolæ novæ Zeylandæ Lini speciem fabricant ex hac planta.

2. *Hyacinthoides*. P. fol. radical. binis, basi maculatis: scapo racemoso, simplici: cor. campanulato--patent. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Hyacinth. orchiodes. Jacq. hort. 2. tab. 178.

Ad cap. b. Spei 24.

Fol. semiped. & ultra, lanceol. subulata, carnosa. Scap. basi ferrugineo-maculat. Racemus terminal. fl. copiosiss. Cor. campanul. extus viridescens, odore *Syringæ*.

3. *Aloides*. P. fol. binis, radical. supra fusco-maculat. scap. racemoso, simplici: fl. nutantibus, cylindrico--infundibul. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei 24.

Radix bulbosa. Fol. lanceol. non carnosæ. Scap. vix ped. teres, fusco-maculat. Fl. versus apicem alterni, pedicellati. *Var. cor. lucis, crocea, sanguineis, apice purpur. albo-viresc. & proportione inter petal. exterior. & interiora. Species difficile determinatur.*

17. ALETRIS. Cor. infundibulifor. Stäm. inserta laciniar. basi. Capf. 3-locul.

1. *capensis*. A. acaul. fol. lanceol. undulat. spica ovata; fl. nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Ad. Stock. 1770. tab. 5.*

Orchis hyacinthoid. &c. Buxb. cent. 3. tab. 20.

Ad cap. b. Sprei.

Bulbus tunicat. violac. Fol. radical. fena, lato-lanceol.-violaceo-macul. Fl. copiosi, breviter peduncul. Bract. propriæ setac. Cor. punctis carneis, limbo breviss. obtuso. Capf. subinflata, ovato-triquetra, acute carinata, angulis compressis, magna.

2. *hyacinthoides*. A. acaul. fol. lanceol. carnosæ: fl. geminat. *Syst. veg. ed. 14.*

Katu-Kapel. Hort. mal. 11. tab. 42?

In Malabar 24.

Scapus erectus; vix fol. superans. Fol. zonis transversus variegata. Fl. undiq. erecto-patuli, tubo angusto, limbo revoluto.

a. *zeylanica*. A. fol. quibusdam subulatis, compressis. *Comm. hort. 2. tab. 21. Pluk. alm. tab. 256. f. 5.*

In Zeylona 24.

Fol. prima lanceol. erecta, breviora, plana; reliqua longiora, subulata, semicylindr. canalicul.

b. *guineensis*. A. fol. omnibus lanceolat. *Jacq. hort. 1. tab. 84. Comm. hort. 2. tab. 21. praed. tab. 33.*

In Guinea 24.

Fol. plana, erecta.

3. *fragrans*. A. caulescens: fol. lanceolat. laxis. *Syst. veg. ed. 14.*

Aloe africana &c. Com. hort. 2. tab. 4. & 1. tab. 49.

In Africa 24.

Radix fibrosa. Scap. 4-ped. Fol. sesquiped. 3-unc. lata, mucrone atro-virente, nitido. Fl. racemosi, pedunculis spitham. Petal. reflexa, alba, lineol. subrubris, odore *Polyanthes tuberosæ*.

4. *Uvaria*. A. acaul. fol. ensiform. canaliculat. carinatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 Aloe &c. *Knorr. del. 1. tab. A. 13. Comm. hort. 2. tab. 15. Seb. thes. 1. tab. 19. f. 3.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Scap. erectus, longus, 4-5-ped. Thyrsus fl. confertis, imbricat. pendulis, rubentibus, dein flavescentibus.
-
- bifolia*. A. fol. oblongo, canaliculato, scapum, foliolumq. involvente: fl. pendulis. *Buchoz. Hist. gen. vol. 2. tab. 1.*
 b. *Buxb. cent. 3. tab. 19. ubi foliol. unicum: fl. pauciores.*
518. *YUCCA*. Cor. campanulato-patens. Styl. nullus. Capf. 3-locul. *Fol. carnea, succulenta.*
1. *gloriosa*. Y. fol. integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Barr. rar. tab. 1194.*
In Canada, Peru &c.
 Rad. crassa, tuberosa, dein in multa capita protuberans, intus candida, extus rubra. Fol. plurima, radical. in orbem expansa, cubital. dura, carinata, e cinereo-virid. in acutum, & fuscum mucronem desinentia. Scap. 3-ped. superne ramosus. Fl. plurimi, ampli, nutantes, albi, cum venis dilute rubent.
2. *aloifolia*. Y. fol. crenulat. strictis. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 323. f. 416. Pluk. alm. tab. 256. f. 4.*
 Aloe &c. *Comm. præl. tab. 14.*
In Jamaica, Vera cruce &c.
 Planta 7-ped. & ultra, ad 3. pedum longitudinem nuda. Fol. multa, undiq. ex scapo orta, infer. pendentia; reliqua horizontaliter & oblique surgentia; summa erecta: dodrant-fesquipedal. latitudine fesqui-unc. Fol. a scapo medio radiatim nata, recta, rigida, concava, in medio latiora, mucronata, nigro-purpur. margine crenis rigidis. Fl. nutantes, in thyrsum dispositi, antequam explicentur ad basin ex herbaceo albicant. superne obscure purpurasc. dein candidi.
3. *draconis*. Y. fol. crenatis, nutantibus. *Syst. veg. ed. 14. Dill. elth. tab. 324. f. 417. Comm. præl. tab. 16.*
In America &c.

Planta 8-ped. Fol. priore longiora, angustiora, teneriora, minus concava, lucida, sature virid. 2-ped. & ultra, 2-unc. lata. Fl. ut in priore, sed lactei, odore subgrato.

4. *filamentosa*. Y. fol. serrato-filiferis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. tab. 37.*

In Virginia h.

Fol. per ambitum apprime filis albis, lanceol. acumin. Cor. alba.

519. *ALOE*. Cor. erecta, ore patulo, fundo nectarifero. Filam. receptaculo inserta. Fol. carnea, succulenta.

1. *perfoliata*. A. fl. corymbosis, cernuis, pedunculat. subcylindr.

Caul. sæpe radicans, licet erectus. Fol. caulina dentata, amplexicaul. vaginant.

a. A. afric. caulesc. fol. magis glaucis, caulem amplectant. & in mucronem obtusorem desinent. *Comm. præl. tab. 17. rar. tab. 44.*

Planta sesquipedal.

b. A. afric. caulesc. fol. minus glaucis, dorso parte suprema spinosa. *Comm. præl. tab. 18.*

Caul. 3-ped. primum viridis, dein fuscus. Fol. ped. & ultra, amplexicaul. latiora, margine, & dorso spinosa.

c. A. afric. caulescens, fol. glaucis, latioribus, & undique spinosis. *Comm. præl. tab. 19.*

Caul. sesquiped. fuscus. Fol. ped. latitudine 4-unc.

d. A. afric. caulescens: fol. breviss glaucis; fol. summitate interna, & externa nonnihil spinosa. *Comm. præl. tab. 22. rar. tab. 45.*

Caul. ped. Fol. plurima, parva, vix 3-uncial., latitudin. uncial. Spinæ albicantes.

e. A. caulesc. fol. glaucis: dorso integro, spinoso. *Comm. præl. tab. 20. hort. 2. tab. 13.*

Caul. ped. & ultra. Fol. ped. latitud. 2-3-unc.

f. A. afric. caulescens; fol. glaucis, brevioribus: fol. parte interna, & externa nonnihil spinosa. *Comm. præl. tab. 21.*

Caul. vix ped. Fol. 5. unc. longa, 2-lata, maculis rotundis, albicant. Spinæ albicantes.

glaucæ.

A. afric. caulescens, fol. glaucis, caulem amplectentibus. *Comm. hort. 2. tab. 14.*

Caul. ped. Fol. dentata, mucrone 2-fid. adult
ta reclinata, subtus pallefcentia, nervis viri-
dibus.

g. A. afric. caulescens; fol. spinosis, maculis ab
utraq. parte albicant. notatis. *Comm. hort. 2.*
tab. 5.

Caul. ped. folior. stigmata diu servans, albo-pur-
purasc. Fol. 1-fesquiped. latitudine 2-3-unc.
mucrone acutiss. & spinoso.

disticha.

A. afric. caulescens, perfoliata, glauca, & non
spinosa. *Comm. præl. tab. 23.*

Planta tota glauca, & inermis. Caul. ped. Fol.
6-unc. longa, unciam lata, decussata.

h. A. afric. fol. glaucis; margine, & dorsi parte
superiore spinosis; fl. rubro. *Comm. præl. tab.*
24. hort. 2. tab. 12.

Fol. plurima, in orbem posita, ped. sensim an-
guustiora. Spinæ subflavæ. Scap. sesquiped. vi-
rid. foliol. aliquot non succulentis. Fl. plu-
rimi.

i. A. afric. maculata, spinosa, ma. *Dill. elth.*
tab. 14. f. 15.

Caul. sub 2-ped. Fol. fere palmum lata, pedem
longa, concava, utrimq. maculis albis. Spinæ
in ambitu rufescent. vel albicantes. Fl. pen-
duli, extus rubentes, intus e luteo pallefcent-
es.

k. A. afric. maculata, spinosa, min. *Dill. elth.*
tab. 14. f. 16.

Caul. palm-dodrant. Fol. priore pinus crassâ,
longius mucronata, magis concava: maculæ
minus albæ. Fl. breviores, profundius divisi.
Cor. pallide rubra.

l. A. afric. mitriform. spinosa. *Dill. elth. tab.*
17. f. 19.

Caul. ped. & ultra, e cinereo-subfuscus, dein
cubital. Fol. crassâ, cruciata, dodrant. latitud.
palmar. Aculei plerumq. albicant. in apice fo-
lior. fusco-purpurasc. Fol. concava, hyeme vi-
ridi-purpurasc. Fl. rubri.

mitriformis. Aloe.

m. A. succotrina, angustifol. spinosa, fl. purpur.
Comm. hort. 1. tab. 48. Pluk. alm. tab. 240. f.
4. Black. 333.

Rad. tuberosa. Fol. sesquipedal. angusta. Spinæ

exiguæ, pallidæ. Caul. sesquiped. & ultra, superne foliosus, fuscus. Fl. nutantes, dilute purpur.

- humilis*. Aloe Afric. humilis; spinis inerm. & verrucosis obfita. *Comm. præl. tab. 26. rar. tab. 46.*
Fol. multa, 4-uncial. utrimq. spinis inerm. & verrucosis obducta, mucrone inflexo. Flos nutans, incarnatus, ore virefc.
- n. vera*. Aloe fol. spinosis, confertis, dentat. vaginantibus, planis, maculatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Kadanaku. Hort. mal. 11. tab. 3.
In Italia, Sicilia, Melitæ tedis, muris h.
Caul. sæpe radicans, licet erectus. Fol. 2-cubital. carinata, repanda, acumine longo, rigido. Fl. flavi.
In Indiis, Africa 24.
- 2. variegata*. A. fl. racemosis, carnuis, subcylindric. ore patulo, æquali. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. A. 7. Comm. præl. tab. 28. rar. tab. 27. Tilli Pis. tab. 7.*
In Æthiopia argillofis 24.
Fol. ex albo, & viridi variegata. Fl. ovat-oblong. subnutant. Cor. incarnata; lacin. 3. interioribus alternis, patulis. Stam. declinata. Stigm. simpl.
- 3. linguæformis*. A. fl. racemosis, erectis; cor. cylindric. fol. linguæform. distichis, patulis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spti h.
Arbor orgyalis.
- 4. disticha*. A. fl. pedunculat. pendulis, ovato-cylindr. curvis. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. A. 12, & A. 14.*
Scapus declinatus. Fol. disticha.
b. A. afric. fl. rubro, fol. triangul. & verrucis albicantibus ab utraq. parte notato. *Comm. hort. 2. tab. 9.*
Fol. plurima, semiped. 2-unc. lata. Fl. penduli, rubri.
- carinata*. A. sessilis, fol. carinat. verrucosis, apice triquetris, carnosis. *Mill. ic. tab. 19. Dill. elth. tab. 18. f. 20.*
Fol. palmar-dodrant. cruciata, concava, apice plano, ad basin, & in medio virent. non glauca, supra, & margine fusco-virent. verruc.

obscure albicantibus. Scap. pedal. & ultra, ruber. Fl. 1-lateral. corallini.

c. A. afric. fol. planis, coniugatis, carinatis, verrucosis: caul. & fl. corallii col. *Mart. cent. 11. tab. 10.*

Fol. maculis albis, obscuris, in spinam desinentia. Scap. 2-pedal. superne rubesc. Fl. ex rubro, virid. & albo variegati.

d. A. afric. arborelc. montana, non spinosa, fol. longiss. plicatili, fl. rubro. *Comm. hort. 2. tab. 3.*

Caul. pedal. fuscus. Fol. sesquiped. longa, unc. lata, rore albo obducta, margine subrubente. Fl. rubri.

In Africa rupibus h.

5. *spiralis.* A. fl. spicat. ovatis, muricatis, crenatis, segment. interioribus conniventibus. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. A. 6. Dill. elth. tab. 13. f. 14. Comm. præl. tab. 32.*

In Africa campestribus h.

Planta palm-pedal. tota foliis tecta, undique prodeuntibus, & in rotundam caulis foliati figuram dispositis. Fol. oval-subul. mucronato-spinosa, apice tricarin. sexfariam imbric. col. viridi, vel obscure purpur. Scap. pedal-sesquipedal. simpl. vel ramosi. Fl. longe spicati, primum ex ochreo col. purpurasc. summo apice subcroceo; dein candicantes, parvi.

6. *retusa.* A. fl. spicatis, triquetris, bilabiat. lab. inferior. revolut. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. A. 10. Comm. hort. 2. tab. 6. Till. pis. tab. 5.*

In Africa argillosis 24.

Fol. breviss. & crassiss. ob marginem reflexum triangularia evadunt, supra lineis albicans. prædita, mucrone subrubente. Scap. spitham. sububer. Fl. simil. A. *pumila*, virides.

7. *viscosa.* A. fl. spicatis, infundibulifor. bilabiat. lacin. 5. revolut. summa erecta. *Syst. veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. A. 10. Comm. præl. tab. 31. Till. pis. tab. 5. Dill. elth. tab. 13. f. 13.*

In Æthiopia campestribus 24.

Fol. tribus seriebus ita disponuntur, ut triquetra figura adpareat; modice declinantur, & tenuiora facta in mucronem rigidum desinunt: cæterum brevia, carinata, rigida, col. obscu-

re virid. apice subpurpur. Scap. ped. fusco-purpuraf. subreclinat. Fl. rari, parvi, obsolete purpur.

8. *pumila*. A. fl. spicat. bilabiatis; lab. super. erectiore; inferior. recurvato. *Syst. veg. ed. 14.*

margaritifera. A. fol. ovato-subulat. tuberculis cartilagineis undiq. adspersis. *Comm. hort. 2. tab. 10. Bradl. succ. 3. tab. 21.*

Fol. plura, in orbem posita, superne glabra, ad extremitatem parum excavata; subius verrucis albicant. per ætatem virid. mucrone acuto, & rubro. Scap. 2-ped. simpl. vel geminus, ramosus, virid. Fl. virid.

b. A. afric. *margaritifera*, minor. *Comm. hort. 2. tab. 11. Dill. elth. tab. 16. f. 17.*

Fol. duplo min. & tenuiora priore.

c. A. afric. *margaritifera minima*. *Dill. elth. tab. 16. f. 18.*

Differt a priore folior. & margaritarum parvitate,

d. *arachnoides*. A. sessil. fol. brevioribus, planis, carnosiss, apice triquetris, margin. inerme spinosis. *Comm. præl. tab. 27. Knorr. del. 1. tab. A. 11.*

Fol. multa, in orbem posita, 2. unc. cum dimidio longa, in medio lata, mucronata, virid. margine, & in medio dorsi spinis albis, & inermibus. Fl. subvirid. linea rubra longitudinali.

i. A. fol. ovat-lanceol. carnosiss, apice triquetris, angulis inerme dentatis. *Boerh. Lugd. 2. tab. 131. Bradl. succ. 3. tab. 30.*

In Æthiopiæ campestribus 24.

Planta minima, atro-virid. Spinæ herbacæ.

9. *spicata*. A. fl. spicatis, horizontal. campanulat. fol. caulinis planis, amplexicaul. dentatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. A. *perfoliatæ*; at spica, & fig. florum valde diversa.

Ex huius succo optima Gummi resina Aloe paratur: ex reliquis speciebus vilior.

10. *dichotoma*. A. ramosa, ramis dichotom. fol. ensiform. serratis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

officinalis. A. fl. rubris, racemosis, tereti-triquetris. *Forsk.*
Æg.

In Arabia 24.

Scap. 2 cubit. teres, glaber, cinereus, quandoq.
2-fid. Corymb. terminal. pedal. bractea mem-
branac. deflexa sub singulo fl. Fl. breviter pe-
duncul. cernui, lacin. reflexis; 3. interioribus
infra apicem conniventibus, & paulo reliquis
longioribus. Fol. extrorsum attenuata, supra
cava, subtus convexa, margine aculeis oppo-
sitis, erectis, compressis, brevibus; basi plana;
vaginantia, col. viridi, nebulis albis, subtus
rufescente.

*Si frangantur folia, produnt pulpam viridem, vi-
scido. carnosam, fetore A. succatrinæ Offic. un-
de hanc plantam existimo matrem esse succi istius.*

A. vera Lin. fol. gaudet planis.

pendens. A. *Forsk.* *Æg.*

In Arabia 24.

Fol. subdisticha, digito angustiora, sesquipitham.
vel pedal. remota, vaginant. Fl. racemosi,
flavi. *Crescendo pendet e rupibus; peduncul. ta-
men surgentibus.*

inermis. A. fol. inermibus, margine subcartilagin. *Forsk.*
Æg.

In Arabia 24.

Fol. sesquipollic. lata, carnosæ, curva, subtus
convexa, virid. supra concava, ferruginefc.
albido-maculata, lineæ 2. longitudinaliter ele-
vate in pagina super. folior. Margo fol. hya-
linus, crassus, cartilagin.

vacillans. A. fol. dentato-spinosis. *Forsk.* *Æg.*

In Arabia 24.

Fol. planiusc. obscure virid. margine rubro, Fl.
subsessil. cernui, flavo-rubent. Crescendo cau-
dicem acquirit brachii crassitie, ulnæ longitud.
tantæ vero debilitatis, ut leviss. vi decumbat,
ni sustentetur. *Succus recens flavicans; siccus
ruber sanguinis instar. His notis differt ab A.
vera.*

caroliniana. A. *Hill. hort. Kewens tab. 13.*

In Carolina 24.

Caul. 3-ped. Fol. linear. Fl. viridi-albicant.

520. AGAVE, Cor. erecta, supera, 6-fida, epicarpia. Fila-

menta cor. (plerumq.) longiora, erecta. Pol. carnosa, succulenta.

1. *americana*. A. fol. dentato-spinosis: scapo ramoso. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. nunc in Lusitania, Italia, Helvetia ad rupes 24.

Fol. ampliss. succulenta, hinc convexa, inde plana, mucrone duriss. firmis per oram spinis obsita. Scap. erectus, etiam 30-ped. simpl. spica ramosa, fl. innumeris. Petal. sublutea.

2. *vivipara*. A. fol. dentatis, staminibus cor. æquantibus. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *amer. sobolifera*. *Herm. Ludg. tab. 17. 57. Comm. præl. tab. 15. Rumph. amb. 5. tab. 94. In America.*

Rad. geniculata. Fol. radical. sese mutuo amplectent. sesqui-2-pedal. latitud. 6-8. digitos, crassa, in medio crassiora, spina terminali acuta. Scapus foliol. parvis, amplexicaul. præditus. Pedunc. axill. ramosi. Fl. parvi, luteo-herbacei.

3. *virginica*. A. fol. dentato-spinosis: scapo simpliciss. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia 24.

Fol. lanceol. spina cartilagin. terminata. Fl. alterni, sessil. virid. odori.

4. *foetida*. A. fol. integerrimis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. hort. 2. tab. 18. Pluk. alm. tab. 258. f. 2?*

In Curassao b.

Radix crassa, & tuberosa. Caudex palmar. fuscus. Fol. radical. 5-pedal. latitudine 4-unc. non admodum crassa, subtus eminent. virid. basi crassiore, & angustiore, ventre latiore, & tenuiore, mucrone inermi; adulta reflectuntur. Perperam definita fuit foetida, cum etiam A. *amer. sit foetida.*

cubensis.

A. cor. 6-petal. fol. ciliato-spinosis. *Jacq. amer. tab. 75. f. 28. ed. pida tab. 260. f. 25.*

In Cuba 24.

Planta elegantiss. Fol. 3-4-pollic. ensiform. acumin. erecta, crassa, ciliato-spinosa, pallide virid. Scap. erectus, 15-ped. paniculat. Fl. numerosi, penduli. Cor. extus fordide albens, intus

intus sordide virens, odore gratiore *Tagetis*.
Planta vivipara. Fl. *Saponis loco* usitantur.

521. AL-
 STRÆMERIA. Cor. 6-petal. sub 2-lab. petal. 2. inferioribus basi
 tubulosis. Stam. declinata.

1. *pelegrina*. A. caul. erecto: cor. campanulat. rectis: fol. lineari-lanceol. sessil. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 6. tab. 247. Jacq. hort. tab. 50.*

Hemerocallis &c. *Fewill. peruv. 2. tab. 5.*

In Peru, & Lima 24.

Caul. simplex, erectus, herbaceus, spitham. Fol. caulina plurima, sparsa, resupinata, sessil. lineari-lanceol. obtusiusc. integerr. supra nervosa, subtus lævia: terminalia 4-5. verticillatim digesta. Pedunc. terminal. 4-7. distantes, sæpe 1-phyll. 1-fl. Petal. oblonga, basi angusta, albida, disco rubro, maculisq. purpur.

2. *pulchella*. A. caul. erecto: cor. reflexo-patentibus: omnibus acutis: fol. sessil. pedicellis involucri brevioribus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Amer. merid.

Habitu, & structura simil. priori, sed fol. angustiora, & caule terminato involuc. irregul. ex fol. maioribus exacte petiolat. resupinatis. Pedunc. nudi, simpl. 1-fl. Fl. 4-6. subcernui, magnitud. prioris. Petal. a basi patent. recurvata, acuta, alterna min. albida, apice rubra, basi rubro-punctata.

3. *ligtu*. A. caul. erecto: fol. spathulato-oblong. pedunculis umbell. involucri longioribus: cor. 2-lab. *Syst. veg. ed. 14.*

Hemerocallis &c. *Few. per. tab. 4.*

In Lima.

Specabilis fl. magnis. Caul. steriles vestiti fol. adpressis, subularis, terminati fol. spathul. oblong. resupinat. in rosam fere dispositis. Caul. florifer vestitus fol. adpressis, subulat. terminatus involuc. brevior. Petal. 3. super. maxima, basi punctata, apice rubro-maculata: 3. infer. breviora, præcipue infima, fere subulata, rubra. Anth. didimæ, luteæ. Pistil. rubrum.

4. *salsilla*. A. caul. volub. fol. petiolat. lanceol. acuminat. umbella ramosa; pedunculo involucro longioribus, bracteatis, laxis. *Syst. veg. ed. 14. Few. per. tab. 6.*

In Lima.

Fol. alterna refupinata, nervosa. Involuc. polyphyll. subulat. reflexum. Pedunc. pauciores, sub 2-fl. Fol. florale ad ramificationes peduncul. Petal. erecto-patent. obtusiusc. exter. rubicunda; inter. virecent.

5. *multiflora*. A. caul. volub. fol. petiolat. lanceol. acuminat. umbella simpl. pedunc. bracteis brevioribus: petalis alternis, truncatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Amer. merid.

A reliquis distincta. Habitus, & structura herbæ est *A. falsilla*; at petioli margine rugoli, nec umbella peduncul. involuc. multifi. constat foliol. latioribus: pedunculi involuc. & fl. breviores, simpl. nudi. Fl. magnitud. *A. falsilla*. Petal. 3. exter. breviora, angustiora, integra; 3. inter. truncata, seu emarginata cum acumine.

511. GETHYLLIS. Cal. 6. Cor. 6-part. Bacca clavata, radicalis, 1-locul.

1. *villosa*. G. fol. filiform. spiralibus, villosis, limbi lacin. ovat-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Papiria villosa. Taumb. Ad. Lund. P. I. p. 111. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

2. *ciliaris*. G. fol. linear. spiralibus, ciliatis; limbi lacin. ovat-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Papiria ciliaris. Thumb. Ad. Lund. P. I. p. 111. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

3. *spiralis*. G. fol. linear. spiralibus, glabris; limbi lacin. oblong. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Papiria spiralis. Thumb. Ad. Lund. P. I. p. 111. cum fig.

Ad cap. b. Spei.

Rad. bulbosa, nigra. Fol. plura, ensiformi-linear. integerr. valde nervosa. Spatha alba, ad rad. intra vaginam comm. folior. Cor. tubus fol. longior, limbo albo. Stam. alba. Anth. flavesc. Fruct. intra spatham reconditus, ventricosus.

4. *lanceolata*. G. fol. lanceol. planis; limbi lacin. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Papiria lanceolata. Thumb. Ad. Lund. P. I. p. 112. Ad cap. b. Spei.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 339

Obs. Omnes sp. habent faciem Colchici sed cor. 1-pet. & bacca facile dignoscuntur. Fl. fructum proferunt absq. fol. Bacca odora, & suporis iucundi.

523. HEME- Cor. campanulata, tubo cylindrico. Stam. decli-
ROCALLIS. nata.

1. *flava*. H. fol. lineari-subul. carinatis: cor. flavis. *Syst.*
veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 139. Knorr.
del. 1. tab. L. 5.

Lilio-Asphodelus &c. *Clus. hist. 1. p. 137.*

In Helvetiæ, Sibirix &c. campis 24.

Scap. 2--cubit. subflexuos. ramosus. Fol. scapo
breviora, ensiformi--linear. acuta, integerr.
glabra. Fl. graviter olentes.

2. *fulva*. H. fol. lineari-subul. carinatis: cor. fulvis. *Syst.*
veg. ed. 14.

Lilio-Asphodelus *puniceus*. *Clus. hist. 1. p. 137.*

Phalangium &c. *Clus. app. ult. Hort. cyst. vern.*
ord. 9. tab. 6. f. 1.

In China, Helvetia 24.

Differt a priore habitu ma: & cor. colore.

3. *japonica*. H. fol. petiolat. ovat--lanceol. septem--nerviis.
Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Simagi-gibbosi. *Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 863.*
In Japonia.

Fol. radical. erecta, apice patulo, integerr. supra
sature virid. digitalia, quædam palmam fere,
alia pollic. lata. Petioli foliis longiores, car-
nosi, canalicul. Scap. erect. fol. longior, teres,
articulat. glaber. Fl. terminal. racemosi, cernui.
Cor. alba.

4. *cordata*. H. fol. cordat. venosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb.*
Jap.

In Japonia.

Caul. pedâl. & ultra, erectus, teres, glaber.

Fol. spitham. palmum lata, alterna, petiol.
acuta, glabra, erecta, supra virid. subtus pal-
lida. Petioli alati. Fl. terminal. erecti, alterni.

324. ACORUS. Clava ex sinu fol. oriunda, digitifor. fl. ses-
silibus undique tecta. Cal. 6-phyll. foliol. ob-
tusis, superne crassioribus, persistent. Styl.
breviss. Caps. 3-angul. 3-locul. 3-sper.

1. *Calamus*. A. *Syst. veg. ed. 14. Ludw. ed. tab. 34.*

a. A. seu calamus aromat. offic. *Black. tab. 466.*

Thypha &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 13. f. 4.*

Y ij

b. A. verus.

Calamus aromat. Gart. 288. c. fig.

Acorum. Rumph. amb. 5. tab. 72. f. 1.

Wæmbu. Hort. mal. 11. tab. 60.

a. In Europæ: b. in Indiæ friffis paludosis 24.

Radix horizontal. articulata. Fol. radical. vaginant. ensiform. integerr. odorata. Scap. apice foliosus. Folii latus sulcatum profert spadiceum nudum, diginfor. cylindricum, substinentem fl. in spica attenuata. Var. clavis ternis-quatern.

525. LINDERA. Cor. 6 petal. Capf.

1. *umbellata. L. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. tab. 21.*

In Japonia h.

Caul. fruticof. laxus. Rami, & ramuli alterni, flexuofi, patentiff. gl bri. Fol. in apice ramulor. aggregata, pollicar. petiol. oblong. acuta, integerr. supra virid. glabra, subtus pallida, villosa. Petiol. vix unc. supra villosi. Fl. terminal. umbellati. Umbell. simpl. multiff. Petal. flavescent.

526. ORON- Spadix cylindric. tectus flosculis. Cor. 6-petal.
TIUM. nudæ. Styl. o. Follic. 1--sperm.

1. *aquaticum. O. fol. lanceol-ovat. Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 3. tab. 1. f. 3.*

Arum &c. Catesb. car. 1. tab. 82.

In Virginiæ, Canadæ paludibus 24.

Radix alte descendens. Scap. longus, teres, glaber, pallidus, cum punctis fuscis. Fol. petiol. acumin. integerr. glabra. Pedunc. sub spadice, albus. Fl. dense stipati, lutei.

2. *japonicum. O. fol. ensiform. venosus. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Omotto. Kæmph. am. exot. Fasc. V. p. 785.

In Japonia.

Differt a priore fol. multo longioribus, inferne attenuatis; venis pl. elevatis; & scapo brevior. Fol. radicale, solitar. inferne attenuatum, convolutum, integerr. glabrum, 2-ped. duos pollic. latum. Scap. erect. digital-palm. teres, glaber. Fl. terminal. spicati, distincti, spica pollic. oblong.

527. CALA- Cal. 6--phyll. Cor. o. Bacca exarida, 1--sperm.
MUS. retrorsum imbricata.

1. *Rotang. C. Syst. veg. ed. 14.*

Arundo nucifera &c. Pluk, alm. tab. 106. f. 1. 2.

Palmiuncus. Rumph. amb. 5. tab. 51. &c.

Theru Thiurel: Hort. mal. 12. tab. 64. 65.

In India sylvis iuxta fluentia h.

Habitus Arundinis. Calamus substantia spongiosa repletus. Ex singulis nodis usque ad apicem emittit sarmenta, folior. quam loco, funium modo intorta, & tenacia; hisque fructus globular. sæpe uniti nascuntur nucleo duro, eduli, sapore fragarum; qui fructus rotundi, parvæ piæ magnitudine, tecti puramine col. spadice. stris cancellatis ornat.

328. JUNCUS. Cal. 6-phyll. ex foliol. colorat. siccis, glumosis. Cor. o. Calf. 1-locul. 3-valv. polyperm. *Herba Graminoides.*

* *Culmis nudis.*

1. *acutus.* J. culm. subnudo, tereti, mucronato: panicul. terminali; involuc. 2-phyll. spinoso. *Syst. veg. ed. 14. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 15. b. f. 14.*

In Europæ maritimis paludosis 24.

Fol. teretia, acumin. Panicul. est potius lateral. cum involucri folium longius sit culmi continuatione.

2. *conglomeratus.* J. culm. nudo, stricto: capitulo laterali. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 13. f. 1. Matth. ic. 1036. Cam. epit. 780.*

In Europæ borealis uliginosis 24.

Cespites multi. Culmi cubital. latiores, subtiliter striati. Capitul. breve, densum, sessil. globosum.

3. *effusus.* J. culm. nudo, stricto: panicula laterali, (sparsa). *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 13. f. 2.*

In Europæ uliginosis, & pascuis humidis 24.

Simil. priori, sed fl. paniculati, & non capitati.

Culm. 2-3-ped. apice subulati. Fructus triqueter.

4. *inflexus.* J. culm. nudo; apice membranac. incurvo: panicula laterali (sparsa, longe pedicellata). *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 3. f. 3. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 10. f. 25. Barr. ic. 204.*

In pascuis humidis &c. 24.

Culm. pl. profunde sulcati, ad terram vaginis nigris obfusi, apicibus attenuatis, post efflorescentiam inflexi.

5. *filiformis*. J. culm. nudo, filifor. nutante: panicula laterali. *Syst. veg. ed. 14. Leerf. herb. tab. 13. f. 4. Pluk. tab. 40. f. 8. Scheut. gram. tab. 7. f. 11.*
In Europæ uliginoso-paludosis alpinis 24.
 Culm. ped. recti, teretes. Panicula in medio culmi, etiam infra medium, rara, paucifl. albicans, vel spadicea.
6. *griffidus*. J. culm. nudo: fol. floribusque (plerumque) tribus, terminalibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 107. Gesn. Schmid. fasc. 1. tab. 4. f. 16.*
J. monanthos. Jacq. Obs. tab. 4. f. 1.
J. acumine &c. Bauh. prodr. tab. 22.
In alpinis Helveticis, Lapponicis, Pirenaicis &c. 24.
 Culm. dodrant. tenuis, mollis, supra medium foliosus, folio super. ex ala florifero. Fol. convexa. Fl. plerumq. 3. etiam 1—2. spadicei, cum 2 stipulis.
7. *squarrosus*. J. culmo nudo: fol. setaceis: capitul. glomeratis, aphyllis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 430.*
Gramen iuncum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 13. Loef. pruss. tab. 29. Lob. ic. p. 18.
In Europæ borealis cespitosis, montanis 24.
 Planta rigida. Culm. dodrant. Fol. semiped. patentia, hinc convexa, inde acute carinata. Panicula spicata, pedunculis inæqual. Glumæ ovat-lanceol. duræ, albæ. Fructus spadicei, nitidi.
8. *punctarius*. J. culm. nudo, tereti: fol. tereti, articulato, mucronato: panicul. glomerata. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Culm. 2-ped. & ultra, lævis. Fol. nulla, sed membranæ 2. rudimenta folior. Fol. caulinum unicum, culmo simile, sed paulo longius, striatum, pungens. Panicula terminal. *Adfinis J. articulo; sed potissimum omnia robustiora.*

** *Culmis foliosis.*

9. *nodosus*. J. fol. nodoso-articulat. petal. mucronat. *Syst. veg. ed. 14.*
Gramen iuncum &c. Moris. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 15. Pluk. alm. tab. 92. f. 9?
In Amer. septentrion. 24.
 Similis *J. articulo*, sed fl. magis capitati, capitul.

maioribus, rarioribus, & paniculæ rami simplic. præcipue differt petalis tubulatis.

10. *articulatus*. J. fol. nodosis, articulatis. petal. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 5.*

Gramen iuncum &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 1.*

In Europæ aquis 24.

Culm. 2-cubiti. & ultra, teres. Fol. linear. canalicul. striata, isthmis pl. interne distinctis, potissimum sicca. Panicula terminal. laxa, rigida. Spicæ ultimæ 3-fl.

11. *bulbosus*. J. fol. linear. canaliculat. capsul. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Den. tab. 431. Leers. herb. tab. 13. f. 7. Gesn. Schmied. tab. 5. f. 13.*

J. repens &c. *Barr. ic. 114.*

J. Sorghi &c. *Barr. ic. 747. n. 11. Gmel. Sib. 1. tab. 17. f. 2.*

Gramen iuncum &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 11.*

In Europæ pascuis sterilibus, montanis 24.

Convenit facie cum J. bufonio, sed humilior, 3-unc. & ultra, dichotomus, ad terram quasi bulbosus, ramosus. Rad. repens, densa. Culm. filiform. subcompressi. Fol. florale longitudine corymbi. Corymbus comm. & partial. inæqual. Caps. fuscæ, nitidæ.

12. *bufonius*. J. culm. dichotomo: fol. angulat. fl. sæpe solitar. sessil. (remotis). *Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13. f. 8.*

Gramen &c. *Barr. ic. 263.*

Holosteum. *Lob. ic. 18-Pet. gaz. tab. 7. huius infans, paucis lecta.*

In Europæ inundatis 24.

Culm. cespitosi, unc--semiped. divaricati. Fol. hinc convexa, inde carinata. Fol. unum setac. in culmo; alterum sub quolibet ramo. Fruct. triquetro-conicus. *Variet fl. magna parte in foliol. setacea conversæ, qui rotunda capitula efficiunt.*

13. *strygius*. J. fol. setaceis, depressiuscul. pedunculis geminis terminal. glumis solitar. subbifid. *Syst. veg. ed. 14.*

In Sveciæ paludibus 24.

Culm. spitham. simplic. Fol. altitudine culmi, erecta, 3: a. ad radicem; b. in medio culmi, c. culmum instar spathæ terminans. Petal. exter.

- Juncoides &c. Scheuchz. gram. tab. 7. f. 7.
 Gramen hirsutum &c. Morif. hist. 3. f. 8. tab.
 9. f. 39.
 In alpinis Helveticis, Rhæticis &c. 24.
 Culm. 3-ped. 6-phyll. Panicula convexa, in ar-
 cum circuli flecta, 2-3-fl. super hanc 2. fol.
 longa, & angusta. Petal. alba.
19. *campestris*. J. fol. planis, subpilosis: spicis sessil. peduncu-
 latifq. Syst. veg. ed. 14. Leers. herb. tab. 13.
 f. 5.
 Gramen exile &c. Lob. ic. 15.
 b. J. fol. planis &c. Fl. Lapp. tab. 10. f. 2.
 In Europæ pascuis siccioribus 24.
 Culmi pedal. parum foliosi, aut ramosi. Fol.
 glabra, vagina pilosa in planta iuniore. Spica
 terminal. brevis, spadicea. Spicæ usque 6.
 inæqualiter pedunculat. ovatæ. Dantur multæ
 variet.
20. *spicatus*. J. fol. planis: spica racemosa, nutante. Syst.
 veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 270. Fl. Lapp. tab.
 10. f. 4.
 In Lapponiæ &c. alpinis 24.
 Culm. vix sesqui-palm. Spica longior.
21. *ferratus*. J. fol. ensiform. planis, ferratis, subtus canis:
 paniculae vaginis subulat. perfoliat. Syst. veg.
 ed. 14. Lin. Suppl.
 Ad cap. b. Spei.
 Adfinis J. piloso; sed J. acuto longe maior. Culm.
 4-6-ped. crassitie digiti min. teretes, foliosi.
 Fol. graminea, vix longitudine culmi, alter-
 na, subnervosa, duriora; lævia. Panicul. con-
 glomerata, minusq. patula; fl. sparse conglo-
 meratis.
22. *grandiflorus*. J. fol. tereti: culm. 1-fl. flore erecto, singula-
 ri, nudo. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
 In terra del Fuego 24.
 Gramen vix pedal. glaberr. Culm. basi vaginis
 tectus. Fol. unicum, rectum, culmo longius,
 subulat. Flos terminal. magnus.
-
- capitatus*. J. fol. setaceis: capitul. terminal. & axillar. sub-
 foliosis: petal. acut. integris, pericarpio æqua-
 libus. Weig. Fl. Pomer.
 Habitat

Culm. basi vaginis tectus, dein nudus, simpl. 1-3-unc. fetaceus. Fol. subuncial. lata, vagina fusca, margine membranac. albo notata. Capitul. 3-6-fl. iunius ovatum; adultius explicatum, fastigiatum, uno, alterove foliol. immixtum. Hoc solum in min. uncialibus; maioribus 2-unc. præterea simile capitulum sessile, vel breviter pedunculat. Ad basin capituli glumæ 2. scariolæ. Petal. lanceol. integra, nec membranac.

Ericetorum. J. culm. nudo, filiform. fol. linear. canaliculat. capitulo subrot. sessili, terminali, aphylo. *Pollich. Palat.*

In Palatinatu.

Differt a J. bufonio. Culmi nudi in cespitem congesti, unc.-palm. Fol. linear. fere fetacea, canalicul. Capitul. terminale, sessile, densum, 3. foliol. inæqual. exceptum.

subulatus. J. fol. subulatis: panicul. terminalibus: involuc. 2-phyll. subulato. *Forsk. Æg.*

In Arabia 24.

spinosus. J. involuc. panicul. infimæ pungentibus: superioribus fetiferis. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

spadiceus. J. planifolius, panicula laxa; petal. mollibus, breviter aristatis. *Hall. helv. n. 1326. All. Fl. Ped.*

In locis subhumidis, & umbrosis editiorum alpium 24.

luteus. J. planifolius; glaber; panicula nitente: fl. obtusis. *Hall. helv. n. 1329. All. Fl. Ped.*

Ad oras sylvarum in editioribus alpibus 24.

sylvaticus. J. fol. teretibus, articul. panicula repetito-ramosa. *Hall. helv. n. 1323. All. Fl. Ped.*

In locis humidis, præsertim montanis 24.

aquaticus. J. fol. compressis, articul. panicula semel ramosa. *Hall. Helv. n. 1322. All. Fl. Ped.*
Gramen iuncum &c. *Morif. hist. 3. f. 8. tab. 9. f. 2.*

In fossis, & ad oras aquarum stagnantium 24.

Tenageia. J. annuus, culmo ramoso, paniculato: fl. solitar. sessil. petal. ovato-oblong. caps. subglobo-sa. *Lin. Suppl.*

In Germania 25.

329. RICHARDIA. Cal. 6-part. Cor. 1--petal. subcylindr. Sem. 3.

1. *scabra*. R. *Syst. veg. ed. 14.*

In Vera Cruce 24.

Planta ex stellatis XLIV. tota pilis obsita. Caul. altus, brachiat. subarticul. obsoletere 4-gon. hispidus, pilis reflexis. Fol. subpetiol. lanceol-ovata, integerr. alterne nervosa, scabra. Fl. in capitula terminal. radiata fol. 4. vel pl. vel in verticillos congesti. Cor. ut in *Asperulis*, longæ, tenues, sed 6-fidæ; & fructus ex 3. femin.

530. ACRAS. Cal. 6-phyll. Cor. ovat. 6-fid. squamis totidem alternis interioribus. Pomum 10-locul. Sem. solitar. hilo marginali, apiceq. unguicul.

1. *mammosa*. A. fl. solitar. fol. cuneiformi-lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

A. *zapota ma. Jacq. amer. tab. 182. f. 19. ed. picta tab. 51.*

Melus *persicu* &c. *Sloan. Jam. 2. tab. 218.*

Arbor *americ. &c. Pluk. alm. tab. 268. f. 2.*

In Amer. merid. h.

Arbor leviter lactescens, coma expansa, ampla, cortice fusco. Fol. plurima, 8 pollic. petiol. integerr. venosa, nitida. Fl. parvi, subalbidi, inodori. Fruct. subovati, 3-5-pollic. ferrug. n. Sem. maxima, fusca, nitida. *Demit ½ partem numeri.*

2. *sapota*. A. fl. solitar. fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. tab. 41. ed. picta tab. 60. Brow. Jam. tab. 19. f. 3.*

b. *Anona* &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 230. & tab. 169. f. 2. Catesb. car. 2. tab. 82.*

In Amer. merid. h.

Arb. 50-ped. Fol. alterna, petiol. 3-4-pollic. integerr. crassiusc. glabra. Pedunc. axillar. & ramei, breves. Cor. albida. Fruct. ovalis, ovatus, globosus, cortice fusco-ferrugin. carne albescente. Sem. atra.

Cortex trunci adstringens loco *Peruani* in febribus. Sem. decorticata sunt diuretica, in dysuria, stranguria &c. Fructus putrescere incipiens præfertur *Bromelæ Ananas.*

Ad pentandriam refert Jacq.

3. *dissecta*. A. fl. solitar. fol. cuneiform. emarginato-retusis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Insula Tonga h.

Habitus similis congeneribus. Rami teretes, crassif, tuberculati, apice foliiferi, & floriferi. Fol. sparsa, adproximata, petiol. glaberr. erecta, subtus rachide costata. Pedunc. ex omnibus axillis, solitarii, dependentes, 1-fl.

4. *salicifolia*. A. fl. confertis: fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed. 14. Brow. Jam. tab. 17. f. 4.*

Salicis folio &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 206. f. 6?*

In Amer. merid. 24.

Arbor fol. oblong. nitidis. Fl. infra frondes sparsi, parvi, pallide lutei.

- balata*. A. fol. ovato-obl. subtus cinereis: fructu Olivæformi, viridi. *Aubl. Guian. Hort. Mal. 4. tab. 5.*

In Guiana h.

531. *PRINOS*. Cal. 6-fid. Cor. 1--petal. rotata. Bacca 6-sperma.

1. *verticillatus*. P. fol. longitudinaliter serratis. *Syst. veg. ed. 14. Alcanna &c. Munt. phyt. tab. 51.*

Aquifolium &c. Duham. arb. 1. tab. 23.

In Virginia paludibus h.

Arb. trunco parvo, infirmo, viminibus lentis, cortice glabro. Fol. *Lauri*; petiol. ovata, glabra; inferior. obtusa, super. acumin. serraturis acutis, & in mucronem subulatum desinentibus. Fl. axillar. pedunculati, veluti umbellati, albi.

2. *glaber*. P. fol. apice serratis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cassine &c. Mill. did. tab. 83. f. 2.

In Canada h.

Arb. 12-ped. ramosus. Fol. alterna, petiol. oblong. persistent. glabra. Pedunc. axill. parvi, sæpius 3-fl. Cor. alba. Bacc. rubræ.

532. *DUROIA*. Cal. cylindric. truncatus. Cor. 6-part. Filam. nulla. Pomum hispidum.

1. *Eriophila*. D. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Anonyma Merian. Surin. tab. 43.

In Surinamo h.

Arb. ramis crassis, inæqual. apice hirsutis. Fol. terminal. plura, adproximata, opposita, subpetiol. spitham. obovata, obrusulc. integerr. costata, supra pubescent. subtus reticulata. Petioli brevissimi, hirsuti. Fl. terminal. congesti,

sessiles. Cor. similis *Nyctanth. sambach*, alba.
 Fruct. magnitudine ovi Gallo-pavonis, paulo
 maior, sphaericus, densissime pilosus, bene sa-
 pidus.

333. BURSE- Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Caps. carnosa, 3-
 RA. va v. 1-sperma.

1. *gummifera*. B. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 65. ed. piñā*
tab. 96.

Terebinthus &c. *Comm. hort. 1. tab. 77. Catesb.*
car. 1. tab. 37.

Betula &c. *Pluk. alm. tab. 151. f. 1.*

In Americ. calidiorē h.

Arb. sæpe procera, comosa, succo aqueo bal-
 samico scatens. Fol. vel simplic. vel ternata,
 aut impari-pinn. petiolata, setquipollic. utrimq.
 2-3. ovata, acuta, integerr. nitida. Racemi
 axillar. Fl. exigui. Petal. albicant. Fruct. virent.
 purpur. vel mixti. Sem. rubra.

334. BERBE- Cal. 6-phyll. Petal. 6. ad ungues glandulis 2.
 RIS. Germen cum stigmatibus orbiculato, magno eva-
 dit bacca 2-sperma.

1. *vulgaris*. B. peduncul. racemosis; spinis triplicibus. *Syst.*
veg. ed. 14. Black. tab. 163. Knorr. del. 2. tab.
B. Camer. epit. 86.

Crespino. Matth.

In Europæ sylvis, & ad sepes h.

Frutex 6-ped. spinosus. Fol. prima obovata,
 ferrato-ciliata, inarticulata: stipul. utrimq. den-
 te capillari terminatæ. Caulina alterna: ho-
 rum infimum subpinatifid. dentibus spinosis; re-
 liqua mutata in spinas 3-part. Fol. secundaria
 bina, oblonga, ferrata; inter fol. infima, &
 spinas occultantur fol. min. Racemi ramosi,
 penduli. Cor. lutea. Baccæ rubræ. *Var. ab-*
sque arillis: altera spinis simplic. in Syria.

2. *cretica*, B. peduncul. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

Lycium &c. *Alp. exot. tab. 20.*

In Creta h.

Fol. integerr. *Buxi*. Racemi subumbell. Sem. 3.

3. *ilicifolia*. B. fol. obovat. ferrato-spinosis: pedicellis elon-
 gat. cymosis: spinis digitato-spinos. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.

In Tierra del Fuego h.

Fol. ut in *Ilice*, rigida, breviss. petiol. basi in-
 tegerr. glaberr. subrus glauciora. Stipul. pal-
 maræ, Racemi terminal, breviss.

4. *sibirica*. B. pedunc. 1-fl. solitar. cernuis; spinis palmar. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gnet. 1784. tab. 6. Pall. it. 2. tab. P. f. 2.*
In montibus Altaicis, & Sibiricis h.
 Fruticul. subped. erectus, ramosus, rigidus. Lignum citrinum. Spicæ 5-7-9. raro ternæ. Fol. ovata, spinuis ciliata. Pedunc. axill. 1-fl. nudi. Baccæ obovat. rubræ.
535. CAPU- Germ. superum. Cal. o. Cor. 6-fid. Stam. intra
 RA. tubum. Stigma globosum. Bacca.
1. *purpurata*. C. *Syst. veg. ed. 14.*
In India 24.
 Arb. ramis brachiat. purpurascens. Fol. opposita, subpetiol. ovata (*Lonicera Xylostei*) acutiusc. integerr. annua. Florum fasciculi axillar. fol. breviores, purpur.
536. LORAN- Germ. inferum. Cal. o. Cor. 6-fida, revoluta.
 THUS. Stam. ad apices petalor. Bacca 1-sperm.
1. *tetrapetalus*. L. fl. ad articulos 4. verticillat. 4-petal. fol. subsessil. oppositis, oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In nova Zeelandia h.
 Folia integerrima.
2. *scurrula*. L. peduncul. 1-fl. congestis: fol. obovat. *Syst. veg. ed. 14.*
Viscum &c. Pet. gar. tab. 63. f. 8.
In China h.
 Frutex parasitic. Fol. palmar. opposita, petiol. integerr. glabra, altero latere paulo latiora. Fl. axillar. 3-6. propriis pedicellis. Germina inferne attenuata. Baccæ veluti pyriform.
3. *uniflorus*. L. racemis simpliciss. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 69. ed. picta tab. 100.*
In Domingo sylvaticis h.
 Parasitica. Fol. opposita, petiol. sæpe læsa, & difformia suboval. obtusa cum exiguo acumine, integra, glabra, venosa, coriacea. Racemi axillar. & terminal. Fl. parvi. Petala obtusa, patentiss. purpur. Bacca atra.
4. *europæus*. L. racemis terminal. simplicibus: fl. dioicis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. 1. tab. 30.*
In Austria quercubus, parasiticus, in Sibiria h.
 Planta parasitica, Quercuum ramis innascens, fruticosa, 4-ped. diffusa, dichotoma, cortice sulco. Fol. opposita, oblonga, obtusa, sub-

crassa, integerr. & obsolete repanda. Racemi
a 6. ad 12-fl. Cor. patentiss. parum olens,
flavo-viresc. Bacca teres, dein pyriform. tan-
dem subrotund. flavescens, nitida.

5. *americanus*. L. racemis subramosis, æqualibus: fol. ovatis.
Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 67. ed. 2.
tab. 98.

Lonicera &c. Plum. gen. ic. 166. f. 1.

In Amer. arboribus h.

Habitus Visci. Planta fruticosa, ramosa, fragi-
lis, diffusa, supra arbores innascens. Fol. dif-
form. avenia, coriacea, integerr. tessil. infe-
riora opposita; ramea alterna. Fl. multi, pen-
duli, sesquipedalic. pedunculati, coccin. Baccæ
nigræ.

6. *occidentalis*. L. racemis simplic. fl. irregular. Syst. veg. ed. 14.
Viscum &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 200. f. 2.
In Amer. arboribus h.

Statura prioris. Rami divaricati. Fol. ovata.
Spicæ lateral. oppositæ simplic. Cor. purpur.

7. *loniceroides*. L. fl. adgregato-capitat. Syst. veg. ed. 14.
Periclymenum &c. Pluk. alm. tab. 213. f. 5.
Itti Canni. H. mal. 7. tab. 29.

In Asia arboribus h.

Frutex ramis longis. Fol. opposita, petiolat.
ovat-lanc. obtusiusc. integerr. crassa, venosa.
Involuc. 5-phyll. Fl. sæpe pentandri.

8. *stelis*. L. racemis trichotom. peduncul. 3-gonis; fl. æ-
qualibus. Syst. veg. ed. 14.

In Cumanæ arboribus h.

Caul. frutescens, brachiat. ramis patent. Fol.
sæpe opposita, longa, vel ovata, subsessil. co-
riacea, glabra. Pedunc. axillar. Cor. luteo-
viridis.

9. *pentandrus*. L. racemis simplic. fl. 5-fid. fol. alternis, petiolat.
Syst. veg. ed. 14.

In India h.

Frutex ramis ad folia dilatatis. Fol. subnervia,
figura Lauri. Racemi axillar. solitar. seu bini.
Filam. 5. e medio laciniar. cor. antheris bre-
viora. Anth. longitudine cor.

10. *falcatus*. L. fol. linear. obtusis, lateralibus falcatis, glau-
cis: racemis axillar. pauciss. Syst. veg. ed. 14.
Lin. Suppl.

In Mudross. arboribus parasitica h.

- Fol. integerr. avenia, cana. Fl. falcari, fulvi.
31. spicatus. L. spicis quadrangular. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 68. ed. piñu tab. 99.
Habitat Carthagenæ h.
 Planta parasitica. Fol. opposita, petiol. obtusa, integerr. nervosa, pinguis, glabra. Spicæ axillar. oblong. crassæ, fulcatæ. Fl. pl. exigui, rubri, inodori. Bacca ovat-oblong. virefciens, apice rubro.
-
- pedunculatus.** L. racemis solitar. fl. ternis, pedunculat. ramis radicanlibus. Jacq. amer. p. 98.
In Carthagenæ sylvaticis h.
 Planta parasitica, fruticosa. Rami reclinati. Fol. 2-pollic. opposita, petiol. cordat-ovata, breviter acumin. integerr. coriacea, nitida. Racem. axillar. fol. breviores, simplic. sub 1-fl. Fl. parvi, inodori. Petal. alba.
- sessilis.** L. racemis solitar. simplicibus; fl. ternis, sessil. Jacq. amer. p. 99.
In Carthagenæ sylvæ h.
 Planta parasitica, fruticosa, habitu ompino prioris; at rami ut in L. spicato. Fol. sesquipollic. ovata. Fl. sessiles. Bacca e rubro--fordide virent.
- 337. HILLIA.** Cal. 6-phyll. Cor. 6-fida, longissima. Bacca infera, 2-locul. polysperm.
- 3. parasitica.** H. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 66. ed. piñu tab. 97.
In Amer. merid. h.
 Frutex repens, arboribus, & muris vetustis inhabitans. Caul. basi procumbent. glabri. Fol. 3-pollic. opposita, petiolat. ovalia, utrinq. acumin. integerr. glabra. Flos terminal. solitar. semipedal. sessilis. Cor. albido-flavesceus.
- 338. CANA-RINA.** Cal. 6-phyll. Cor. 6-fid. campanulata. Stigmata 6. Caps. infera, 6-locul. polysperma.
- 3. Campanula.** C. Syst. veg. ed. 14.
 Campanula &c. Hort. Cliff. tab. 8.
 Campanula canariensis &c. Pluk. alm. 104. 276. f. 1.
In insulis Canariis 24.
 Adfinis Campanulæ, sed differt fructificationis numero senario. Rad. tuberoso-fusiform. Caul. erectus, 3-pedal. articul. teres, lævis. Rami terni

terni e singulis caulis geniculis; superior. longioribus, apice dichotom. Ramuli alterni. Fol. (caulina & a, ramea opposita) petiol. hastata, densicul. venosa, laevia. Fl. e dichotomia ramorum superior. peduncul. cernui. Cor. rufa, intus laetior, fundo flavescente: lacin. nervis 3. purpur. Anth. flavæ.

539. **NANDINA**. Cal. polyphyll. imbricatus. Cor. 6-petal.

1. *donnelliana*. N. Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.

Nattæn, vel Nandin. Kämpf. am. exot. Fasc. V. pag. 776.

In Japonia b.

Caul. orgyal. erecti, fruticosi, laxi, superne ramosi. Rami vaginis fol. vestiti, flexuosi, apice foliosi. Fol. ternata, supradecomposita, petiol. Follol. subfessil. ovata, setaceo-acumin. integerr. glabra, margine reflexo. Fl. terminal. paniculati: panicula supradecompos. peduncul. & pedicell. angulatis. Cor. alba. Bacca extus rubra, intus alba, magnitudine Pisi.

540. **FRANKENIA**. Cal. subcylindric. 5-dent. persistens. Petal. 5.

KENIA. Stigm. 6-part. Caps. 3-valv. 1-locul.

1. *lavis*. F. fol. linear. confertis, basi ciliatis. Syst. veg. ed. 14.

Franca &c. Mich. gen. tab. 22. f. 1.

Polygonum &c. Barr. ic. 714. Bocc. mus. 1. tab. II.

In Europa austral. maritimis 24.

Planta parva, supina, glauca. Fol. Serpylli. Cor. purpur.

2. *hirsuta*. F. caulibus hirsutis: fl. terminal. fasciculatis. Syst. veg. ed. 14.

Nothria &c. Berg. cap. tab. 1. f. 2.

Franca &c. Mich. gen. tab. 22. f. 2.

In Apulia, Creta &c.

Planta supina. Caul. paniculato-dichot. Fol. Thymi, ad basin præcipue ciliata. Cor. violac.

3. *pulverulenta*. F. fol. obovat. retusis, subtus pulveratis. Syst. veg. ed. 14.

Franca &c. Mont. in Zann. tab. 79.

Anthyllis &c. Clus. hist. 2. p. 186.

In Italia, Narbonæ &c. litoribus ☉.

Caul. humifusi, palmar. ramosi, rubentes. Fol. opposita, vel quaterna. Fl. axillar. exigui, amæthistini.

Tom. II.

Z

- revoluta*. F. caul. frutesc. dichoromo, spitham: fol. ovatis, margine revolut. fl. axillar. sessil. albido-rufescent. siliquate 3-fid. *Forsk. Æg.*
In Ægypto b.
341. PEPLIS. Cal. 12--fid. Petal. 6. calyci inserta, interdum nulla. Caps. 2-locul. polysper.
1. *portula*. P. fl. apetalis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 64.*
Glaucoides &c. Mich. gen. tab. 18.
Glaux &c. Petiv. gen. tab. 41. Loef. pruss. tab. 20.
Vaill. parif. tab. 15. f. 5. Bocc. mus. tab. 84.
In Europæ inundatis 24.
 Caul. repentes, dodran-pedal. angulati. Fol. opposita, longe petiol. subrotun. glabra. Fl. axillar. sessil. Petal. fugacia, (si adint) elliptica, purpur.
2. *tetrandra*. P. fl. tetrandris, monopetal. *Syst. veg. ed. 14.*
Jacq. amer. tab. 180. f. 29. ed. 2. pida 103.
In Jamaica ☉.
 Plantula tenella. Rad. tubera distincta profert.
 Caul. procumb. 2-pollic. Fol. opposita, petiol. ovato-subcord. obtusa, integerr. glabriuscula.
 Stipul. parvæ, solitar. Pedunc. axill. solitar. breves, 1-fl. Cal. campanulat. limbo 8-fid. Cor. tubulosa, alba. Stam. 4. Germen tubo calyc. adnatum, Stigmata 2. Caps. infera, 2-locul. coronata, longitudinaliter dehiscens, valvul. 4. hemisphæric.
Non pertinet ad hoc genus Hompton. Journ. des Sçavans. 1785.

DIGYNIA.

342. GAHNIA. Cal. gluma 2-valv. irregular. Nectar. 2--valv. filamenta involvens. Stigm. dichotom.
1. *procera*. G. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*
In nova Zeelandia:
 Gramen semiorgyal. & ultra, *Schænis Africanis* simillim.
343. ORYZA. Cal. gluma 2-valv. 1-fl. Cor. 2-valv. subæqualis, semini adnascens.

- 1. sativa*. O. *Syst. veg. ed. 14. Cat. car. 1. tab. 14.*
An in Æthiopia? ☉.
 Planta graminifolia. Spica expansa. Sem. alba,
 dura, diaphana.
544. FALKIA. Cal. 1-phyll. Cor. 1-petal. Sem. 4.
1. repens. F. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Thumb. nov. pl.*
gen.
In cap. b. Spei inundatis.
 Herba, & structura fl. omnino *Convolvuli*, sed
 sem. nimis distant.
545. ATRA- Cal. 2-phyll. Petal. 2. sinuata. Stigm. capitata.
 PHAXIS. Sem. 1.
1. spinosa. A. ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Atriplex orient. &c. Buxb. cent. 1. tab. 30. Dill.
clth. tab. 40. f. 47. Herit. Stirp. Fasc. 2. f. 14.
In Media iuxta fluvios, & in Sibiria h.
 Fruticul. 1-2-cubit. spinosus adultus, cortice ci-
 nereo--fulco. Fol. parva, elliptica, cæsa,
 glabra. Ramuli fl. onusti. Cor. albido-purpur.
- 2. undulata*. A. inermis. *Syst. veg. ed. 14.*
Arbuscula &c. Dill. clth. tab. 32. f. 36.
In Æthiopia h.
 Caul. fruticosi, 1-2-cubit. pl. procumbenti--ere-
 ctiusc. Fol. frequentia, sparsa, petiol. semiun-
 guicul. ovato--obtusa, glabra, margine undu-
 lato; superiora sensim maiora. Stipul. ovato-
 obl. Bract. ovata. Fl. 3-4. spicati, axillar.
 Cal. 4-part. æqualis, lacin. ovatis, concavis.
 Pet. o. Stam. lanceol. Styl. 2--fid. Sem. su-
 brotund.

TRIGYNIA.

546. RUMEX. CAL. 6-phyll. foliol. duorum ordinum; quo-
 rum 3 exteriora; 3 interiora. Sem. 1. trique-
 trum.
Dantur spec. in quibus sexus est tota planta di-
stinctus.

* *Hermaphroditi: valvulis granulo notatis.*

- 1. Patientia*. R. fl. hermaphr. valvul. integerr. unica granifera:
 Z ij

- fol. ovat-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 489.*
Lapathum sativum. Dod. pempt. 648.
Hippolapato. Matth.
In Italia, Germania, ad rivulos aquarum in al-
pibus 24.
 Caul. sulcatus. Fol. Hippolapatho min. sed ma-
 iora Oxylapatho, cordata, acumine obtuso:
 feminalia sagittata, ut *R. acetosæ*.
 2. *sanguineus*. R. fl. hermaphr. valvul. integerr. unica granifera:
 fol. cordat-lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Black.*
tab. 492.
Lapathum rubens. Dod. pempt. 650.
In Virginia, Germania quasi sponte 24.
 Fol. acuta, obscure virent. glabra, venis rubris,
 succo sanguineo. Fl. albido-fusci. Valvula
 exterior fl. grano magno, globofo, rubro no-
 tata; rarius altera grano minimo.
 3. *verticilla-* R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. omnibus gra-
tus. niferis: fol. lanceol. vaginis cylindric. *Syst.*
veg. ed. 14.
In Virginia 24.
 Fol. longa, angusta, acuta. Fl. ad genicula
 verticillati.
 4. *Britannica*. R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. omnibus gra-
 niferis: fol. lanceol. vaginis obsoletis. *Syst.*
veg. ed. 14.
In Virginia 24.
 Caul. ruber. Fol. magna, sature virent. glabra.
 Fl. herbido-fusci.
 5. *crispus*. R. fl. hermaphrod. valvul. integris, graniferis:
 fol. lanceol. undulat. acuris. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. Muntin. Brit. tab. 190. Tabern.
lc. 436.
In Europæ fossis 24.
 Caul. 3-ped. & ultra. Fol. plicata, crispa, splen-
 dide virent. ima obtusa, super. longe lanceol.
 Racemi subnudi. Fl. herbaceo-fusci.
 6. *perficario-* R. fl. hermaphrod. valvul. dentatis; omnibus gra-
ides. niferis: fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia ☉.
 Planta spitham. ramosiss. Fol. alterna, petiol. lan-
 ceol. integra, undata, lævia. Floris valvula
 dentibus utrimq. 3. longis, granis magnis, pal-
 lidis. Panicul. ex racemis alternis.

7. *egyptius*. R. fl. hermaphrod. valvul. 3-fido-setaceis, unica granifera. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. *Till. pisf. tab. 37. f. 1.*
In Ægypto ☉.
Fol. *Parietariæ*. Capsula sem. longe barbata.
8. *dentatus*. R. fl. hermaphrodit. valvul. dentat. omnibus graniferis; fol. lanceol. *Syst. veg. ed. 14. Nov. Comm. Goit. Vol. 3. tab. 10.*
Lapathum &c. *Dill. elth. tab. 158. f. 191.*
In Ægypto ☉.
Caul. spitham. erectiusc. basi ramosus. Fol. petiol. obliqua. Fl. laterales, conferti. *Differt a priore potissimum valvularum fl. dentibus minime setaceis. A. R. persicarioide, valvular. apicibus lanceol. nec subulat.*
9. *maritimus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. *Bocc. musf. 2. tab. 104.*
In Europæ littoribus maritimis ☉.
Radix rubra. Fol. læte virent. duriuscula, glabra. Fl. aurei.
10. *divaricatus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordat-oblong. obtusus, pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. *Till. pisf. tab. 37. f. 2.*
In Italia ☉.
Caul. longe brachiatus. *Cum R. pulchra coniungit Hall.*
11. *acutus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordato-obl. acuminat. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. *Black. tab. 491. Munting. Brit. tab. 189.*
Lapathum, seu Oxylapathum. *Bauh. hist. 2. p. 983. Lob. ic. 284.*
Oxylapathum. *Fuchs. 491.*
In Europæ fossis ☉.
Rad. extus fusca, intus flava. Caul. 3-pedal. Fol. longe lanceol. plana, serrata, venosa, glabra, læte virent. Pedunc. prope basin articulati. Panicul. diffusæ, laxæ, spicatæ. Fl. albido-fusci.
12. *obtusifolius*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. graniferis: fol. cordat-obl. obtusiusc. crenulat. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. *Lob. ic. 284. Cam. epit. 218.*
Z iij

HEXANDRIA TRIGYNIA.

Hippolapathum &c. *Muntin. Brit. 1.5. 187.*

In Europa, ad vias, & in pratis 24.

Rad. extus fusca, intus lutea. Fol. obscure virid. duriora, venosa; radicalia longe, caulina breviter petiol. Fl. albido-fusci.

13. *pulcher*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. subunica granifera: fol. radical. panduriform. *Syst. veg. ed. 14.*
Lapathum &c. Till. pis. tab. 37. f. 2. Moris. hist. 3. f. 5. tab. 27. f. 13. Bauh. hist. 2. p. 988.
In Europa, ad vias 24.

Caul. prostrati, difformes, angulati. Fol. sordide virent. glabra, venosa, nervis hirsutis; superior. lanceol. crispa. Fl. verticillati, albido-fusci. Rami floriferi, recurvati.

** *Hermaphroditi: valvulis granulato destitutis, seu nudis.*

14. *bucephalophorus*. R. fl. hermaphrod. valvul. dentat. nudis: pedicel. planis, reflexis, incrassatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. Col. ecphr. 1. tab. 150.

In Italia calidiore, arvis, & locis sabulosis ☉.

Caul. vix palm. ramosus. Fol. *Ocymi* similia, ovalia, fescunc. lata, alterna, longe petiol. nitroso veluti pulvere adpersa. Fl. semper terni, herbidi, lutescent.

15. *aquaticus*. R. fl. hermaphrod. valvul. integerr. nudis: fol. cordat. acutis, glabris (surrectioribus, rigidioribus). *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 490.*

Lapathum palustre. Tabern. ic. 437.

Hippolapathum. Dalech. hist. 604.

Herba Britannica. Munt. brit. tab. 1.

In Europa ad ripas fluviorum &c. 24.

Fol. mire variant. Rad. intus flava. Fol. super. longiora, margine undato. Racemi longi, laxi; fl. verticillat. Valvul. cordat.

16. *Lunaria*. R. fl. hermaphrod. valvul. lævibus: caule arboreo: fol. cordat. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa arborefc. &c. Pluk. alm. tab. 252. f. 3.

In Canariis 5.

Fol. subrotun. succulenta. Panícula oppositifol. Flos 3-nec 6-part.

17. *vesicarius*. R. fl. hermaphrod. geminatis: valvul. omnibus maximis, membranac. reflexis: fol. indivisis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 28. f. 7.*

In Africa ☉.

Petiol. longiss. Valvul. albæ.

18. *roseus*. R. fl. hermaphrod. distinctis: valvulæ alterius ala maxima membranac. reticulata: fol. erotis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. *Shav. afr. 5. f. 5.*

In Ægypto ☉.

Valvul. uncial. orbiculat. basi 2-fid. quod non in seq.

19. *tingitanus*. R. fl. hermaphrod. distinctis: valvul. cordat. obtusis, integerr. fol. hastato-ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. *Mont. in Zann. tab. 6. Morif. hist. 2. f. 5. tab. 28. f. 8.*

In Barbaria, Hispania ☿.

Caul. pedat. ramosi. Fol. petiol. ovata, acuminat., subscabra, basi subaristata, juxta basin erosa, margine scaberrima, & fere inæqual. cum maculis sanguin. Racemi longi, fl. 5-3. propriis pedicell. ad singulos dentes racemi. Valvul. nudæ.

20. *scutatus*. R. fl. hermaphrod. fol. cordato-hastat. caul. tereti, (arapite). *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. *Mont. in Zann. tab. 8. Black. tab. 306. Morif. hist. 3. f. 5. tab. 28. f. 9. Zannich. Venet. tab. 87.*

b. *A. cambabritann. Mont. in Zann. tab. 7.*

In Helvetia, Gallo-provincia, montanis locis inter congestos lapides ☿.

Ludit in fol. forma. Color plantæ glaucus, aut pallidus. Caul. cubit. Fol. sigittata, mucronibus longis. Vagin. lanceol. Spicæ raræ, ramosæ.

21. *digynus*. R. fl. hermaphrod. digynis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 14.*

Acetosa &c. *Morif. hist. 3. f. 5. tab. 36. fig. penult.*

Pluk. alm. tab. 252. f. 2. Blair. Obs. tab. 67.

In alpb. Helveticis, Lapponicis &c. ☿.

Fol. crassiusc. firms, glabra, venosa, satüre virentia; radical. iuniora longe petiol. integra; adulta apice rotundato, & submargin. Stipul. retusæ, albæ. Fl. multi, & albid.

22. *arifolius*. R. caul. lævi, subfrutesc. fol. cordato-hastatis, acutis, ferrulat. valvul. nudis, integerr. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

R. Abyssinicus. Jacq. hort. 3. tab. 93.

In Abyssina 24.

Caul. pl. 10-ped. erecti, fruticosi, foliosi, supra medium ramosi, nodosi, pallent. vel purpur. Fol. inferiora cordat---hastata, lobo medio elongato, acuta, subundul. margine eroso-crenata, venosa, glabra, acida, alterna, petiol. Petioli membranac. fusco-pallent. summa lineari-lanc. acumin. integerr. Panicula laxa. Petal. pallida. Sem. nitidum. *Differt a R. tuberoso, rad. non tuberosa, & sexu florum. A. R. tingitano, statura, caule erecto; & colore florum.*

*** *Floribus declinis.*

23. *alpinus*. R. fl. hermaphrod. sterilibus, femineisq. valvul. integerr. nudis: fol. (*inferioribus*) cordat. obtusis, rugosis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 262.*

Lapathum &c. *Bauh. hist. 2. p. 967. Clus. hist. 2. p. 69.*

In Helvetia, Gallia australi &c. circa domos alpinas 24.

Rad. intus flava, & purpurasc. Surcul. flavesce. Caul. crassius, ramosus, brachiat. Fol. petiolis striatis, & rubentibus innixa, e viridi-lutescent. ad petiolum utrimq. aurita, plicata: caulina lanceol. Vagin. sub fol. & ramis amplæ. Spicæ floral. paniculatæ, densiss. multiss.

24. *spinosus*. R. fl. androgynis: calyc. femin. 1-phyll. valvul. exteriorib. reflexo-uncinat. *Syst. veg. ed. 14. Beta cretica* &c. *Bauh. hist. 2. p. 962.*

In Creta ☉.

Caul. pl. procumb. dodrant. ramis paucis, alternis. Fol. cordat-ovat. vel oblong. vix sagittata, obtusa, petiolat. pallide virid. radical. multa: caulina remota.

25. *tuberosus*. R. fl. dioicis: fol. lanceol-sagittat: hamis patentibus. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 3.*

Oxalis tuberosa. *Dod. pempt. 649.*

In Italia 24.

Aufinis nimium R. *Acetosæ, & veluti hybrida.* Rad. omnino *Filipendulæ*. Caul. erectus, cubit. simpl. Fol. infer. longe petiolat. superiora sessil.

26. *multifidus*. R. fl. dioicis: fol. hastatis, auriculis hastatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Acetosa &c. *Bocc. mus. 2. tab. 126.*
In alpinis Hetruria, Calabria, Orient. 24.
 Caul. pedales.
27. *Acetosa*. R. fl. dioicis: fol. oblong. sagittatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 230. Knorr. del. 2. tab. A 13.*
b. Oxalis crispata. Bauh. hist. 2. p. 990. Tabern. ic. 440.
c. Acetosa montana maxima. Bauh. hist. 2. p. 890.
d. Acetosa montana lato ari folio, rotundo. Bocc. mus. tab. 125. 126. All. Fl. Ped.
In Europa pascuis: var. in alpi. 24.
 Sub quolibet ramo bractea oblong-acumin. Fl. albido-virent.
Var. d. Fol. plana, non undulata, non sinuata, triangularia: ima petiol. obtuse sagittata; caulina sessili-amplexicaul. Caulis humilior. Est planta dioica.
28. *Acetosella*. R. fl. dioicis: fol. lanceol-hastat. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 307. Knorr. del. 2. tab. A. 14.*
Acetosa &c. *Zann. tab. 5.*
Oxalis &c. *Bauh. hist. 2. p. 292. Tabern. ic. 440.*
b. Oxalis minima &c. *Tabern. ic. 441.*
c. Oxalis &c. 2. *Tabern. ic. 441.*
d. Acetosa &c. *Bocc. mus. tab. 26.*
Oxalide minore. Matth.
In Europa pascuis, & arvis arenosis 24.
 Caul. dodrant. Fol. longe petiol. angusta: inferiora mire variant; superior. lingulata. Fl. paniculati. Pedunc. inarticul. Fl. herbido-fusci.
Var. fol. non lanceol.
29. *aculeatus*. R. fl. dioicis: fol. lanceol. petiolat. fructibus reflexis; valvis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Acetosa &c. *Bauh. prodr. tab. 55.*
Oxalis minor &c. *Bauh. hist. 2. p. 991.*
In Creta, Hispania 24.
Simil. R. Acetosella, sed fol. basi attenuata, absque hamis. Florum femineorum interiores valvula ciliata, aculeis minimis.
30. *luxurians*. R. fl. dioicis: fol. cordat-hastat. caulibus angular. diffusis: valvul. exterioribus subulat. interioribus orbiculat. *Syst. veg. ed. 14.*

Acetosa &c. *Bocc. mus. tab. 126. Conf. Pluk. phyt. 331. f. 2.*

R. luxurians. Lin. Suppl. differens est, monente Vahl.

In alpinis Bononiensibus H.

Rad. Filipendula, tuberosa. *Caul.* in horto pedalesquiped. copiosi, prostrati, ramosi, pentagoni, striati. *Fol. Acetosæ* longiora, ambitu cordata, hastata, figura *Ari maculati*, acidiff. margine purpurasc. undulato, vix crenulato. *Panicula* terminal. divaricata, composita. *Differt a R. scutato caul. angulato, nec tereti; fol. cordato-hastat. nec lanceolat-sagittatis.*

31. *bipinnatus. R. fl. dioicis: fol. bipinnat. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Marocco H.

Caul. ascendens. spitham. læves. *Fol.* cordata, 2-pinnatifid. lacin. fere ad costam dissectis, singulis pinnatis, seu dichotomis. *Stipul. membranæ, diaphanæ, albæ. Racemus* terminal. compositus. *Cal. obrusus.*

Nemolapathus.

R. fl. hermaphrod. valvul. linear. obtusis, integerr. graniteris: verticillis remotis: ramis patentibus: fol. inferior. cordat-lanceol. superior. lanceolat. Lin. Suppl.

In Germania H.

hydrolapathus. R. (Lapathum) fl. hermaphrodit. unica, & exterior. valvula granifer. fol. planiuscul. racemis foliosis. Scop. Fl. Carn. Lob. ic. p. 286.

In locis udis.

Tardius floret; & tota facie a R. crispo diversus.

alpestris.

R. (Lapathum) fl. dioicis: peduncul. ad articuli locum crassioribus: fol. imis cordato-sagitt. segementis acuminat. petiolis duplo longioribus. Scop. Fl. Carn.

In alpinis.

Differt a R. Acetosæ, & Acetosella, fol. spathuliform. pedunc. articulatis: bracteis amplexicaul. 3-fl. ruptura facile pedicellorum ad articuli sedem: fol. maioribus &c.

conglomeratus. R. (Lapathum) petiol. latefcentibus: fol. longe lanceol. fl. verticillat. verrucosis. Hall. hist. n. 1390.

In suffr.

Caul. erectus, 1-2-ped. sulcatus. Rami distantes, erecto-patent. Fol. ovat-lanceol. planiuscula. Verticilli numerosi, remoti. Fl. copiosi, glomerati, reflexi. Valvul. granulo purpur.

glaber. R. fl. masculis 6-petal. calyc. nullo. Forsk. *Æg. In Arabia* ☉.

Naturali ordine convenit cum Rumice, sed cor. mascula abluat. Caul. pl. decumbent. spitham. Fol. radical. & caulina maxima, (superior. min.) petiolat. triangulari-ovat. acuta, subrepanda, crassa, margine scabra. Stipul. membranac. vaginantes.

comosus. R. fl. spicato-comosis; valvul. dentat. altera granifera. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

An R. ægyptius? Syst. veg. ed. 14. sed hinc valvula cor. non 3 fida, sed. 5-7-fid. & stlos deficient.

Flos deficit 3a. parte. Caul. procumb. sesquipollic. simplex, ruber, infra nudus, supra undiq. spicatus; fl. breviter pedunculat. confertis; erectis dum florent, reflexis fructu maturo. Spica inter fl. emittit fol. petiol. lineari-lanceol. subrepanda: ex apicæ coma exit minorum folior. oblongor.

pidus. R. fl. declinis, monoicis; valvul. femineis integris, graniferis: fol. linear. pinnatifido-dentat. Forsk. *Æg.*

In Arabia.

Fl. racemosi, valvul. albidis, ad margines venis rubris pulcherrime pictis.

Lachnus. R. fol. caulinis lato-lanceol. Forsk. *Suppl. Æg. In Natolia.*

Fol. petiolis basi vaginantibus: radical. spathulata, obtusa. Fl. valvul. integris, graniferis.

547. FLAGEL- Cal. 6-part. Cor. o. Bacca 1-sperm. *Adfinitas LARIA. proxima Calami.*

1. *indica.* F. *Syst. veg. ed. 14.*

Palmiuncus &c. *Rumph. amb. 5. tab. 59. f. 2.*

Panambu-valli. Hort. mal. 7. tab. 53.

In Java, Malabar, Zeylona h.

Frutex huiusmodi altitudinem superans. Rami distichi. Fol. arundinac. alterna, vaginant. cirrho terminata ut in *Gloriosa*, virore fulco, & ni-

tente. Caul. subignosi, e viridi-fusci. Panicula parva. Fl. Junci. Petal. rotundiora, parum cuspidata, circa se mutuo convoluta, primum albida, dein virescent. Baccæ rotundæ rubicundæ.

548. SCHEU- Cal. 6-part. Cor. o. Styli o. Capf. 3. inflatæ, CHZERIA. 1-sperm. Fol. graminea.

1. palustris. S. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 76. Fl. Lapp. tab. 10. f. 1.

Juncus &c. Rudb. elys. 1. p. 110. f. 2.

Gramen &c. Loef. pruss. tab. 28.

In Helvetiæ, Germaniæ, Lapponiæ &c. paludosis 24.

Planta graminifolia. Culmi pedal. geniculati, ad terram vaginis albis obsiti. Fol. convoluta, carinata. Stipul. amplexicaul. ovat-lanceol. Ex genicul. exit panicul. rara. Petala, seu calyc. lacin. lanceol. ex viridi-subluteæ. Capf. breves, rotundæ, latæ, planæ, 3-5-6. in quolibet fl. Sem. 1-2. raro-3. in qualibet capsula.

549. WURMBEA. Cal. 6-part. Cor. o. Capf. 3-locul. polysperm.

1. capensis. W. Syst. veg. ed. 14. Thumb. nov. pl. gen. p. 18. tab. Var. a. b. c. Ad. Medic. Svec. T. 1. tab. 16.

550. TRI- Cal. 3-phyll. deciduus. Petal. 3. calyciform. GLOCHIN. Styl. 3. aut 6. plumosi. Capf. 3-6. basi dehiscentes. Fol. graminea.

1. palustre. T. capsul. trilocularibus, sublinear. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 490. Ad. Stock. 1742. tab. 6. f. 1. 2. 3. Leers. herb. tab. 12. f. 5.

Calamagrostis. IV. Dalech. hist. 1006.

b. Juncago &c. Barr. rar. tab. 271.

In Europæ inundatis uliginosis h.

Planta graminifolia. Rad. fibrosa. Scap. a latere radice sequipalm. Fol. graminea, crassula, hinc convexa, inde plana, pallide virent. Spica longa, rara, multifi. fl. alternis. Petal. ovata, virid. roseo col. tincta; interiora tota rosea.

2. bulbosum. T. rad. bulbosa, fibris obtecta. Syst. veg. ed. 14. Ad cap. b. Spei.

Simile priori. Rad. setæ in fasciculum cespitosum congestæ. Scapus vix semiped. nudus. Fol. radicalia, filiformia, hinc subcanalicul. Tota minor prioræ, Stili 3. prostrati, & patentes; in prioræ erecti, & obsoleti.

3. *maritimum*. T. capsul. 6-locular. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Fl. Dan. tab. 306. Ad. Stock. 1742. tab. 6. f.
 4. 5.

In Europæ maritimis 24.

Culm. simpl. inferne violac. Fol. graminea, læte virent. tenera, glabra. Spica brevior *T. palustri*. Fl. albido-virent.

551. MELAN. Cor. plerumq. 6-petal. Filam. ex elongatis un-
 THIIUM. guibus cor.

1. *virginicum*. M. petal. unguiculatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Asphodelo &c. Pluk. amalt. tab. 414. f. 8.

In Virginia 24.

Caul. sub 2-ped. teres. Fol. Triticea, longa, fibris longitudinal. prædita. Panícula terminal. Cor. *Nigella*, obsolete flava, in medio, ob maculas cordatas, nigricans adparet.

2. *sibiricum*. M. petal. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad.*
2. tab. 11.

In Sibiria 24.

Rad. bulbosa. Caul. pedal. in medio cinctus fol. unico, lineari. Fol. radical. semipedal. in petiolium attenuata; nonnulla linear. acuminata, striata. Fl. paniculati. Cor. reflexa, alba.

3. *capense*. M. petal. punctatis: fol. cucullatis. *Syst. veg.*
ed. 14.

Ad cap. b. Spei 24.

Caul. palmar. simpl. Fol. amplexicaul. perfoliata, vagina superne dilatata; in caule 4. supremo, & infimo minimo. Petal. ovalia.

4. *indicum*. M. petal. lineari-lanceol. fol. linearibus. *Syst. veg.*
ed. 14.

In Tranquebaria 24.

Herba statura Orinthogali lutei. Rad. bulbosa. Caul. erectus, palm. simplex, lævis. Fol. caulina 3. linear. caule longiora. Pedunc. terminal. sæpius 2. altero 1. altero 2-fl. Fol. floral. 2. breviora, latiora. Fl. atro-purpur. Caps. 3-angular. magnitudine sem. *Coffea*.

5. *viride*. M. pedunc. 1-fl. cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Caul. semiped. foliosus, subpubescens. Fol. palmar. alterna, sessil. lanceol. erecta. Pedunc. alterni, laterifl. filiform. Petal. angusto-lanceol. patent. purpurasc. ex margine connivente, flavo.

6. *ciliatum*. M. petal. unguiculat. fol. basi cucullat. ensiform. cartilagineo--ciliatis: fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Fol. caule breviora. Petal. lanceol. alba.
7. *triquetrum*. M. fol. triquetris, glabris, caule longioribus: fl. spicatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
8. *monopetalum*. M. cor. monopet. fol. cucullat. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei 24.
 Rad. globosa, glabra. Caul. nullus, seu digital-palmar. simpl. vaginatus, teres, striatus. Fol. 3. alterna, vaginant. lanceol--subul. disticha, canaliculata, lævia, recurva. Spica pollicar. flexuosa. Fl. remotiuscul. alterni, albidii, dentibus margine atris. *Var. cor. albis, & purpur. margine nigro, & purpureo; tubo brevior, & longior.* Simil. *M. capensi, ut vix extent differentia specifica.*
552. MEDEOLA. Cal. o. Cor. 6-part. revoluta. Bacca 3-sper.
1. *virginica*. M. fol. verticillat. ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Lilium &c. Pluk. alm. tab. 328. f. 4.
In Virginia h.
 Fol. 6-7. sessil. lanceol. integerr. glabra. In summis ramulis 2-3. foliol. ex quorum alis exeunt peduncul. filiform. penduli, 1-fl. Cor. pallida.
2. *asparagoides*. M. fol. pinnat. foliol. alternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Sabb. hort. 4. tab. 54.
Asparagus &c. Till. pis. tab. 12. f. 1. 2.
Laurus &c. Herm. Lugd. tab. 681.
In Æthiopia h.
 Caul. cubit. flexuosi, ramosi. Fol. (aut ramosos dicas, multis dubium) *myrsifolia*, alterna, læte virent. nitida. Fl. penduli. Cor. extus virescens, petal. linearibus, a medio totaliter reflexis.
553. TRILLIUM. Cal. 3-phyll. Cor. 3-petal. Bacca 3-locul.
1. *cernuum*. T. fl. pedunculato, cernuo. *Syst. veg. ed. 14.*
Solanum &c. Catesb. carol. 1. tab. 45.
In Carolina 24.
 Rad. tuberosa. Caul. 2-3, octo--pollic. in quorum apice fol. 3. Flos oritur inter folia, natus.

2. *erectum*. T. fl. pedunculato, erecto. *Syst. veg. ed. 14.*
Solanum &c. Corn. Canad. tab. 167.
Solano &c. Morif. hist. 3. f. 13. tab. 3. f. 7.
In Virginia.
 Caul. ped. Fol. terna, opposita, orbiculata.
 Peduncul. terminal. Petal. obverse-ovata, atro-
 purpurea. *Bacca Solani hortensis magnitud.*
nigra.
3. *sessile*. T. fl. sessili, erecto. *Syst. veg. ed. 14.*
Solanum &c. Pluk. alm. tab. III. f. 6. Catesb.
car. 1. tab. 50.
In Virginia, Carolina 24.
 Caul. 6-pollic. simpl. in curvis apice fol. 3. ovali-
 acum. nutantia. Flos oritur inter fol. Petal.
 purpur.
554. COL-
 CHICUM. Spatha. Cor. 6-part. segmentis erectis, æquali-
 bus: tubo radicato. Capf. 3. connexæ, infla-
 tæ. *Numero jam. & spatha simpl. differt a Croco.*
1. *autumnale*. C. fol. planis, lanceol. erectis. *Syst. veg. ed. 14.*
Black. tab. 566. Knorr. del. 1. tab. Z. 1. Camer.
epis. 845. Lob. ic. 143. Matth.
 b. C. fl. pleno.
 c. C. vernum. *Bauh. pin.*
In Europæ pratis 24.
 Bulbus tubcordat. cuticula lutea testus. Fol. pe-
 rampa, Liliacea. Cor. dilute purpur. Fructus
 sessil. C. vernum habet fol. & petal. paulo an-
 gustiora.
2. *montanum*. C. fol. linear. patentiss. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Ped.*
tab. 74. f. 2. Clus. hisp. tab. 267.
In Hispania, Helvetia &c. 24.
 Pluribus notis differt a C. *autumnali*. Floret
 Junio, non Autumno. Radix globosa, tuni-
 cata: folia vaginant. una cum flore erumpunt.
 Eadem primum latiuscula, ovata, dein fere
 linear. virid. & fl. paulo breviora. Cor. an-
 gustior, linear. 2-pollic. violac. Tuba profunde
 3-fida. Altitudo totius plantæ paulo ultra di-
 gitum.
3. *variegatum*. C. fol. undulatis, patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
Morif. hist. 3. f. 4. tab. 3. f. 7.
In Chio insula.
 Cor. *Fritillariæ* instar tessulata.
555. HELONIAS. Cal. o. Cor. 6-petala, subconica. Capf. 3-
 locul.

1. *bullata*. H. fol. lanceol. nervosis. Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 3. tab. 1. f. 1.
 Veratrum &c. Mill. ic. tab. 272.
 Ephemerum &c. Pluk. alm. tab. 174. f. 5. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 2. f. 1.
 In *Pensylvaniæ paludosis* H.
 Rad. carnosa. Caul. erectus, simpl. teres, vestitus squamis remotis, lanceol. ad basin vero confertis, ovatis. Fol. radicalia, acuta. Racemus terminal. ovatus, purpurasc. Pedunc. simplic. Flosculi bullati.
2. *Asphodelo-*
ides. H. fol. caulinis setaceis. Syst. veg. ed. 14.
 Asphodelus &c. Pluk. mant. tab. 342. f. 3.
 In *Pensylvania*.
 Caul. 2-ped. simpl. Fol. alterna, seu sparsa, erecta, lævia, margine scabra. Racemus terminal. simplex, pedunculis fl. longioribus. Cor. alba. Simil. *Asphodelo*, sed styli 3. recurvati.

TETRAGYNIA.

356. PETI-
 VERIA.
1. *alliacea*. CAL. 4-phyll. Cor. o. Sem. 1. apice aristis uncinat.
 P. fl. hexandris. Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 67. Ad. Stock. 1744. tab. 7.
 In *Jamaicæ nemorosis* h.
 Simil. *sequenti*. Caul. frutescens. Fol. alterna, foliatar. ovat-lanceol. ad basin angusta, integra. Spica axillar. Fl. alterni, remoti, sessil. albid. In *Amer. merid.* h.
2. *oſtandro*. P. fl. oſtandris. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. picta tab. 104. Plum. gen. 50. ic. 219.
 In *Amer. merid.* h.
 Planta fruticosa, 3-ped. Corpus penicillifor. quod germi adſidet, rubrum; in prior. album. Simil. *priori*: differt caul. brevior, strictiore; flaminibus 8. filament. purpur. nec albis; fol. rigidioribus, & omnino glabris.

POLYGYNIA.

557. ALISMA. **C**al. 3-phyll. Petal. 3. Sem. plura, five caps. compressæ, 1-sperm. margine cinctæ. Involuc. 3-phyll. fl. colligens. Fl. paniculatæ, pedicellis verticillatis.
1. *Plantago*. A. fol. ovat-acutis: fructibus obtuse 3-gonis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 361.*
Plantago aquat. Cam. epit. 264. *Dod. hist. 606.*
Piantagine acquatica. Matth.
In Europæ aquosis 24.
 Caul. cubit. nudus. Fol. longe petiol. nervis apice confluentibus, crassa, rigida, glabra, venosa, sature virid. quandoq. fol. juncea. Rami verticillor. inferiorum umbelliferi. Panicul. magna, laxa, racemis verticillat. Petal. inaperta, rosea.
2. *flava*. A. fol. ovatis, acutis: peduncul. umbellat. fructibus globosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Damaſonium &c. Plum. sp. 7. ic. 115.
In Amer. merid. 24.
 Planta stolonifera. Petiol. longiss. triangular. Fol. crassa, nervosa. Pedunc. nudi, triquetri. Cor. flavesceus.
3. *Damaſonium*. A. fol. cordat-oblong. fl. hexagynis: capsul. subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Plantago aquat. min. altera. Lob. ic. 301.
Damaſonium &c. Dalech. hist. 1058.
In Angliæ, Galliæ &c. aquosis.
 Caul. ped. gracilis, teres, pallide virens. Fol. latitudine varia, crassa, nervosa, glabra, obscure virid. Cor. alba. Fruct. radiatus.
4. *cordifolia*. A. fol. cordat-obtusis: fl. dodecandris: fructibus uncinato-mucronat. *Syst. veg. ed. 14.*
Sagittaria &c. Moris. hist. 3. f. 15. tab. 4. f. 6.
Ranunculus &c. Plum. sp. 7. ic. tab. 234. f. 2.
In Amer. austral. & septentr. 24.
 Media inter *Alifmas*, & *Sagittarias*. Planta natans. Petiol. longiss. 3-goni, ex lata basi angustati. Fol. decemnervia. Pedunc. 6-7. terminal. Fl. parvi, albi.
- Tom. II, A a

5. *natans*. A. fol. ovatis, obtusis: peduncul. folitar. *Syst. veg. ed. 14.*
Damaconium &c. *Vaill. Ad. 1719. tab. 4. f. 8.*
In Gallia, Germania &c. fossis.
 Caul. fluitans. Fol. nervosa, glabra, læte virid.
 Fl. nonnulli ex eadem spatha. Cor. alba. Caps.
 sæpius 8.
6. *ranunculo-*
ides. A. fol. lineari-lanceol. fructibus globoso-squar-
 rosis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 122.*
Plantago aquat. humilis &c. *Bauh. hist. 3. p. 738.*
Lob. ic. 300.
Ranunculus &c. *Pet. gar. tab. 26. f. 12.*
In Europæ fossis 24.
 Scap. spitham-pedal. teres. Fol. petiol. nervosa,
 glabra, pallide virent. Fl. verticillato-panicul.
 Cor. parva, alba.
7. *subulata*. A. fol. subulatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Virginia.
 Cor. alba.
8. *parnassifo-*
lua. A. fol. cordatis, acutis; petiolis articulatis. *Syst.*
veg. ed. 14.
Ranunculus &c. *Till. pif. tab. 46. f. 1.*
In Apenninorum paludibus 24.
 Statura A. *plantaginis*. Fol. longe petiol. vix
 acuta, lævia. Petiol. vix articulati. Scap. flo-
 ridus omnino A. *Plantaginis*. Cor. alba. Sem.
 arillata.

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

RIPOGONUM.

P *Cal.* P *Erian. inferum*, 6-phyll. foliol. erectius-
 cul. lanceol. acutis.
Cor. nulla.
Stam. Filam. 6. minuta.
Anth. linear. 4-gon. erectæ, calyc. triplo lon-
 giores.

Pistil. Germ. globosum: styl. filiform, longitud. calyc. Stigm. obtusum.

Peric. Bacca globosa, 2-sperm.

Sem. solitar. hemisphærica.

Genus Smilaci proximum.

x. scandens. R. Forst. gen.

In Insulis maris Austral.

Planta geniculata, & viminea.

RAVENALA.

Cal. Spatha multifi. ovata, lanceol. carnosa, dura.

Cor. 4-part. laciniae longæ, acuminat. angustæ, 7-8-pollic.

Stam. Filam. 6. cor. fere æqual. parum reflexa.

Anth. linear.

Pistil. Germ. longum. Styl. 8-pollic. angulatus.

Stigm. dentatum.

Peric. Caps. oblon. coriacea, 3-angul. 3-locul. polysper.

Sem. nigra, cuticula cœrul. testa.

x. Madagascariensis. R. Sonnerat. *Voyag. tab.* 126.

In Madagascar. h.

Adfinitas cum Musa, & Heliconia, sed caps. 3-locul. polysperm. Truncus altus, erectus, simul. ob fol. lapsum cicatrixatus. Fol. strobilum expansum referunt. Foliol. Musæformia, sed spissiora. Petioli 2-ped. amplexicaul. lata basi. Fl. axillar. in spathis alternis.

A DENIA.

Cal. Perian. longiss. teres, 2-pollic. sursum crassius, limbo 6-fid. lacin. oblong. obtusis, recurvis, semipollic. albidis.

Cor. 6-petal. inserta inter lacinias calycinas, lineari-lanceol. curva, calyc. breviora. Nectar. squam. 6. linear. erectæ, truncatæ, inter calyc. & quodvis filament. singula in eorum iunctura.

Stam. Filam. 6. filiform. inserta calyc. tubo ad basin, dein parum connata, mox libera, calyc. breviora, alba.

Anth. erectæ, simplic. lineari-lanceol. flavæ.

Pistil. Germ. tubo cal. adnatum. Styl. oblongo-conicus, breviss. flavescens. Stigm. crassum, emarginatum.

A a ij

1. *venenata*. A. fol. palmatis: fl. spicatis. Forsk. *Æg.*

In Arabia h.

Truncus scandens, viridis, brachii crassitie. Rami alterni, flexiles, teretes. Fol. alterna, petiol. peltata, 5-loba, lobis versus medium mai: ovalibus. Cirrhi ex ramis lateralibus. Peduncul. ramuli conferti, in apice ramorum, breves, ramulosi. Fl. 2-3. sessil. albi.

LICARIA.

1. *Guianensis*. L. *Aubl. Guian. tab. 121.*

In Caribæis h.

Arb. 60-ped. luperne ramosa. Fol. alterna, petiol. ovata, acun.in. integra, glabra, odore aromatico. Fl. & fructus desiderantur.

RAPATEA.

Involuc. 1-phyll. 2-lobum, lobis oppositis, basi amplif. apice angustioribus, longif. acutis. Fl. numerosi, congesti.

Ca. Perian. 1-phyll. 3-part. lacin. oblong. concavis, acutis.

Cor. 1 petal. tubus breviss. receptaculo germinis insertus: limbus 3-lobus, lobis oblong. ovatis, acutis, concavis.

Stam. Filam. 6. breviss. tubo cor. inserta.

Anth. oblong. 4-gon. in foliol. concavum, luteum desinentes.

Pistil. Germ. subrotund. 3-striat. Styl. longif. striatus: Stigm. 3. in spicam convoluta.

Peric.

Sem.

1. *paludosa*. R. *Aubl. Guian. tab. 118.*

In Guiana h.

Fol. longif. angusta, acuta, basi vaginant. mutuo se amplexantia, supra vaginam angustata, striata, integerr. glabra. Scapi pl. axillar. 2-ped. nudi, compressi, marginari, apice sensim latiores. Fl. in involucri collecti, peduncul.

GUAPIRA.

Cal. Periant. 4-5-phyll. lacin. brevibus, subrotund. acutis.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 373

Cor. monopetala, tubulosa, limbo patente, 4-5-dent.

Stam. Filam. 6. 3. longiora, 3. breviora, receptaculo pistil. inserta.

Pistil. Germ. ovat. styl. cylindric. Stigm. 5-6-fid. lacin. linear. acutis.

Peric. Drupa ovata, 1-sperm. 6-striata, coronata denticulo cor. evadens pulposa.

Sem. 1. membrana alba involutum.

1. *Guianensis*. G. Aubl. Guian. tab. 119.

In Guiana h.

Arb. medioc. magnitudinis, ramis oppositis, nodosis. Fol. opposita, petiol. ovat. acuta, integerr. glabra, in apice ramorum 3-4. verticillata. Fl. racemosi, albi. Drupa coccinea.

A I O U E A.

Cal. Periant. 1-phyll. subrotun. concavum, 3-dent.

Cor. Petal. 3. minima, calyc. intra divisuras inserta.

Stam. Filam. 6. ovata, superne latiora.

Anth. 1-locul. 1-valv.

Pistil. Germ. orbiculat. Styl. longus. Stigm. 6-fid.

Peric. Bacca subrotun. subcarnosa, 1-locul.

Sem. unicum, testa fragili testum.

1. *Guianensis*. A. Aubl. Guian. tab. 120.

In Guiana h.

Arb. 5-ped. superne ramosa. Fol. alterna, petiol. lanceol. integerr. glabra. Fl. axillar. & terminal. numerosi, minimi. Cor. sublutea. Bacca nigra, aromatica.

D I G Y N I A.

C A R O M B A.

Cal. **P**erian. 1-phyll. 6-part. lacin. 3. exterioribus ovatis, acutis, intus luteis; 3. interioribus ovatis, obtusis, luteis, petala mentientibus.

A a iij

Cor. nulla.

Stam. Filam. 6. singul. ad basin laciniar. inserta.

Anth. ovat. 2-locul.

Pistil. Germ. 2. oblon. Stryli breves. Stigm. obtusa.

Peric. Capsl. 2. ovat. subcarnosæ, stylo terminatæ, 1-locul.

Sem. numerosa, minutiss.

1. aquatica. *C. Aubl. Guian. tab. 124.*

In Caienna, & Guiana.

Planta in aquis demersa. Caul. pl. longi, ramosi, cylindrac. Fol. caulina opposita, petiol. in lacinias pl. tenuissimas, capillaceas, oppositas, plurisariam divisa. Fol. terminal. alterna, longe petiol. peltata, orbiculata, integerr. natantia. Fl. axillar. solitar. longe peduncul. Cor. lutea.



CLASSIS VII. HEPTANDRIA.



MONOGYNIA.

358. *Tridentalis*. Cal. 7-phyll. Cor. 7-pet. æqual. plana. Bacca exsucca, 1-locul. *Omnium partium numerus sæpe septenarius.*
359. *Disandra*. Cal. sub 7-phyll. Cor. rotata, sub 7-part. plana. Caps. 2-locul. polysperm. *Flos partium num. maxime variat.*
360. *Æsculus*. Cal. 1-phyll. ventricosus, 5-dent. Cor. 5-pet. inæqualiter colorata, calyci inserta. Caps. sub-rotun. 2-3-locul. 2-sper.

* *Gerania africana.*

DIGYNIA.

361. *Limeum*. Cal. 5-phyll. Cor. 5-pet. æqualis. Caps. globosa, 2-locul. polysper.

TETRAGYNIA.

362. *Saururus*. Cal. amentum squamis 1-fl. Cor. o. Germ. 4. Baccae 4, 1-sperm.
363. *Aponogeton*. Cal. amentum. Cor. o. Caps. 3-sper.

HEPTAGYNIA.

364. *Septas*. Cal. 7-part. Cor. 7-pet. Petal. oblong. æqual. Germ. 7. Caps. 7. oblong. acutæ, parallelæ, polysper.

M O N O G Y N I A.

558. TRIEN- **C**AL. 7-phyll. Cor. 7-part. æqual. plana. Bac-
TALIS. ca exsucca.
Omnium partium num. sæpe septenarius.
1. *europæa*. T. fol. lanceol. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 86.*
In Europ. borealis sylvis, & Juniperetis 24.
Planta parva. Rad. bulbosa. Fol. subfessil. simp-
plicia, terminalia. Fl. terminal. pedunculati.
Pedunc. 2-3. graciles. Pedicelli oblongi, te-
nues. Flos stellatus. Cor. alba. Stam. 5-7.
sæpius 6. cum totidem calyc. laciniis.
559. DISAN- Cal. sub 7-phyll. Cor. rotata, 7-part. plana.
DRA. Caps. 2-locul. polysperm. *Flos num. maxime variat.*
1. *prostrata*. D. *Syst. veg. ed. 14.*
Planta. *Pluk. phyt. 257. f. 5.*
In Oriente.
Caul. 1-2-pedal. prostrati, teretes, pubescent.
Fol. alterna, petiol. reniformi-orbicul. 30-
crenata, pubescent. Pedunc. axillar. 2--raro
1-3. erecti, filiform. 1-fl. Cor. lutea.
3. *africana*. D. *Syst. veg. ed. 14.*
Chrysosplenii &c. Shaw. afric. f. 149.
In Africa.
An sp. distincta a priore? Pedunc. solitar.
560. ÆSCU- Cal. 1-phyll. 5-dent. ventricosus. Cor. 5-petal.
LUS. inæqualiter colorata, calyci inserta. Caps. 2-
3-locul.
1. *Hippocastanum*. Æ. fl. heptandris. *Syst. veg. ed. 14.*
Castanea &c. *Clus. hist. 1. p. 7.*
In Asia septentrion. h.
Arb. speciosa, frondosa. Fol. digitata, in 5-7.
foliol. divisa, ovat-acum. serrata, subtus ner-
vosa. Racemi pyramidati. Petal. alba, ex ru-
bro mixta.
- Pavia*. Æ. fl. (sæpe) octandris. *Syst. veg. ed. 14.*
Pavia. Trew. chret. tab. 15. Barth. Lugd. 2. tab.
260. Hort. angl. tab. 19. Mill. ic. 198.
Saumoune &c. Pluk. alm. tab. 36. f. 4.
In Carolina, Brasilia h.

Truncus validus, spinis obsitus. Fol. prioris, acumin. ferrata. Fl. spicati. Cal. & cor. sanguinea. Cor. 4-petal. clausa.

DIGYNIA.

361. LIMEUM. Cal. 5-phyll. Petal. 5. æqual. Capf. globosa, 2-locul.

1. *africanum*. L. fol. oblong. petiolat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia.

Statura Corrigiolæ, seu Telephii. Caul. prostrati, spinam. debiles, angulati, nudi, basi perennant. Fol. parva, remota, alterna, subpetiol. lineari-lanceol. Corymb. terminal. solitarii, compositi, nudi, longe peduncul. Cal. segment. carinatis. Petal. parva.

2. *aphyllum*. L. fol. ovatis, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

humile.

L. fol. orbiculat-ovat. *Forsk. Æg.*

In Arabia.

Caul. prostrati. Fol. breviss. alterna, petiol. mucronata. Petiol. perexigui, amplexicaul. Cal. vix carinatus. Cor. acuta.

TETRAGYNIA.

362. SAURURUS. Cal. amentum squamis 1-fl. Cor. o. Germ. 4. Baccæ 4, monosper.

1. *cernuus*. S. caul. folioso, polystachio. *Syst. veg. ed. 14.*

Serpentaria &c. Pluk. alm. tab. 117. f. 4.

In Virginia 24.

Fol. alterna, cordat-acum. membrana ex adverso fol. caulem involvente. Fl. dense spicati, albi, dein virescent. Spicæ cacumen nutans. Stam. multa, longa, nigra.

378 HEPTANDRIA TETRAGYNIA.

563. APONOGETON. Cal. amentum. Cor. o. Capsul. 3-sperm.

1. *monostachion*. A. spica simplici: fol. cordat-ovalibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Saururus natans. *Syst. veg. ed. 13.*

Parya Kelanga. *Hort. Mal. 11. tab. 15.*

In Indix or. paludosis, inundatis 24.

Rad. bulbosa. Fol. radical. longiss. petiol. integerr. lævia, natantia. Scapi obsolete 3-goni, flaccidi. Spica simpl. 6-angul. spatha caduca tecla. Bractæ cor. loco 2. intra singulos flosculos, parvæ, clavatæ, obtusiusc. carnosæ, persistentes.

2. *distachyon*. A. spica bipartibili: fol. elliptico-lanc. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei in rivulis 24.

Rad. bulbosa. Fol. longissime petiol. radicalia, integerr. lævia, natantia, *Potamogetonis nantis*. Spica introrsum imbricata. Fl. alterni, erecti, albi, fragrantiss. bract. ovata excepti. Stam. a 6. ad 12. Bulbi affati eduntur.

HEPTAGYNIA.

564. SEPTAS. Cal. 7-part. Petal. 7. Germ. 7. Caps. 7. polysperm.

1. *capensis*. S. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 340. f. 9. Ad cap. b. Spei 24.*

Ordine naturali Saxigragis, & Sedis accedit. Scap. digital. filiform. Fol. radical. 4. obtusa, crenata, nuda: 2. infer. opposita mæ: subpetiol. subrotun. 2. super. opposita, sessil. ovalia, angustiora. Umbel. simpl. Pedunc. 7-8. filiform. 1-fl. nudi. Involucrum minimum.



CLASSIS VIII.
OCTANDRIA.
MONOGYNIA.

Fl. completi.

575. *Mimusops*. Cal. inferus, 4-phyll. Cor. 4-pet. Nectar.
16-phyll. Drupa acuminata.
565. *Tropæolum*. Cal. 1-phyll. erecto-patul. 5-fid. calcaratus, coloratus. Pet. 5, irregular. 2 super. sessil. 3 infer. unguibus ciliat. Baccæ 3, siccæ, 1-sper.
595. *Bacca*. Cal. superus, infundibulif. 5-dent. Pet. 5, subrotund. Caps. globosa, 4-locul. coronata.
585. *Memecylon*. Cal. superus, turbinato-cylindric. fundo striato, margine integerr. Cor. 1-pet. Anth. insertæ lateri apicis filamenti. Bacca coronatæ calyce.
572. *Combretum*. Cal. superus, campanulat. 4-dent. Cor. supera, 4-pet. parva, calyci inserta. Stam. longiss. Sem. 1. 4-angul. angulis membranac.
588. *Ophira*. Involuc. 2-valv. 3-fl. Cor. 4-pet. supera, petalis, oblong. conniventibus. Bacca 1-locul.
570. *Epilobium*. Cal. 4-phyll. superus. Petal. 4. sæpe 2-fid. Filam. calyci, non receptac. adhærent; longiora paulo altius inferuntur; inferiora infra; horum basis quodammodo villosa videtur. Caps. oblong. infera, 4-locul. Sem. papposa, *Differt ab Ænothera sem. min. papposis.*
569. *Gaura*. Cal. superus, 4-fid. longe tubulosus. Pet. 4. cordata, sursum flexa. Nux infera, 4-angul. 1-sper.
568. *Ænothera*. Cal. superus, 4-fid. tubo longo. Pet. 4. obverse cordata, patent. incisuris cal. inserta. Anth. linear. Caps. 4-valv. 4-locul. Sem. angulata.
567. *Rhæia*. Cal. 4-fid. tubulosus, basi ventricosus. Pet. 4-5. calyci inserta, subrotund. patent. Anth. ar-

- cuatæ. Capf. 4-5-locul. intra ventrem cal. sita.
566. *Osbeckia*. Cal. campanulat. 4-fid. persistens, lobis squama ciliari interlinctis. Pet. 4. subrotun. Anth. rostratæ. Capf. 4-locul. calyc. tubo truncato cincta.
577. *Grislea*. Cal. campanulat. 4-dent. inferus. Pet. 4. minima, ex incisuris cal. Filam. longiss. adscendentia. Capf. globosa, supera, 1-locul. polysper. Interdum $\frac{1}{2}$ pars additur fl. paribus.
578. *Guarea*. Cal. brevis, 4-dent. inferus. Pet. 4. linear. acuta, erecta. Nectar. cylindric. ore anth. gerens. Capf. globosa, umbilicato-4-fulca, 4-locul. Sem. solitar.
571. *Antichorus*. Cal. 4-phyll. inferus. Pet. 4. Capf. supera, subulata, 4-valv. 4-locul. polysper.
574. *Alloyia*. Cal. inferus, 4-phyll. segment. orbiculatis, oppositis minoribus. Pet. 4. orbiculata, calyce min. Germ. didymum. Stigm. 4-fid.
576. *Jambolifera*. Cal. inferus, minimus, 4-dent. Cor. infundibulif. 4-pet. Filam. planiuscula. Stigm. simpl.
584. *Lawsonia*. Cal. inferus, parvus, 4-fid. Cor. 4-pet. Stam. 4 parium. Capf. subrotun. 4-locul. polysper.
577. *Melicocca*. Cal. 4-part. segment. obrufis, patentibus. Pet. 4. reflexa infra calycem, æqual. oblong. Drupa magna, subrotun. corticosa. Stigm. peltat. anceps.
579. *Amyris*. Cal. parvus, 4-dent. inferus. Pet. 4. oblong. Stigm. 4-gon. Bacca drupacea, 1-sper.
587. *Xymenia*. Cal. parvus, 4-fid. Pet. 4. revoluta, concava, pilosa. Drupa 1-locul. 1-sper.
581. *Fuchsia*. Cal. o. Cor. tubo basi angulato; limb. 8-fid. plano, lacin. alternis inferioribus. Bacca infera, subrotun. 4-locul. Sem. plura, duplici serie.
582. *Chlora*. Cal. 8-9-phyll. Cor. monopet. 8-12-fid. Capf. 1-locul. 2-valv. polysper.
586. *Vaccinium*. Cal. superus, minimus, 4-5-dent. raro integer. Cor. monopet. 4-5-dent. Filam. receptaculo inserta. Bacca globosa, umbilicata, 4-locul. polysper.
587. *Erica*. Cal. inferus, 4-phyll. interdum duplex, coloratus. Cor. 4-fid. Filam. receptacul. inserta. Anth. 2-fid. Capf. parva, 4-valv. 4-locul. Fol. tenuissima.

- * *Æsculus Pavia*.
- * *Monotropa Hypopithys*.
- * *Ruta graveolens*.
- * *Jussieu erecta*; *suffruticosa*.
- * *Portulaca 4-fida*.
- * *Dais octandra*.
- * *Fagara octandra*.
- * *Melastomu octandra*.
- * *Elais serrata*.

** *Fl. incompleti*.

591. *Gnidia*. Cal. infundibulif. 4-fid. coloratus. Pet. 4. parva, calyci inserta. Stam. exserta. Sem. 1. subbaccatum, ovatum, in cal. *Differt a Passerina sola cor.*
594. *Lachnaa*. Cal. 4-fid. corollinus, inæqual. Stam. exserta. Sem. 1. subbaccatum, oblong. intra calyc. situm. *Differt a Passerina cor. tantum inæqual.*
590. *Dirca*. Cal. corollinus, tubul. fus, limbo subnullo, inæquali. Stam. exserta. Bacca 1-locul. 1-sper.
589. *Daphne*. Cal. corollinus, 4-fid. æqual. marcescens, tubo cylindrico, segment. ovatis, planis, patentibus. Bacca 1-sperm.
593. *Passerina*. Cal. o. Cor. 4-fid. æqual. marcescens; tubo cylindrico, tenui, inferne ventricoso, segment. concavis. Stam. tubo imposita. Sem. 1. corticatum.
592. *Stellera*. Cal. o. Cor. 4-fid. æqual. persistens; tubo longo, tenuiss. segment. ovatis. Stam. inclusa, breviss. Sem. 1. rostrat.
583. *Dodonæa*. Cal. 4-phyll. segment. ovatis, obtusis, concavis, deciduis. Cor. o. Caps. inflata, 3-locul. 3-fulca. Sem. bina.

* *Rivina octandra*.

DIGYNIA.

597. *Weinmannia*. Cal. parvus, 4-phyll. patens, segment. ovatis. Cor. 4-pet. Caps. ovar. 2-locul. 2-rostris, polysper.
598. *Mæhringia*. Cal. 4-phyll. patens. Pet. 4. ovar. calyc. min. Caps. ovar-conica, 4-valv. 1-locul. polysper.
599. *Codia*. Cal. 4-phyll. Cor. 4-pet. Receptac. comm. involucreatum.

595. *Schmiedelia*. Cal. 2-phyll. Cor. 4-pet. Pericar. 2. pedicellata.
 596. *Galenia*. Cal. 4-phyll. concavus, segment. oblong. Cor. o. Capf. subrotun. 2-locul. 2-sper.

* *Chrysosplenium*.

TRIGYNIA.

602. *Paullinia*. Cal. 5-phyll. patens. Pet. 4. patent. Nect. 4-phyll. inæqual. Capf. 3. connatæ, compressæ, membranac. Sem. solitar.
 603. *Cardiospermum*. Cal. 4-phyll. segment. alternis mi. Pet. 4. obtusa cum acumine. Nect. parvum, 4-phyll. inæqual. Capf. 3. connatæ, inflatæ. Sem. solitar. basi cordis effigiem referentia.
 604. *Sapindus*. Cal. 4-phyll. patens, coloratus, deciduus. Pet. 4. calyc. min. patula. Capf. 3. connatæ, carnosæ, ventricosæ. Sem. solitar.
 605. *Coccoloba*. Cal. 5-part. coloratus. Cor. o. Bacca calycina, basi 5-lob. 1-sper.
 606. *Polygonum*. Cal. coloratus, 5-part. persistens, segment. ovatis. Stam. 5-8. Styl. 1-3. Cor. o. Sem. 1. nudum, angulatum.

TETRAGYNIA.

606. *Adoxa*. Cal. 3-fid. inferus. Cor. supera, 4-5-fid. plana, Bacca 4-5-locul. calyce coalita. Sem. solitar.
 607. *Elatine*. Cal. 4-phyll. patens. Pet. 4. ovata, plana. Capf. depressa, 4-valv. 4-locul.
 608. *Paris*. Cal. 4-phyll. lacin. longis. Pet. 4. subulata, plana. Bacca 4-locul.
 609. *Haloragis*. Cal. 4-fid. Cor. 4-pet. Drupa sicca. Nux 4-locul.

* *Cotyledon laciniata*: nudicaulis.

* *Petiveria octandra*.

MONOGYNIA.

565. TROPÆOLUM. Cal. 1-phyl. calcaratus. Petal. 5. inæqual.
Biccæ 3. liccæ.
1. minus. T. fol. peltat. repandis: petal. acumin-setaceis.
Syst. veg. ed. 14.
Cardaminum &c. Fewil. per. 3. tab. 8.
Nasturtium indicum, Lab. ic. 516. f. 2. 1.
In Peru ☉ 24.
Fol. supra dilute virid. subtus pallidiora. Petal.
flavo-punicea.
2. maius. T. fol. peltat. sub 5-lobis: petal. obtusis. Syst.
veg. ed. 14. Knorr. del. 1. tab. R. 17.
Cardaminum &c. Fewil. per. 3. tab. 8.
Viola &c. Herm. lugd. tab. 629:
In Peru ☉ 24.
Caul. debiles. Fol. orbiculata, priore duplo ma:
Pedunc. axill. 1-fl. Cor. ampla, extus crocea,
intus cinnabarina, vel coccinea, odora.
3. hybridum. T. fol. subpeltat. 5-lobis, integerr. petal. va-
riantibus. Syst. veg. ed. 14. Ad. holm. 1765.
tab. 1.
Habitat nullibi; sed noviter orta a priore.
Fol. latius cuneata, nutant. petiolis triplo bre-
viora, nuda, nervosa, venosa, cucullata. Ne-
ctar. obtusum. Cor. vix umquam determinata.
4. peregrinum. T. fol. subpeltat. 5-lobis, dentat. petal. ciliato-
lucris. Syst. veg. ed. 14.
Cardaminum &c. Trew. per. 2. tab. 42.
In Peru ☉.
Fol. profunde 5-fid. lacin. media 3-loba. Petal.
vix calyce longiora.
566. OSBECKIA. Cal. 4-fid. lobis squama ciliari interstinctis. Cor.
4-pet. Anth. rostratæ. Caps. 4-locul. calycis
tubo truncato cincta.
1. chinensis. O. fol. sessilibus: pedunc. axillar. 3-fl. bractea-
tis. Syst. veg. ed. 14. Obs. it. 213. tab. 2.
Echinophora &c. Pluk. alm. tab. 173. f. 4.
In India.
Habitus Melastomæ. Caul. erectus, brachiatus,
acute 4-gon. Fol. angustolanceol. opposita,
trinuervis, scabra. Fl. terminal. aliquot, ses-
siles, cincti fol. 4. flore longioribus, patentibus.

384 OCTANDRIA MONOGYNIA.

2. *zeylanica*. O. fol. periolat. pedunc. axillar. 1-fl. nudis.
Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Zeylona.
Habitus prioris.
367. RHE-
 XIA. Cal. 4-5-fid. Petal. 4-5. calyci inserta. Anth.
 declinatæ. Capsl. 4-5--locul. intra ventrem
 calyc.
3. *virginica*. R. fol. sessil. serratis: calycibus glabris. *Syst.*
veg. ed. 14.
Lyfimachia &c. Pluk. alm. tab. 202. f. 8.
In Virginia.
 Caul. 4-gon. angulis membranaceis. Fol. oppo-
 sita, sub lanceol. trinervia, pilis vagis hisp-
 diuscula, ferraturis setaceis. Pedunc. termi-
 nal. dichotom. Fl. solitar. ex dichotomia,
 subfess. Petal. rubra. Anth. falcatae, luteæ.
3. *mariana*. R. fol. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14.*
 R. *glomerata*. *Ad. litt. Hafn. 1778. tab. 4.*
Lyfimachia &c. Pluk. mant. tab. 428. f. 1.
In Marilandia &c. in pratis.
 Calyx adpersus setis, apice stellatis.
3. *Acisanthe-
 ra*. R. fl. axillar. alternis, pedunculat. 5-fid. *Syst.*
veg. ed. 14.
Acisanthera &c. Brow. Jam. tab. 22. f. 1.
In Jamaica.
 Caul. lignosi, virgati, ramis, ramulisq. alternis.
 Fol. opposita, subpetiol. oblong-ovat. acute
 serrata, nuda. Fl. solitar.
4. *Jussoides*. R. fol. alternis, costatis, margine scabris. *Syst.*
veg. ed. 14. Lin. Suppl.
In Surinamo h.
Alfinis Epilobiiis, & Œnotheris, sed absq. calyc.
tubuloso. Frutex 4-ped. pubesc. uti pedunc. &
 fructus. Fol. confertiusc. subfessil. vix digital.
 lanceol. magis secunda, margine scabra ex
 minutiss. ferraturis, subtus nervis prominulis.
 Fl. axill. solitar. peduncul. vix folior. longitu-
 dine, flavi. Singulare, quod stigm. nudum,
 indivisum, verrucos. ovatum, quasi margine
 4-dent. cinctum: & caps. intra calyc. promi-
 nens, quasi 4. laminis adglutinat. notata.
5. *glutinosa*. R. fol. oppositis, trinerviis, lævibus: fl. thyr-
 soideis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Mutis.*
Amer. V. 1. tab. 6.
In nova Granada h.

Arbuse.

Arbuse. frondosa, *Melastomæ* simil. ramulis articulat. alterne canalicul. Fol. confertiuscula, pollicar. petiol. elliptica, integerr. Fl. peduncul. vix fol. longiores. *Summitates ramulorum, & calyc. glutinosi.*

villosa. R. caulibus decumbentibus: fol. subrotund. *Aubl. Guian. tab. 129. f. 1.*

In Guiana h.

Planta lignosa. Caul. & ramuli 4-goni, hirsuti, supra terram sparsi. Fol. opposita, breviter petiol. serrulata, 5-nervia, pilis utrimq. rufescent. Fl. terminal. peduncul. Petal. subrotund. violac. Caps. orbiculata.

atifolia. R. fol. amplo, subrotund. villoso: fl. violac. *Aubl. Guian. tab. 129. f. 2.*

In Guiana h.

Differt a priore caulibus 2-pedal. erectis, crassioribus: fol. ampliff. ovat. acutis: fl. maioribus.

568. **ÆNOTHERA.** Cal. 4-fid. Petal. 4. Caps. cylindr. 4-locul. 4-valv. infera. Sem. angulata.

1. *biennis.* *Æ.* fol. ovat-lanceol. planis: caul. muricato, villoso. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 446.*

Lyfimachia &c. Moris. hist. 3. f. 3. tab. 11. f. 7.

Hyoisycamus &c. Alp. exot. tab. 314.

In Virginia, Pedemontio &c. f.

Altitudo humana. Caul. erectus, ramosus. Fol. subdenticul. radicalia in petiolum decurrentia. Fl. axillr. spicati. Petal. parula, emarginata, lutea, odore *Primulæ* graviore.

2. *parviflora.* *Æ.* fol. lanceol. planis: caule lævi, subvilloso. *Syst. veg. ed. 14. Mill. ic. 189. f. 1.*

In Amer. septentr. f.

Fruſtus apice 8-fid. nec 4-fid. ut in priore. Caul. ruber, scaber. Fol. repando-subdent. minus mollia. Petal. dimidio breviora.

3. *muricata.* *Æ.* fol. lanceol. planis: caul. purpurascente, muricato. *Syst. veg. ed. 14. Nov. Comm. Götting. VI. tab. 1.*

In Canada.

Planta orgyalis. Caul. apice incurvus, teres, superius sulcatus, rimosus, pilosus, exasperatus prominentiis acutis, purpur. in pilos desinent. Rami multi, axillar. Fol. sesqui-2-palm. lanceol. infer. repanda, super. obsolete cre-

Tom. II.

Bb

- nata, sparsa, glabra sublineata, patentiss. sessil. fature virid. Bract. exiguae, rubicundae. Petal. obcordata, lutea, odore *Jasmini*. Caps. ore 4 fid.
4. *longiflora*. \odot . fol. denticul. caulibus simplic. pilosis: petal. distantibus, bilobis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. hort. 2. tab. 172.*
In agro Bonariensi \odot . σ .
 Fol. radical. numerosa, lato-lanceol. pubescent. costa alba, oblique nervosa. Caul. saepius 5. simpl. hirti, virid. pilis longis albis. Fol. caulina sessil. ovat-oblong. Cal. tubo insigniter elongato. Petal. flava. Fruct. \odot . *bienni* longior. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 70. ed. pida tab. 105.*
In America.
 Suffruticosa, ramosa. Fol. sessil. min. venis parallelis. Fl. axillar. folitar. sessiles. Cor. lutea.
6. *mollissima*. \odot . fol. lanceol. undulatis. *Syst. veg. ed. 14. Sabb. Hort. 4. tab. 60.*
Onagra &c. *Dill. elth. tab. 219. f. 286.*
In agro Bonariensi \odot .
 Fol. lineari-lanceol. denticulis raris, remotis, mollia: Fl. axillar. Cor. lutea. Caps. tomento albido obsita.
7. *hirta*. \odot . hirta, fol. supra glabris. *Syst. veg. ed. 14. Onagra* &c. *Plum. sp. 7. ic. 174. f. 2.*
In America calidiore \mathfrak{h} .
 Fruticulus. Caul. & rami alterni, hispidi. Fol. sessil. ovat-oblong. venis parallelis, subtus scabra. Fl. axillar. folitar. magni, sessil. Cal. magnus, hispidus. Cor. lutea.
8. *sinuata*. \odot . fol. dentato-sinuata, caulis apice nutante. *Syst. veg. ed. 14. Nev. Comm. Gott. V. tab. 9.*
Lythnarchia &c. *Pluk. alm. tab. 203. f. 3.*
In Virginia \odot .
 Caul. erectus, pedal. simpl. iunior pilosus. Rami alterni. Fol. alterna, sessil. lato-lanceol. obliqua, nuda. Fl. axillar. folitar. sessil. Petal. obcordata, flava.
9. *fruticosa*. \odot . fol. lanceol. subdent. capsul. pedicellat. acutangul. racemo peduncularo. *Syst. veg. ed. 14. In Virginia* \mathfrak{h} .
 Caul. ruber. Calyx purpurasc. 4-phyll. sed rumpitur altero saepius, & unico latere. Fl. parvi, albi. Tubus filiform. angustiss. Fol. rarius denticulata.

HEXANDRIA MONOGYNIA. 387

10. *pumila*. \odot . fol. lanceol. obtusis, glabris, subpetiol. caulis prostratis: capsul. acutangul. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. 24.

Caul. palmar. herbaceus, teres, flexuosus, divaricatiss. Fol. elliptico-lanceol. integerr. Fl. axillar. solitar. subsessil. erecti. Petala obcordata, lineata, lutea. Caps. obovat. obtusæ, 8-angular. angulis 4. latioribus, compressis, 4-valv.

- laciniata*. \odot . Hill. hort. Kevenf. tab. 6.

In Carolina \odot .

Caul. sesquiped. glaber. Fol. pinnatifid-laciniata. Fl. flavi.

569. *GAURA*. Cal. 4-fid. tubulosus. Cor. 4-petal. ascendens versus latus superius. Nux. infera, 1-sperm. 4-angula.

1. *biennis*. *G. Syst. veg. ed. 14. Ad. holm. 1756. tab. 8.*

Lyfimachia &c. *Pluk. amali. tab. 428. f. 2.*

In Virginia, Pennsylvania δ .

570. *EPILOBIUM*. Cal. 4-fid. Petal. 4. Filam. calyci, non receptac. adhærent; longiora paulo altius inferuntur: inferiora infra: horum basis quodammodo villosa videtur. Caps. oblong. infera. Sem. papposa. *Differt ab* *Oenothera jemma. papp. fis.*

* *Staminibus declinatis.*

1. *angustifolium*. E. fol. sparsis, lineari-lanceol. fl. inæqual. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 289.*

In Europa boreali 24.

Caul. 4-ped. erectus, firmus, superne ramosus, ruber. Fol. sæpe undulata, hilari-virent. subtus albida, nervulis horizontalib. conspicuis. Spicæ longæ. Petiunc. purpur. nutantes. Cal. late purpur. Petal. elliptica, leviter emarginata, purpur. alba, vel variegata.

Var. Lyfimachia Chamaen. dicta alpina. Bauh. pin. 6 prod. Fol. linear. raro ferrata. Cal. purpur-niger. Petal. purpur. Siliquæ tomentosæ.

2. *latifolium*. E. fol. alternis, lanceol-ovat. fl. inæqual. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 365.*

In Sibiria, & Silesia 24.

Differt a priori fl. duplo maioribus: fol. lanceolat-ovat. alternis, nec sparsis, utrimq. lævis. tomento mollissim.

B b ij

** *Staminibus erectis, regularibus: petal. 2-fid.*

3. *hirsutum*. E. fol. oppositis, lanceolat. undulato-serrat. decurrenti-amplexicaul. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 326. Sabb. hort. tab. 63.*

Lythymachia &c. *Morif. hist. 3. tab. 11. f. 3.*
b. L. parvo fl. Morif. hist. 2. tab. 11. f. 4. Fl. Dan. tab. 347.

In Europæ humidiuscul. 24.

Planta subhirsuta. Caul. 3-6-ped. ramosus, rufescens. Fol. mollia, fordide virent. basis media altior lateralibus. Cal. per ætatem reflexus. Cor. cordata, emarginata, purpurasc. Siliquæ fuscæ.

b. Fol. inferior. opposita, superior. alterna, sessil. aut breviter petiol. villosa, molliss. minus acuta. Var. fol. ternis.

4. *montanum*. E. fol. (imis) oppositis, ovat. dentat. *Syst. veg. ed. 14. Pseudo-Lythymachium* &c. *Dod. pempt. 85.*

b. Lythymachia &c. *Bocc. mus. tab. 16.*

In Europæ montosis 24.

Caul. erectus, 2-ped. teres, subhirsut. molliss. rufescens. Fol. petiol. ovat-lanc. argute dentat. glabra, nervis subtus hirsutis, firma, superior. alterna. Petal. profunde cordiform. carnea. Siliquæ subhirsutæ, fuscæ.

Var. in foliis, quæ quandoq. subsessil. angustiora, nitida, terna, quaterna. In siccis adnata admodum parva.

5. *tetragonum*. E. fol. elliptico-lanceol. denticulat. imis oppositis: caule 4-gono. *Syst. veg. ed. 14.*

Lythymachia minor. Tabern. ic. 854.

In Europæ 24.

Caul. erectus, 3-ped. ramosus, fragilis, rufescens. Fol. sessil. etiam integra, glabra, tenera, cum macula livida; superior. alterna. Flos parvus. Petal. cordiform. punicea. Siliquæ tomentosæ, rufo-fuscæ. Summitas adhuc tenella nutans. Stigma integerr. *Var. prioris.*

6. *palustre*. E. fol. opposit. lanceol-linear. subintegerr. petalis emarginat. caul. erecto. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 347?*

Lythymachia &c. *Tabern. p. 856.*

In Europæ humidiuscul. 24.

Caul. erectus, cubit. ramosus, fuscus. Fol. alterna, in medio latiora, mollia, glabra, ci-

- nereo-virent. Cal. ex rubro-ferrugineo. Cor. rosea. Siliquæ rufescent. tomentosæ.
7. *alpinum*. E. fol. opposit. ovat-lanceol. subintegerr. siliquis sessilibus; caule repente. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 322.*
Lyfimachia &c. *Bocc. mus. 2. tab. 108?*
In alpidus Helveticis &c. 24.
 Caul. dodrant. & min. procumbens, inde erectus.
 Fol. rigida, glabra, obscure virid. nitida: inferiora ovata; super. angustiora. Fl. min. Cor. dilute purpurasc. Siliquæ rub. æ.
-
- roscum*. E. fol. oppositis, alternisq. ovat-lanceol. petiolat. ferratis, glabris. *Schreb. Lips. Schiemed. Opusc. Gesn. 2. fascic. tab. 20. f. 73.*
In locis humidis.
 Caul. teres, glaber, superne villosus-incanus. Fol. iuniora hirsuta. Fl. parvi. Petal. dilute rosea, aut albicantia, venis saturioribus.
- obscurum*. E. fol. oppositis, alternisq. lanceol. ferratis, glabris; inferior. basi decurrentibus. *Schreb. specul. Fl. Lips. addenda.*
In locis humidis.
 Caul. ramulosiss. superne villosus. Fol. parva, acuta, summa sessil. Fl. parvi, alterni, pedicellati. Petal. purpurasc.
- Dodonæi*. E. fol. linear. fl. difformi. *All. Fl. Ped. Hall. helv. n. 1001. Vill. prosp.*
Lyfimachia siliquosa, speciosa &c. *IB. 2. p. 907.*
In fluminum arenosis 24.
 Rad. crassa. Caul. 1-2-cubit. Fol. nervo depresso, oris contractis, simpliciss. raro serrata, pulpofa, & subtus reticulata. Cal. purpur. vel niger. Cor. rosea, alba, vel variegata.
- grandiflorum*. E. fol. longis, dentatis, villosis: fl. magnos. *All. Fl. Ped. Hall. helv. n. 410.*
In locis montanis 24.
371. ANTI-CHORUS. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Capf. supera, subulata, 4-locul. 4-valv. Sem. plurima.
1. *depressus*. A. *Syst. veg. ed. 14.*
Jussiaea edulis. Forsk. Ægypt. monente Vahl.
In Arabia ☉.
372. COM-BRETUM. Cal. 4-dent. campanulat. superus. Cor. 4-petal. calyci inserta. Stam. longiss. Sem. 1: quadrangul. angulis membranaceis.

1. *laxum*. C. spicis laxis. Syst. veg. ed. 14. Aubl. Guian. tab. 137.

In Amer. merid. h.

Frutex ramis farmentosis, scandentibus: ramulis foliosis, & floriferis. Fol. opposita, breviter petiol. ovat-acum. integerr. glabra. Fl. alternatim axillar. & terminal. spicati. Fl. in spica longa. Pet. l. minima, flava.

2. *secundum*. C. spicis secundis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 30. ed. piñu tab. 260. f. 26.

In fruticetis Carthagenæ h.

Arbuse. 12-ped. ramis longiss. arboribus vicinis se sustentantes. Fol. 4-pollic. opposita, petiol. ovat-oblon. integerr. glabra, venosa, disticha. Spica pinnata. Fl. multi, e viridi-flavescent. anther. rubris. Fol. trita odorem fœtidum spirant.

decandrum. C. fol. alternis: fl. decandris. Jacq. amer. ed. piñu tab. 260. f. 27.

In sepibus Carthagenæ h.

Frutex scandens, 20-ped. Rami longiss. subvimeini. Aculei sparsi, rari, semipollic. subulati, obtusi, leviter recurvi. Fol. 2-3-pollic. petiol. ovali-oblon. acumine obtuso, subcanalicul. cartilagineo, integerr. nitida. Spinæ semipedal. laxæ, compositæ, in apice ramulor. Pedunc. ultra fl. elongantur ad 6. ped. aphylli debiles. Fl. numerosi, parvi, albi. Fruct. subfusi.

573. GRISLEA. Cal. 4-fid. Petal. 4. ex incisuris calyc. Filam. longiss. adscendentia. Caps. globosa, supera, 1-locul. polysperm. Interdum $\frac{1}{2}$ pars additur fl. partibus.

1. *secunda*. G. Syst. veg. ed. 14.

In Amer. calidior. h.

Arb. ramis toretibus. Fol. lauriform. opposita, breviter petiol. ovat-lanceol. integerr. glabra, nervis alternis. Racemus terminal. simplex, extrorsum flexus. Fl. pedicellati, sursum uno versu flexi. Cal. turbinat. Peral. vix conspicua. Stam. purpurasc. Anth. fulvæ.

574. ALLO-PHYLLUS. Cal. 4-phyll. foliol. orbiculat. oppositis minoribus. Petal. 4. calyce min. Germ. didymum. Stigm. 4-fid.

1. *zeylanicus*. A. Syst. veg. ed. 14.

In Zeylona h.

Arb. facie *Perficæ*. Rami teretes. Fol. spitham. alterna, petiol. ovalia, acumin. glabra, venosa. Racemi axillar. parvi, breviss.

575. MIMUSOPS. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Nectar. 16-phyll. Drupa acumin.

1. *Elengi*. M. fol. alternis, remotis. Syst. veg. ed. 14.

Flos cuspidum. Rumph. amb. 2. tab. 63. Breyn. cent. tab. 8.

Elengi. Hort. Mal. 1. tab. 20.

In India h.

Arb. procera, frondibus densis, & opacis, late sparsis. Fol. breviter petiol. ovar-acum. crassa, supra e viridi-fusca, & nitente glabræ, subtus dilutiora, & minus nitida. Pedunc. axill. pollic. 5-6-fl. Petal. albido-flavescent. seu ex flavo-fusca, odora. Gemmæ fl. conicæ, & col. muscosi. Cal. tomentosus. Fructus olivæform. primum virid. dein flavi, ac rubescent. carne flava, farinacea, eduli. Ossiculum oblong-rotund. nonnihil planum, spadiceo-tusculum, ac nitens.

2. *Kanki*. M. fol. confertis. Syst. veg. ed. 14.

Metrosiderops &c. Rumph. amb. 3. tab. 8.

Binectaria. Forsk. Æg. Vahl.

In India h.

Arb. ramis crassioribus; cicatricibus parvis undiq. adspersis. Fol. terminalia.

576. JAMBO-LIEERA. Cal. 4-dent. Cor. 4-petal. infundibulifor. Filam. planiuscula. Stigm. simplex.

1. *peduncula-* J. Syst. veg. ed. 14.

ta.

Jambolana. Rumph. amb. 1. tab. 34.

Caryophyllus &c. Pluk. alm. tab. 274. f. 2.

In India h.

Frutex niger, olivæfor. ramis erectis, obtusis, teretibus, cinereis. Fol. opposita, petiol. ovata, integerr. glabra. Pedunc. axillar. oppositi, trichotomi, partialibus 3-fl. Panicula, & fl. ad *Myrtum* accedunt. Variat magnitudine, & fol. ovalibus, cuneiform. integerr. vel apice 2-fid.

577. MELI-COCCA. Cal. 4-part. Petal. 4. reflexa infra calyc. Stigm. subpeltat. Drupa coriacea.

1. *biuga*. M. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 72. ed. pi^a. tab. 104. Pluk. alm. tab. 207. f. 4.

In Amer. meridion. h.

Arb. procera, ramosa, comosa. Fol. alterna, biugata. Foliol. breviter petiol. subovata, obtusiuscula, integerr. nitida. Racemi subramosi. Fl. pl. parvi. Petal. albicant. Fruct. subrotund. cortice viridi. Nuces Castanearum more comeduntur. *Similis Sapindo.*

578. GUAREA. Cal. 4-dent. Petal. 4. Nectar. cylindric. ore anth. gerens. Caps. 4 locul. 4-valv. Sem. solitar.

1. *trichiloides*. G. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 176. f. 37. Guidonia &c. Plum. ic. tab. 147. f. 2.

Lito. Pis. Bras. tab. 80.

In Brasilia, aliisq. locis Indiae orient. h.

Arb. 25-ped. comosa. Fol. alterna, pinnata, nitida, costa uni-fesquiped. Foliol. opposita, breviter petiol. oblong. obtusa, apice attenuata, integerr. Racem. axill. semiped. laxi. Fl. breviter peduncul. e viridi-albicant. nectar. albo, odori; similes *Meliae Azederach*. Fruct. diametro semipollic. cortice sordide virenti.

579. AMYRIS. Cal. 4-dent. Petal. 4. oblong. Stigm. 4-gon. Bacca drupacea.

1. *Elemifera*. A. fol. ternatis, quinato-pinnatisq. subtus tomentosis. Syst. veg. ed. 14.

Cornus &c. Plum. ic. 100.

Frutex &c. Catesb. car. 2. tab. 33. f. 3.

In Carolina h.

Planta fruticosa. Foliol. ovata, acumin. obsolete ferrata, subtus villosa, & foraminulata. Fl. racemis compositis. Petal. apice inflexa. Bacca subrotund. 1-locul. *Differt a sequenti.*

2. *sylvatica*. A. fol. ternatis, acutis, crenatis. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. pi^a tab. 108.

In Carthagenae sylvis umbrosis h.

Frutex sub 15-ped. parum ramosus, succo Terbinthino, odore forti, & ingrato. Foliol. 2-pollic. ovat-lanceol. aut cordato-ovata, vel rhombæa, nitida. Racemi axillar. & terminal. erecti, paniculati. Fl. exigui. Petal. nivea. Drupa pisiform. rubra, cum succo rubro.

3. *maritima*. A. fol. ternatis, obtusis, crenulatis. Syst. veg. ed. 14.

In America H.

An prioris varietas? Frutex nanus, succo gratiore *Ruta* quiddam spirante. Foliol. vix pollic. nitida. Fl. ut in priore. Fruct. duplo major, nigri, succo purpur.

4. *gileadensis*. A. fol. ternatis, integerr. peduncul. lateralibus, 1-fl. *Syst. veg. ed. 14.*

In Arabia felici h.

Frutex ramis purpurascen. substriat. gemmis protuberant. Fol. e gemmis conferta, petiol. lævia. Foliol. sessil. lanceol. acutiuscula, impari parum majora. cuneiformi—lanceol. Fl. inter fol. terni. Petal. sessil. elliprica.

5. *Opobalsamum*. A. fol. pinnat. foliol. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Balsamum. *Bell. ic. 110. Alp. Eg. tab. 60.*

In Arabia h.

Frutex altitudine *Ligustri*. Foliol. parva, ternatim—septena, cum impari. Fl. similes *Acacia*, ex albo-purpur. odori. Folliculi nigro-rubent. Sem. flava.

6. *toxifera*. A. fol. pinnat. foliol. petiolat. planis. *Syst. veg. ed. 14.*

Toxicodendron &c. *Catesb. car. 1. tab. 40. Seeligm. au. ic. 2. tab. 80.*

In Carolina.

Arb. pumila, ex quo liquor emanat nigerrim. Foliol. ovat-oblon. cum impari, opposita, semper virent. Racemi pl. axillar. fl. sparsi. Fruct. purpur.

7. *Protium*. A. fol. pinnat. foliol. petiolat. undulat. *Syst. veg. ed. 14.*

Tingulone. *Rumph. amb. 7. tab. 23. f. 1.*

In India orient. h.

Arb. fol. opposit. Foliol. 5-7. laurina, petiol. glabra. Fl. panicula multiplex. Petal. sessil. ovat-acum. Nectar. e receptacul. marginato.

8. *ambrosiaca*. A. fol. pinnat. petiolat. paniculis axillar. confertis. *Syst. veg. ed. 14 Lin. Suppl.*

Icica heptaphylla. *Aubl. Guian. tab. 130.*

In India orient. ad litora maris h.

Arb. 30-ped. Fol. alterna. Foliol. 5-6. ovat-oblon. acuta, glabra; petiolis basi gibbis. Fl. albo-flavescent. Bacca lauriform. ovata, obliqua. Nucleus pulpa viscosa rubra. *Arbor tota*

odoratiff. detruncata fundit balsamum album, odoratiff. cuius usus est in dysenteria, pro dosi dr. 1. in vino rubro. Fructus ruber, pulpa viscosa, odore, & sapore balsamico, quæ indurescit in resinam griscam, ad suffimenta utilem.

9. *balsamifera*. A. fol. 2-3-iugis. Syst. veg. ed. 14.

Lauro &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 168. f. 4.

Lucinium &c. Pluk. aln. tab. 201. f. 3.

In Jamaica h.

Arb. 20-ped. ramis reclinatis, quandoq. spinosis, ligno odore grato. Fol. ramulis adnata, alata, abrupte pinnat. Pinnæ subrotund. subunc. Fl. terminal. fasciculati: Sambuci æmuli. Cor. candida. Fruct. grani Piperis magnitudine.

Guianensis. A. fol. impari-pinnat. foliol. biijugis, ovat-oblong. fructu racemoso, luteo. Aubl. Guian.

Terebinthus &c. Sloan. Jam. 2. tab. 199. f. 3.

In Guiana h.

Ercitur resina subrubra, odore Ciri.

Katuf. A. fol. ternatis: apice serratis: pedunc. dichotomis. Forsk. Æg.

In Arabia h.

Arb. ligno albo: rami inermes. Fol. varia, obtusa, vel acuta. Pedunc. veluti corymbosi, dein dichotomo-ramosi, incarnati. Petal. virid. acuta, apice recurvo. Bacca globosa, umbilicata.

Kafal. A. Forsk. Æg.

In Arabia h.

Simil. priori, sed arbor procerior, ligno rubro.

Fol. uniora acuta, villosa; antiqua sæpe obtusa, glabra. Ramuli apice parum spinosi. Baccæ compressæ, utrimq. subcarinatæ, apice puncto nigro prominulo. Utriusq. fol. ternata: foliol. sessilia, apice incisa; lateral. min. ovata, obliqua; medium maius, pollic. inversè ovat. basi angustatum. Uraq. sp. spirat odorem Balsami fragrantiff.

zeylanica. A. fol. pinnat. petiolat. glabris: racemis axillar. interruptis: fl. involucrat. hexandris. Reiz. Obs. fasc. 4.

In Zeylona h.

Arb. cortice cinereo. Fol. quina-septena: foliol. petiol. ovata, acuta, integerr. nuda, ve-

nis fere transversalibus. Pedunc. elongati, tomentosi. Involuc. sessil. cordata, tomentosa. Cal. coriaceus, subglobosus, 3-dent. tomentosus, cor. maior. Petal. 3. cava, extus tomentosa, margine fusco, nudo. Stam. 6. Drupa sesquipoll. ovata, sicca. Nux olea, crassa. *Fundit Elemi Off. orientale, ab americano eius nomine diversum.*

Numero partium fructificationis differt.

580. XIMENIA. Cal. parvus, 4-fid. Petal. 4. pilosa, revoluta, concava. Drupa 1-sperm.

1. americana. X. fol. oblong. pedunculis multiflor. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 177. t. 31. ed. pict. tab. 107.*

In America h.

Arb. 15-ped. Fol. 2-pollic. alterna, petiol. ovat-oblong. integerr. emarginata, glabra. Spina axillar. subulata. Racemus multifl. inter spinam, & ramum. Fl. albid, odore suavi. Fructus ovi columbini magnitudine, lutei, nitidi. *An Stam. ?*

2. inermis. X. fol. ovatis: pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. In Jamaica h.*

Arb. fol. glabris, vetustioribus confertis, petiolis submargin.

581. FUCHSIA. Cal. o. Cor. 8-fid. Bacca infera, 4-locul. polysperm.

1. triphylla. F. pedunc. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Plum. ic. tab. 133. f. 1.*

In Amer. meridion.

Radix brachiata. Caul. herbac. simplex. Fol. ternata, sessil. lanceol. integerr. venosa. Racemus terminal. erectus. Cor. coccinea. Bacca ovata.

2. multiflora. F. peduncul. multifl. *Syst. veg. ed. 14.*

In America,

3. excorticata. F. fol. alternis, ovatis: pedunc. axillar. 1-fl. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Skinnera excorticata. Forsk. Æg.

In nova Zeelandia h.

Arb. glaberr. Fol. longe petiol. tenuissime serrata, subtus canescencia. Pedunc. solitar. Fl. ma: penduli.

582. CHLOERA. Cal. 8-9-phyll. Cor. 1-pet. 8-12-fid. Capf. 1-locul. 2-valv. polysperm.

1. perfoliata. C. foli perfoliatis *Syst. veg. ed. 14. Subb. hort. 1. tab. 100. Rentselm. sp. tab. 76.*

Centaurium &c. *Morif. hist.* 3. f. 3. tab. 26. f. 1. 2. *Clus. hist.* 2. p. 180.

In Europa, Oriente ☉.

Planta cubital. glauca, glabra, apice brachiata. Caul. erectus, raris paucis, erectis, oppositis. Fol. opposita, integerr. inferior. ovata; caulina basi lata, cordat-lanceol. Fl. terminal. parvi. Cor. flava. Var. fol. angustioribus: & fol. ternis,

2. *imperfoliata*. C. cor. 6-fid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In extrema Italia ☉.

Caul. erectus, palmar. simplex, herbac. 4-gonus, lævis. Fol. opposita, subamplexicaul. ovata, acuta, lævia. Flos terminal. pedunculat. fol. maior, flavus.

Facies Chloræ, sed genus dubium. Cal. 1-phyll. nec laciniae linear. Cor. 6-fid. nec 8-fida. Styl. 2. conglutinati.

3. *quadrifolia*. C. fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Europa australi.

Planta matre Gentiana persoliata, patre Lino quadrifolio. Gaul. spitham. simpl. sub 4-gon. articul. Fol. verticillato-quaterna, linear. ad apicem paulo latiora, obtusiuscula. Pedunc. terminal. 5. bracteati.

4. *dodecandra*. C. fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Virginia.

583. DODO- Cal. 4-phyll. Cor. o. Capf. 3-locul. inflata. N.ÆA. Sem. bina.

1. *viscosa*. D. fol. oblongis. *Syst. veg. ed. 14. Trew. chret. t. 19 i.*

Triopteris &c. *Brow. Jam. tab. 18. f. 1.*

Aceri &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 162. f. 3.*

Caryophyllaster &c. *Rumph. amb. 4. tab. 50.*

Arbuscula &c. *Pluk. phyt. 142. f. 1.*

In India locis arenosis h.

Frutex 5-pedal. torus viscosus, foetidus. Fol. alterna, subpetiol. oblonga cum acumine, obtusiusc. basi attenuata, integerr. in planta tenella plerumq. repanda, vel serrata, viscosa. Racemi valde variant. Fl. herbacei. Pistil. longist. Fructus Ulmi, sed triplici ala.

2. *angustifolia*. D. fol. linearibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In India australi h.

Simil. priori, sed fol. lanceol-linear. Fructificatio polygama.

584. LAWSONIA. Cal. 4-fid. Petal. 4. Stam. 4-parium. Caps. 4-NIA. loc. polysper.

1. *inermis*. L. *inermis*: fol. subsessil. ovatis, utrimq. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Alhenna. *Walsh. hort. 3. tab. 4.*

Pontaliscie. *H. mal. 4. tab. 57.*

Cyprus. *Rauw. it. tab. 60.*

In India, Ægypto h.

Adfinis maxime L. *spinosa*, ut forte cultura mi-tior facta. Petal. cœrul.

2. *Acronychia*. L. *inermis*; fol. longe petiolat. cuneiform. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Acronychia laevis. Forst. gen.

In nova Caledonia h.

Differt a priore fol. longe petiolat. ad insertio-nem subarticulat. calyc. omnium minimo: petal. non planis, ovatis, sed linearibus, apice ungue reflexo.

3. *spinosa*. L. ramis spinosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Rhamnus &c. *Pluk. alm. 220. f. 1.*

Cyprus. *Rumph. amb. 4. tab. 17. Mail-anfchi. H. mal. 1. tab. 40.*

In India h.

Arb. 3-orgyal. ramis densis, late sparsis. Fol. solitar. vel opposita, breviter petiol. parva, ovalia, tenuia, glabra, subnitent. saporis amari. Fl. axillar. racemosi, parvi, odori, peduncul. rubris. Petal. crispa, subflava. Caps. subrotun. cum spiculo in vertice, calyce arcte contenta, primum virid. dein rufescens, postea nigra.

585. MEME. Cal. superus, fundo striato, margine integerr. CYLON. Cor. 1-pet. Anih. insertæ lateri apicis filamenti. Bacca coronata calyc. cylindrico.

1. *capitellatum*. M. fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cornus &c. *Burm. zeyl. tab. 30.*

In Zeylona h.

Arb. ramis teretibus. Fol. opposita, breviter petiol. obtusiusc. integerr. glabra. Pedunc. axillar. breves, oppositi, solitar. Fl. capitati. Cal. parvus, campanulat. sicuti & cor.

grande.

M. fol. acuminatis Retz. *Obs. fasc. 4.*

Habitat

Arb. grandis. Rami teretes. Fol. semiped. op-

posita, ovata, integerr. longe acumin. Pedunc. axillar. alterni, 4-5-fid. pedicell. multif. Anth. incumbentes.

586. **VACCI-NIUM**. Cal. superus, breviss. 4-5-fid. Cor. 1-pet. 4-5-fid. Filament. receptaculo inserta. Bacca globosa, 4-locul. polysper.

* *Fol. annotinis, seu deciduis.*

1. **Myrtillus**. V. pedunc. 1-fl. fol. ovat. serratis, deciduis: caul. angulato. *Syst. veg. ed. 14. Blak. tab. 463. Du-ham. arb. 2. tab. 107. Knorr. del. 1. tab. f. 18. n. 1. Dalech. hist. 191. 192. Math. 231.*

In Europæ sylvis umbrosis h.

Frutex 2-ped. Fol. alterna, petiol. Pedunc. axill. sub calyc. rubri. Fl. unilateral. Cal. integer. Cor. ex albido-purpurasc. Bacca nigra, polline cœrul. tincla, vel alba. Filam. 10.

2. **flamineum**. V. pedunc. folitar. 1-fl. antheris corolla longioribus: fol. oblong. integerr. *Syst. veg. ed. 14. Vitis idæa &c. Pluk. alm. tab. 339. f. 3.*

In Amer. septentr. h.

Frutex. Pedunc. axill. filiform. Cor. 5-fid. campanul. patent. Anth. 10. Styl. flore longior.

3. **uliginosum**. V. pedunc. 1-fl. fol. obovat. obtusis, integerr. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 231. Vitis idæa. II. Clus. hist. 1. tab. 62. Camer. hort. 182.*

In alpibus uliginosis h.

Frutex 1-2-ped. ramosus, superne foliosus. Fol. glabra, venosa; tenella basi ciliata. Flos nutans. Cor. ovalis, albo-rosea, denticul. reflexis. Bacca cœrul.

4. **hirtum**. V. pedunc. 1-fl. fol. ovat. serratis: ramis teretibus, divaricatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. frutesc. ramosiss. Rami ferrugin. Fol. annua, unguicular. inæqual. alterna, subfessil. patentia, acuta, villosa, subtus paullo pallidiora. Fl. in ramulis sparsi, folitar. cernui. Cor. lacin. revolutis.

5. **album**. V. pedunc. simplicibus: fol. ovat. integerr. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pensylvania h.

Frutex. Fl. 2-3. peduncul. adgregatis, breviss. nudis.

6. *mucronatum*. V. peduncul. simpliciss. 1-fl. fol. ovatis, mucronat. integerr. glabris. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. h.

Frutex ramis teretibus, glaucis. Fol. elliptica, petiolis canaliculat. immixta.

7. *corymbosum*. V. fl. corymbosis, ovaris: fol. oblong. acuminat. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. h.

Frutex. Fol. nervis subtrus villosis. Corymbi ex gemmaceo involuc. sessiles. Cor. cylindrico-ovat. longior præ reliquis. Stam. 10.

8. *frondosum*. V. racemis filiform. foliosis: fol. oblong. integerr. *Syst. veg. ed. 14.*

In Amer. septentr. h.

Frutex. Cor. ovato-campanulata. Stam. 10.

9. *ligustrinum*. V. racemis nudis: caul. fruticoso: fol. oblong. crenulat. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pennsylvania h.

Fl. in racemis alternis, numerosis; destituti bracteis, seu foliolis.

10. *bracteatum*. V. racemis solitar. fol. acutis, serratis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticosus, glaber. Rami, & ramuli alterni, divaricati. Fol. caulina alterna, breviss. petiol. ovata, margine revoluta, venosa, pollic. racemorum lanceol. lineam longa. Fl. racemosi, secundi. Racem. axillar. digital. patentiss. Bract. in medio pedunc. binæ. Cor. cylindr. alba.

11. *ciliatum*. V. racemis foliatis: fol. ovatis, integris, hispidis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticos. cinereus, glaber. Ramuli alterni, erecti, villosi. Fol. ramæ sparsa, acuta, nervosa, inæqualia, 1-2-pollic. Racemorum lanceol. glabra, semiunguicul. Fl. secundi. Racemus terminal. digital. Cal. breviss. Cor. rubra.

12. *Ardostraphylos*. V. fl. racemosis: fol. ovat. acutis, crenulatis: caul. arboreo. *Syst. veg. ed. 14.*

Vitis idæa &c. Tourn. it. 2. tab. 223.

In Cappadocia h.

Racemi fol. longiores; infra fol. sui, foliol. ovatis instructi. Cor. variegata.

** *Fol. sempervirentibus.*

33. *Vitis idæa*. V. racemis terminal. nutantibus: fol. obovatis. integerr. revolutis, subrus punctatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 40. Knorr. del. 1. tab. S. 18. n. 2.*

Vitis idæa &c. *Cam. epit. 136.*

In Europæ sylvis macris h.

Caul. pedal. repens, ramosus, teres. Fol. crassa, nitida, subrus albida. Pedunc. breves, colorati. Cor. carnea. Bacca rubra, vel alba.

34. *Oxycoccus*. V. fol. ovatis, integerr. revolutis: caulibus repentibus, filiform. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 80. Black. tab. 593.*

Vaccinia palust. Lob. ic. 109. Dod. pempt. 770.

In Europæ paludibus Sphagno repletis 24.

Fol. alterna, elliptica, diffita, secunda, subrus albida. Racemus brevissim. peduncul. longiss. coloratis; bract. 2. alternis. Cor. profunde 4-fid. revoluta, rubella. Bacca rubra.

35. *hispidulum*. V. fol. ovatis, integerr. revolutis: caulibus repentibus, filiform. hispidis. *Syst. veg. ed. 14.*

Vitis idæa &c. *Pluk. alm. tab. 320. f. 6.*

In Amer. septentr. paludosis 24.

Structura prioris, sed omnia maiora; & caul. squamis fetaceis imbricatus.

587. *ERICA*. Cal. 4-phyll. Cor. tubulosa, 4-fid. Filam. receptac. inserta. Anth. 2--fid. Capsl. 4--locul. 4--valv. polysper. Fol. tenuissima.

* *Anth. aristatis; fol. compositis.*

1. *vulgaris*. E. anth. aristat. cor. campanul. subæqualibus: calycibus duplicat: fol. oppositis, sagittatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 677.*

E. 1. Matth.

In Europæ campestribus sterilibus frequens h.

Fruticulus. Fol. in 4 series imbricata. Bracteol. sub singulo fl. Cal. coloratus. Cor. rubra, vel alba, aut ex purpuro-violac.

2. *lutea*. E. anth. aristat. cor. ovar. acuminat. fl. congestis: fol. opposit. linearibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. 6. Spei.

Caul. plusquam pedal. ramis angustis. Fol. opposita,

posita, breviter petiol. adpressa, fere imbricata, linear. Cal. flavescent. Cor. subrostrata, lutea.

— foliis ternis.

3. *halicacaba*. E. anth. aristat. cor. ovatis, inflatis: fl. solitar. stylo incluso: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Æthiopia* h.

Frutex altus. Rami purpurasc. ramuli submont. albi. Fol. confertiss. lævia, margine scabra. Cor. purpurasc. glabra, magnitudine glandis quernæ.

4. *regerminans*. E. anth. aristat. cor. ovatis, stylo incluso; calyc. acutis; fl. racemosis: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Caul. frutesc. determinate ramosus, ramis junceis. Fol. lineari-subul. acumin. lævia, patula. Fl. secundi, nutantes, peduncul. incarnatis: bracteis remotis, minutis, coloratis. Cal. ruber. Cor. globosa, rubra. Ramus spicam continuat.

5. *Monsoniana*. E. anth. aristat. cor. oblong-inflatis; styl. incluso; calyc. calyculato: fl. terminalibus ramulorum obtusorum: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In interiore parte *Africae*.

Rarissima, & *Ericarum* speciosiss. fl. magnis, albis: stamin. aristatis.

6. *mucosa*. E. anth. aristat. cor. subglobosis, mucosis; stylo incluso: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Caul. frutesc. determinate ramosus, lineis albis, decurrentibus, subulat. sub cicatricibus folior. Fol. adpressa, linear. lævia. Fl. terminal. subumbellati. Bract. remotæ, minutæ, lineares. Cal. scariosus. Cor. col. ferreo.

7. *bergiana*. E. anth. aristatis: cor. campanulat. stylo incluso; calyc. reflexis: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Frutex 2--ped. pubescens. Fol. erecta, linearia, subciliata. Fl. terminal. subsolitar. brevissime peduncul. Cor. (*Convallaria maialis*) purpur.

8. *depressa*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso: fl. raris: fol. ternis: caul. depresso. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. *Spei* h.

Tom. II.

Cc

- Caul. procumbent, copiosi, palmar. Fol. lanceol. obtusiusc. carinata, lævia. Fl. sparsi, solitar. Cal. scarious. Cor. rubra.
9. *pilulifera*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso: fl. umbellat. fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.
 Caul. fruticosus, dodrant. & ultra, purpurasc. inferne subdichotom. Rami brunnei, foliosi. Fol. petiol. lineari-subul. glabra. Fl. peduncul. Cor. globofo-campanul. dilute purpurasc. Bract. 3. linear. parvæ, ciliatæ.
10. *viridipurpurea*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso: fol. (plerumque) ternis: fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14.*
E. corios fol. 3. Clus. hist. 1. p. 42.
In Lusitania h.
 Frutex humilior. Fol. imbricata, lanceol. Fl. racemosi, unilateral. ex herbaceo-purpur. *Variat fol. quaternis.*
11. *pentaphylla*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo incluso: fol. ternis: fl. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14.*
E. africana &c. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 2.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. pedal. cinereus: rami sparsi, foliosi. Fol. unguicul. petiol. linear. utrimq. plana, subtus albido-tomentosa. Fl. umbellati. Bract. 3. Cor. maiuscul. pyramidal-cylindr. ore obtuso, erecto; truncata, villosa, alba.
12. *nigrita*. E. anth. aristat. cor. campanulat. styl. incluso; calycibus imbricat. 3-fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*
E. africana &c. Seb. mus. 2. tab. 9. f. 7.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticosus. Fol. terna, subtriquetra, brev. patula, glabra. Bract. 3. facie calyc. Fl. terminal. 3-4. albi. Anth. nigræ.
13. *planifolia*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo exserto: fol. ternis, patentiss. *Syst. veg. ed. 14.*
E. africana &c. Pluk. mant. tab. 347. f. 1.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. procumb. spitham. flaccidus, mox ramosus. Fol. frequentia, patentia, ovata, acuta, ciliata, subpubesc. Fl. axillar. oppositi, nutantes. Cor. violac.
14. *scoparia*. E. anth. aristat. cor. campanulat. stigmate exser-

ro, peltato: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lob. ic. 2. p. 215.*

E. corios fol. IV. Clus. hist. 1. 4. 2.

In Europa australi h.

Frutex 2-cubit. & ultra. Rami albi. Fol. brevi tempore diffuunt, patentia. Fl. axillar. feifil. verticillati. Cor. herbacea.

15. *arborea*. *E. anth. aristat. cor. campanulat. stylo exserto: fol. ternis; ramulis incanis. Syst. veg. ed. 14.*

E. corios fol. 1. Clus. 1. p. 4.

In Europa australi h.

Frutex erectus, 6-ped. ramosus, albidus. Fol. copiosa, erecta, non parula, pene subulata, glabra. Fl. numerosi, in mediis ramis, peduncul. ramosis, paniculati. Cor. *Convallaria*, brevis, lata, alba.

16. *vespertina*. *E. anth. aristat. cor. campanulat; stylo exserto: fol. ternis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

Frutex erectus, ramis ternis. Fol. adpressa, triquetra, lævia. Panicula fl. nutantibus, alternis, albis, bracteatis. Pedun. albi.

— fol. quaternis.

17. *ramentacea*. *E. anth. aristat. cor. globosis; styl. incluso, stigmate duplicato; fol. quaternis, setaceis. Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, pedal. ramosus, fusco-ciner. Rami longi, filiform. ramentacei, ferruginei. Fol. erecta, adpressa, petiolat. angustiss. Fl. umbellati. Cor. purpur. Stigma inferius subrotund. superius 4-fid.

18. *perfoliata*. *E. anth. aristat. cor. campanul. styl. incluso; calyc. ciliatis; fol. quaternis, Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, pedal. læviuscul. ramis pubescent. Fol. erecta, petiol. linearia, obtusa, subtruncat. canalicul. hispida, aut subscabra. Fl. umbellati, dispersi in summis ramulis. Cal. minutiss. Cor. obtusa, pallida.

19. *Tetralix*. *E. anth. aristat. cor. ovatis; styl. incluso: fol. quaternis, ciliat. fl. capitatis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 81.*

In Europa borealis paludibus æspitosis h.

- Caul. fruticosi, fere ped. ramosi, fusci. Fol. ovat-linear. patentia, prope fl. cauli adpressa, margine inflexo. Fl. imbricati, unilateral. Cor. ampla, carnea, raro alba. *Bis in anno floret.*
20. *pubescens*. E. anth. aristat. cor. ovatis; styl. incluso: fol. quaternis, scabris: fl. sessil. lateralibus. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.
 Caulis fruticosus, plusquam ped. fuscus. Fol. petiol. Fl. subquaterni. Bract. 3. Cor. pubescens, sordide purpurascens.
21. *abietina*. E. anth. aristat. cor. grossis: stylo incluso: fol. quaternis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Buxb. cent. 4. tab. 41. 42. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 1. Ad cap. b. Spei h.*
 Caul. fruticosus, erectus, cinereus: rami terni, folioli; ramuli aggregati. Fol. petiol. lineari-subul. glabra, vix unguicular. Fl. verticillati, 4--8. nutantes. Cor. magna, fol. duplo longior, erecta, cylindrica, coccinea.
22. *mammosa*. E. anth. aristat. cor. grossis: stylo exserto: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
 Frutex lineis albis subulat. Fol. conferta, subulata, margine scabra. Fl. subcapitati, pollicar. Cal. sanguineus. Cor. E. *cerinthoidis*, longiss. ore obruso, sanguinea.
23. *cafra*. E. anth. aristat. cor. ovatis; stylo exserto: fl. quaternis, pubescentibus: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.
 Magnitudo *Juniperi*. Fol. lineari-subul. Fl. axill. Cor. limbo parvo.
24. *sessiliflora*. E. anth. aristat. cor. clavatis; stylo exserto: spica fl. sessil. oblongis, deflexis: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Frutex facie *Pini sylv. min.* determinate ramosus, fuscus, scaber. Fol. confertiss. linear. sat ure virid. Spica oblonga, undiq. ambiens: fl. imbricati. Cor. saepe cernua.

— *Foliis sparsis.*

25. *fascicularis*. E. anth. aristat. cor. grossis; styl. incluso: fl.

fasciculatis : fol. pl. linear. truncatis . *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus , erectus , 2-ped. compositus . Fol. conferta , sparsa , pollic. linear. fere filiform. erecto-patula , lævia . Fl. fastigiati . Cor. purpur.

*** Anth. cristatis : fol. ternis .*

26. *triflora* . E. anth. cristatis : cor. globofo-campanul. styl. incluso : fol. ternis : fl. terminalibus . *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticof. aphyll. fuscus , hirsutus . Rami , & pedunc. tomentosi . Fol. 2. unc. longa , petiol. linear. obtusa , decidua . Fl. copiosi , terni , congesti , pedunculati , nutantes , carnei . Bract. 3. linear. Cor. longitudine calyc.

27. *baccans* . E. anth. cristatis : cor. globofo-campanul. rectis ; styl. incluso : fol. ternis , imbricatis . *Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 3. Pluk. phyt. tab. 279. f. 3.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. erectus , ramosus . Fol. imbricata , linear. obtusiusc. margine scabra ; petiol. albis . Fl. terminal. subterni , nutantes , magnitudine *Piri* ; peduncul. purpur. Cal. inflexus , incarnatus . Cor. rubra . Anth. breviss. flavicantes .

28. *gnaphalodes* . E. anth. cristatis : cor. ovatis , rectis ; styl. incluso : fol. ternis : stigm. 4-part. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. mant. tab. 346. f. 11.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. pedal. Fol. breviss. obtusa , pubescent. Fl. copiosi , laterali-panicul. subterni . Cor. subrotunda , carnea .

29. *corifolia* . E. anth. cristatis : cor. ovatis ; styl. incluso ; calyc. turbinatis : fl. umbellatis . *Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 3. Pluk. mant. tab. 346. f. 5. Pet. gaz. tab. 3. f. 7.*

In Æthiopia h.

Caul. fruticosus , compositus . Fol. linear. glabra . Umbell. sessiles . Bract. in singulo pedunc. 3. purpur. Cal. & cor. purpur.

30. *articulata* . E. anth. cristatis : cor. ovatis , acuminat. styl. incluso , calyce longiore : fol. ternis . *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Cc iij

Frutex. Fol. adpressi, linear. glabra. Fl. racemosi, peduncul. Bract. foliisr. & binæ, calycis facie, & col. Cal. incarnatus. Cor. alba. Anth. fuscæ. Styl. atro-purpur. Stigm. apice cœrulefc.

31. *calycina*. E. anth. cristatis: cor. ovatis; styl. inclusio; calyc. patentiss. rotatis: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. musf. 2. tab. 11. f. 7.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. ped. cinereus, glaber, inferne simplex, dein trifido-dichotom erectus. Rami tridichotomi, foliosi. Fol. breviss. triquetra, obtusi, supra pubescent, subtus glabra. Fl. laterali-panicul. copiosi, subterni, terminal. pedicellati. Bract. alternæ. Cal. amplus, obtusus, coloratus. Cor. alba.

32. *cinerea*. E. anth. cristatis: cor. ovatis; styl. subexserto; stigmat. capitato: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 38.*

Erica. 6. Clus. hist. 1. p. 47.

b. Erica. V. Clus. hist. 1. p. 43.

In Europa, Oriente h.

Caul. suffruticos. pedal. ciner. Fol. linear. patentia, supra glabra, nitida, transversim rugosa, subtus canalicul. sature virid. Fl. longe spicati, verticillato-glomerati. Cor. sature purpur. ut in *Arbuto*, vel cœrulefc.

33. *paniculata*. E. anth. cristatis: cor. campanulat; styl. exserto: fol. ternis: fl. minutis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 175. f. 2. Seb. musf. 2. tab. 44. f. 4.*

In Ethiopia h.

Caul. fruticos. dodrant. & ultra, cinereo-purpurefc. superne umbellatim divisus. Fol. petiol. linear. obtusiusc. erecta, lineam longa, 6-fariam laxè imbricata, fere lævia. Fl. copiosi, ut totam tegant plantam, in cylindrum conglomerati, parvi, cernui, purpur. uti etiam calyc. & pedunc.

34. *australis*. E. anth. cristatis: cor. cylindric. stylo exserto: fol. ternis, patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Hispania h.

Frutex erectus, rigidus, cinereus. Fol. linear. obtusa, margine subscabra. Fl. terminal. 2-3. subteffil, laciniz cor. canescentes.

— *Foliis quaternis.*

35. *phyodes*. E. anth. cristatis: cor. ovatis, inflatis; styl. incluso: fol. quaternis: fl. subternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, foliosus, fusco-cinereus. Rami breves, simplices, supremi subdivi. Fol. imbricata, petiol. lato-linear, parula, carinata. Fl. cernui. Bract. 3. ovatae, in pedunculo sitae. Cal. coloratus. Cor. magnitudine *Pisi*, viscida, pallida, ore rubicundo, marcescens.

36. *empetrifolia*. E. anth. cristatis: cor. ovatis: fol. quaternis: fl. lateralibus, sessilibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Æthiopia h.

Caul. fruticos. subped. subdichotom. purpur. Fol. sparsa ut *Lycopodii*, quasi spiralter, unde numerus difficilis; linear, obtusa, erecto-patentia, incurva. Fl. subspicati. Spica ovata. Cor. superne purpur.

37. *cernua*. E. anth. cristatis, inclusis: fl. capitatis, ovatis: calyc. ciliatis: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. Ups. vol. 2. tab. 9. f. 3.*

Ad cap. b. Spei.

38. *retorta*. E. anth. subcristatis: cor. ovat-oblongis: styl. mediocri: fol. quaternis, recurvis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. Stock. 1774. tab. 7.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. frutescens, determinate ramosus, scabriuscul. Fol. oblong-ovata, setula terminata, supra convexa, glabra, lucida. Fl. terminal. corymbosi, subsessil. Cal. ruber. Cor. inflata, viscida.

*** *Anth. muticis, inclusis: fol. oppositis.*

39. *tenuifolia*. E. anth. muticis, inclusis: cal. corollisq. sanguineis: fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 2. tab. 9. f. 8.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. ped. nudus. Fol. linear, obtusa, carinata. Fl. 3-4. adgregati. Bract. 4. foliiform, calyci concolores. Cor. parva, ovata.

40. *Passerina*. E. anth. muticis, inclusis: cor. campanulat. pi-

Cc iv

stili. exserto: fol. opposit. *Syst. veg. ed. 14.*
Lin. Suppl. An. n. ad. Ups. vol. 2. tab. 9. f. 17
Ad cap. b. Spei h.

Fl. terminal. solitar. peduncul. Pedunc. albido-
 tomentosi.

— *Fol. ternis.*

41. *albens.* E. anth. muticis, inclusis: cor. ovato-oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. frutescens. Fol. linear. triquetra, erecta, lævia, acutiuscul. Cal. scariosus, albus. Cor. alba, ventre hyalino. Anth. 2-fid.

42. *spumosa.* E. anth. muticis, inclusis: cor. ternis calyc. comm. obtectis; styl. exserto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. musf. 2. tab. 9. f. 10. mala.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. pedal. & ultra. Fol. brevica, petiol. linear. glabra. Fl. solitar. sessil. erecti. Cor. albido-subdiaphana. Cal. sanguineus. Styl. longiss. nutans.

43. *capitata.* E. anth. muticis, mediocribus; cor. testis calyc. lanato: fol. ternis: fl. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Pet. gaz. 5. tab. 2. f. 10. Seb. musf. 1. tab. 20. f. 1.*

Ad cap. b. Spei h.

Dignoscitur fl. globosis, lanugine luteo-viridi obtectis. Caul. fruticos. cinereo--purpur. Fol. erecta, petiol. linear. punctis elevatis utrimq. scabra; superiora hirsuta. Fl. lateral. solitar: Cor. semi-4-fid. calyce non longior, obtusa, hirsuta, rubicunda.

44. *melanthera.* E. anth. muticis, mediocribus: cor. campanul. cal. colorato longioribus: stylo exserto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticosus, flexilis. Fol. linear. obrufa, lævia, patula. Fl. terminal. subumbellati, confertim sparsi, subnutantes. Pedunc. purpureasc. Cal. & cor. sanguinea, laciniis subrotund-ovat. Anth. 2-fid. atræ.

45. *Thunbergii.* E. anth. muticis, mediocribus: cor. planis, tubo globoso; stylo exserto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Ad. Ups. 2. tab. 9. f. 2. mala.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. raro ramosus, rufescens, teres. Fol. ferè adpressa, sessil. linear. acuta, lævia. Fl. terminal. peduncul. bracteati.

46. *absinthiodes*. E. anth. muticis, inclusis; cor. ovat-campanul. styl. exserto; stigm. subinfundib. Syst. veg. ed. 14. Pluck. phyt. 47. f. 14.

Ad cap. b. Spei h.

Frutex statura *Absinthii*, paniculatus, caule rufo; ramis ternis. Fol. linear. extus gibba, subhirsuta. Fl. terminal. Cor. pallida. Anth. 2-fid. atropurpur. Stigm. purpur.

47. *ciliaris*. E. anth. muticis, inclusis: cor. ovatis, grossis; styl. exserto: fol. ternis (ciliatis): racemis secundis. Syst. veg. ed. 14.

In Lusitania h.

Caul. suffruticosus, 2-3-ped. Fol. sæpe in verticillos obliquos disposita, sessil. ovata, acuta, margine reflexo. Racemus longus, fl. nutantibus. Cor. magna, ore contracto, inæquali, purpureo-cærul.

48. *hispidula*. E. anth. muticis, inclusis: cor. subrotundis: fol. subternis, ovatis, acutis, ciliatis: caul. hispido. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. decumbens, semiped. strigosus. Fol. subsessil. horizontaliter patula, lævia. Fl. rarius sparsi, parvi.

49. *leucanthera*. E. anth. muticis, exsertis: fol. ternis: cor. campanulat. cal. albo; stylo exserto: fl. ternis. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.

Ad cap. b. Spei.

Cor. & anth. albæ.

— Foliis quaternis.

50. *subiflora*. E. anth. muticis, inclusis: cor. clavatis, grossis; styl. incluso: fol. quaternis, subulnatis. Syst. veg. ed. 14. Seb. musf. 1. tab. 20. f. 4. Pluk. mant. tab. 346. f. 9.

Ad cap. b. Spei h.

Cor. pubescent. laciniis lanceol. incurvæ, carneo-purpur.

51. *curviflora*. E. anth. muticis, inclusis: cor. clavatis, grossis; styl. incluso: fol. quaternis, glabris. Syst. veg. ed. 14. Seb. musf. 2. tab. 19. f. 3.

Ad cap. b. Spei h.

410. OCTANDRIA MONOGYNIA.

Adfinis priori. Cor. pubescent. longiss. laciniis lanceol-subul. sed rami pilosi, & fol. glabra.

52. *coccinea*. E. anth. muticis subinclusis: cor. clavatis, grossis; styl. incluso; calyc. hirsutis: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Seb. mus. 1. tab. 21. f. 4.*

In Æthiopia h.

Caul. fruticos. Rami superne umbellatim dispositi. Fol. ramea sena, lineari-subul. pubescenti-scabrida; superior. quinata. Fl. lateral. copiosi, conferti. Cor. pubescens, coccinea.

53. *cerinthoides*. E. anth. muticis, inclusis: cor. clavatis, grossis; stigm. incluso, cruciato: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14. Sem. mus. 2. tab. 22. f. 4. & tab. 34. f. 6.*

In Æthiopia h.

Caul. fruticosus: ramis compositi, foliosi, brunnei. Fol. petiol. linear. scabra. Bract. extus hirsutæ. Fl. subcapitati, pubescent. Cal. quasi duplicatus. Cor. maxima, hirsuta, rubra.

54. *fastigiata*. E. anth. muticis, inclusis: cor. hypocraterif. fasciculat. styl. incluso: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Fruticul. ramis 4-fariam stria exaratis. Fol. linear. acumin. triquetra, lævia, margine scabra, erecta. Fl. fastigiati. Cor. tubo cylindrico; limbo 4-part. subtus rubro, supra albo, lacin. subcordat.

55. *cubica*. E. anth. muticis, inclusis: cor. campanulat. acutis; styl. incluso: cal. 4-gono: fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. determinate ramosus. Fol. patentia, linear. acuta, subincurva; petiol. albis. Fl. terminal. corymbosi. Pedunc. subtoment. bract. fetaceis. Cal. scariosus. Cor. semi 4-fid. purpur. basi pallida. Anth. breviss.

56. *denticulata*. E. anth. muticis, inclusis: cor. ovat-infundibulif. stylo incluso; calyc. denticulat. fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei.

Caul. distorti E. vulg. Fol. conferta, subteretia, patentiuscula, lævia. Fl. terminal. subfascicul. Cal. duplicatus.

37. *vifcorta*. E. anth. muticis, inclusis: cor. campanulat. glutinosus; styl. incluso: fol. quaternis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. determinate ramosus. Fol. linear. acuta, erecta, margine scabra. Bract. calycinae adproximatæ. Cal. subulat. Cor. valde mucosa, purpurasc. semi-4-fid. lacin. erect. acutis. Anth. 2-fid.
38. *granulata*. E. anth. muticis, inclusis: cor. globosis: styl. incluso: cal. subimbricat. fol. quaternis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
Simil. E. ramentacea. Caul. determinate ramosus. Fol. linear. erecta. Fl. terminal. pauci, peduncul. Cal. breviss. scariosus. Cor. rubra. Anth. quasi bicornes.
39. *comosa*. E. anth. muticis, inclusis: cor. ovar-oblong. stylo incluso: fol. quaternis: fl. congestis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. ped. erectus, obscure cinereus, ramis supra fl. congestis. Fol. linear. obtusiusc. erecta. Cal. scariosus, subdiaphanus. Cor. E. *albentis*, alba.
60. *Sparmanni*. E. anth. muticis, subinclusis: capitulis 4-fl. cor. tubulosis, strigoso hispidis: fol. quaternis, imbricat. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad. Holm. 1778. tab. 2.
Ad cap. b. Spei h.
Singularis est capitulis fl. semper divis in 4. fl. Capitulum, antequam fl. elongantur, globum echinatum efformat, ex patentiss. luteis fetis folior. involucri, & calyc. Cor. hirsutiss.
61. *Ma Soni*. E. anth. muticis, inclusis: cor. cylindric. grossis: fl. capitatis: fol. octofariis imbricat. pubescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad. cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. filiform. fol. undiq. tectus. Fol. quaterna, conferta, breviss. elliptica, obtusa, ciliata.
- **** Anth. muticis, eris: *follex. ternis.*
62. *Pluknetii*. E. anth. muticis, longiss. exsertis: cor. cylindr. styl. exserto; cal. simplicibus: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Chamæpythys &c. *Pluk. mant. tab. 344. f. 3.*

Seb. musf. 2. tab. 25. f. 5.

In Æthiopia h.

Simil. sequent. sed cal. simpl. Cor. obsolete 4-fid. phœnic. Fruticulus. Fol. conferta, terminal. distantia, terna, crasse petiol. linear. semiteret. Fl. lateral. solitar. vel binati, peduncul. nutantes. Cor. phœnic. longa, cylindrica, ore obsolete 4-fid. Stam. cor. duplo longiora.

63. *Petiverii*. E. anth. muticis, longiss. exsertis: cor. acutis; styl. exserto; cal. imbricat. fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Frutex fuscus, Rami tecti ramulis ternis, breviss. confertis, pubescentibus. Fol. conferta, subulata, subtrigona. Fl. terminal. solitar. cernui. Cal. subcartilagin. Cor. lutea, ore 4-fid.

64. *nudiflora*. E. anth. muticis, exsertis: cor. cylindric. styl. exserto: fol. ternis; ramis tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. flexuos. determinate ramosus, tomentosus. Fol. erecta, linear. subtus sulco exarata. Fl. per ramos sparsi, copiosi. Cal. omnium minimus.

65. *Prunides*. E. anth. muticis, exsertis: cor. tectis cal. lanato; styl. exserto: fol. ternis; fl. sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Pet. græ. 3. tab. 2. f. 9.*

Eriocephalus &c. *Pluk. mant. tab. 347. f. 9.*

Frutex &c. *Seb. musf. 2. tab. 63. f. 7.*

In Æthiopia h.

Rami ramosi. Fol. patent. subciliata. Capitulum globosum. Cor. truncata, alba, stamin. rubris.

66. *imbricata*. E. anth. muticis, exsertis: cor. campanulat. calyc. imbricatis, stylo exserto: fol. ternis. *Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. ped. purpur. 2-fid. apice paniculato-ramosus. Fol. petiol. linear. subteretia, petiolis latis, crassis. Fl. laterales, 2-3. Cor. tecta calyce, alba.

67. *umbellata*. E. anth. muticis, exsertis: cor. campanulat. styl. exserto: fol. ternis, acerosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Lusitania h.

Caul. fruticos. varie ramosus, plerumq. inclinatus.

Fol. brevia . Umbell. terminal. simpl. Cor. cœrulefcens . Anth. basi gibbofo-cäudatæ .

— Fol. quaternis , pluribusque .

68. *purpurefcens* . E. anth. muticis , exfertis : cor. campanulat; styl. exserto : fol. subquaternis : fl. fparlis . *Syft. veg. ed. 14.*

Erica corios fol. VII. Cluf. hift. 1. p. 43.

In Europa australi h.

Caul. procumb. Rami ped--cubit. atro--purpurafc. Cor. purpurafc. Anth. profunde 2-fid. Fol. in fummis ramulis quina .

69. *vagans* . E. anth. muticis , exfertis : cor. campanulat. ftylo exserto : fol. subquaternis : fl. folitar. *Syft. veg. ed. 14.*

In Africa , Tolofæ h.

Caul. fruticof. fcabriufcul. Rami ultimi divaricati , albid. Fol. linear. obtufiusc. conferta , breviuscula . Fl. ad latera ramulorum fparfi , peduncul. Cal. coloratus , breviff. Anth. 2-part.

70. *herbacea* . E. anth. muticis , exfertis : cor. oblong. styl. exserto : fol. quaternis : fl. fecundis . *Syft. veg. ed. 14.*

Erica corios fol. VIII. Cluf. hift. 1. p. 44. quæ noftra planta hyemalis eft.

Erica corios fol. IX. Cluf. hift. 1. p. 44. Jacq. Austr. tab. 32. quæ noftra planta vernal. feu iunior fl. carneo .

In Europa australiori , locis fubalpinis h.

Interdum unus , alter caulicul. interdum denfum format fruticulum . Fol. breviter perfol. linear. acumin. patentiff. craffiusc. antice plana , fubtus exiguo fulco exarata . Fl. primo vere carnei ; in autumnno virentes .

71. *multiflora* . E. anth. muticis , exfertis : cor. cylindric. styl. exserto : fol. fubquinis : fl. fparfis . *Syft. veg. ed. 14. Garid. Atx. tab. 32. Bauh. hift. 1. p. 356.*

In Gallia , Anglia &c. h.

Simil. fequenti , fed rami non angulati . Altitudo humana . Fol. obrufa , bafi gibba , patentia . Fl. purpurafc.

72. *mediterranea* . E. anth. muticis , exfertis ; cor. ovat. styl. exserto : fol. plerumq. quaternis , patentiffim. fl.

sparsis. *Syst. veg. ed. 14. Bauh. hist. 1. p. 336.*

Erica corios fol. 11. Clus. hist. 1. p. 42.

In Austria alpinus h.

Caul. ramis angular. albicantibus. Fl. lateral. Cal. coloratus. Cor. purpureo. *Simil. priori, sed cor. omnino ovata: rami angulati, albi.*

73. *tetragona*. E. fol. ternis: styl. incluso; cor. 4-gono, oblong. calyc. lineari: fl. racemosus, secundis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Fl. lutei E. *lutea*, sed longiores.

74. *grandiflora*. E. fol. quaternis: styl. exserto; cor. cylindric. calyc. simpl. fl. lateral. subcurvatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei.

Simil. E. curviflorae, sed fol. longiora.

- Forskali*. E. (verticillata) verticillo ex ala fol. prodeunte. *Forsk. Egypt.*

Circa Constantinopolim.

Ad quodlibet fol. in iis verticillis, qui fl. quoque ferunt, pl. pedunc. oriuntur: apices ramorum raro floriferi, sed fl. medium caulem occupant.

- verticillata*. E. stylis exsertis: cor. magnis cylindric. pubescent. subverticillat. ramis verticillat. brevibus: fol. quinato-senis. *Berg. Fl. cap. Herm. Afric. 2. Ad cap. b. Spei h.*

Caul. altus, fruticosus, fol. imbricatus. Fol. caulina 6. ramea 5. linear. petiol. super. ciliata. Fl. laterali-verticill. 3-4. congesti. Cor. subincurva, rubicundo-purpur.

- virgata*. E. stigmatibus 4-lob. exsertis: cor. globofo-campul. numerosis, secundis: ramis virgatis: fol. ternis, hirsutis. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. pl. fruticosi, spitham. brunnei, aphylli: rami in formam pyramidal. congesti. Fol. subteretia, lineæ, & ultra longitudine. Fl. lateral. subverticillati, terni, congesti, numerosi, parvi, nutantes. Cor. cinerea.

- nudicaulis*. E. anth. stylisq. inclusis: cor. umbellat. ovat. fol. subquaternis, subcabridis: caul. nudo, determinate ramoso. *Berg. Fl. cap.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. ped. & ultra, simpl. brunneus. Rami erecti, umbellati. Fol. petiol. linear. imbricato-subpatula. Bract. 3. linear-lanc. ciliatæ, subalbid. Cal. carneo-rubicun. Cor. supra rubra, fubtus cal. concolor.

588. OPHI-RA. Invol. 2-valv. 3--fl. Cor. 4--pet. supera. Bacca 1-locul.

strida. O. Syst. veg. ed. 14.

In Africa h.

Frutex erectus. Fol. opposita, ovat-linear. Fl. lateral. sessil.

589. DAPHNE. Cal. o. Cor. infundibulifor. 4-fid. marcescens, flam. includens. Bacca 1-speru.

* Fl. lateralibus.

1. *Mezereum.* D. fl. sessil. ternis, caulinis: fol. elliptico-lanceol. deciduis. Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 263. Ludw. ed. tab. 63. Kniph. cent. 1. tab. 23. Knorr. del. 1. tab. K. 6. Black. tab. 582.

Dafnoide. Matth.

In Europæ boreal. sylvis h.

Caul. fruticos. Fol. sparsa, sessil. integerr. subtus dilutiora. Spica ex fl. 2-3-4. cylindrica, caulem ambiens. Fl. odori, rubri, raro albi. Baccæ rubræ.

2. *Thymelæa.* D. fl. sessil. axillaribus: fol. lanceolat. caulibus simpliciss. Syst. veg. ed. 14. Ger. prov. tab. 17. f. 2.

Thymelæa &c. Pluk. alm. tab. 229. f. 2.

In Hispania &c. h.

Caul. pl. palm. Fl. sparsi, non racemosi. Cor. ex albo-lutea.

3. *pubescens.* D. fl. sessil. lateralibus, aggregatis: fol. lanceol-linear. caul. pubescente. Syst. veg. ed. 14.

In Austria.

Caul. simplic. Fol. remota, alterna, annua. Fl. angusti, 3. pauciores, tubo filiform. pubescente. Simillima priori.

4. *villosa.* D. fl. sessil. lateralibus, solitar. fol. lanceol. planis, ciliatis, pilosis, confertis. Syst. veg. ed. 14.

In Lusitania, Hispania h.

Frutex ramis alternis. Fol. Polygoni, vix petiol. subtus præcipue pilosa. Ex alis rudimenta plurima foliosa ramulorum, unde quasi verticillata. Fl. parvi, angusti.

5. *Tartan-rai*. D. fl. sessil. aggregatis, axillaribus: fol. ovatis, utrimq. pubescentibus, nervosis. *Syst. veg. ed.*

14. *Lob. ic.* 160. *Pluk. phys. tab.* 318. f. 6.

In Gallo-provincia &c. h.

Fruticulus. Fol. mollia, candicant. & veluti sericea. Fl. ex albo-pallent.

6. *alpina*.

D. fl. sessil. aggregatis, lateralibus: fol. lanceolat. obtusiusc. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed.*

14. *Gesn. fasc.* 6. *tab.* 3. f. 7.

Chamælaea &c. *Lob. ic.* 370. *Barr. ic.* 234.

b. *Thymelæa incana &c.* *Pluk. alm. tab.* 229. f. 3.

In alpiibus Italiae, Austria &c. h.

Suffrutex cortice cinereo. Fol. in summis ramul. rosulam efformant, ovato-longa, pallide virid. iuniora hirsuta; adulta calva. Fl. in centro rosulae, subhirsuti, albi. Fruct. oval. hirsutus.

7. *Laureola*. D. racemis axillar. 3-fl. fol. ellipticis, glabris. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. Aufl. tab.* 183. *Bluck. tab.* 62. *Dod. pempt.* 365.

Chamedasne. Matth.
In Europa h.

Tota planta flexilis, supra medium ramosa, ramis apice foliosis. Fruticul. 2-ped. erectus, cinereo-fuscus. Fol. digitum longa, laurinae firmitatis, alterna, breviter petiol. perennant. crassa, integerr. supra satore virid. subtus dilutiora. Racemi nutantes, bracteis concavis, alternis. Fl. trifles.

8. *pontica*. D. peduncul. lateralibus, 2-fl. fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed.* 14.

Thymelæa &c. *Tourn. is.* 3. *tab.* 180.

In Ponto h.

Caul. sub 2-ped. quandoq. inferne ramosi. Fol. inordinata, figura, & consistentia *Limonii*, nitida, glabra. Cor. luteo-virid. Bacca virid.

9. *dioica*. D. fl. axillar. geminis: fol. linear-lanceol. *Syst. veg. ed.* 14. *Gouan. Illuf. tab.* 17. f. 1.

Habitat

Non est Passerina ciliata. Lin. Frutex ped. ramosiss. ramorum fol. deciduis, cicatricibus exasperatis. Fol. conferta, fere imbricata, glaberr. Fl. sessil. Cor. albido-sulphur. tubo basi ventricoso; limb. 4-fid. lacin. acutis.

.. Fl.

** *Fl. terminalibus*.

10. *indica*. D. capitulo terminal. peduncularo: fol. opposit. oblong-ovat. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Osb. ir. 246.*

In China h.

Frutex parvus, spitham. Fol. petiol. integerr. Fl. 6-8. sessilibus.

11. *cneorum*. D. fl. terminal. fasciculat. sessilibus: fol. lanceol. mucronatis, nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 426.*

Thymelæa &c. Gesn. fasc. 5. tab. 3. f. 6. Pollich. Palat. n. 380. cum icon.

Daphne &c. Duham. arb. 2. tab. 94.

Cneorum. Matth. hist. 46. Clus. hist. 89.

In Europa sylvis apricis collium, & montium h.

Fruticul. vix semiped. debilis, ramosus, fulcus. Fol. sparsa, subsessil. integerr. rigida, glabra; in fummis ramis congesta, nervo medio vix conspicuo, mucronato. Cor. purpur. raro alba, odora, lacin. ovat-lanc. obtusis, vel acutis. Bacca albida.

12. *Gnidium*. D. panicula terminal. fol. lineari-lanc. acumin. *Syst. veg. ed. 14.*

Thymelæa &c. Clus. hist. 1. p. 87. Cam. epit. 974. Pluk. phyt. tab. 113. f. 3.

In Italia &c. h.

Caul. humifusi, fruticosi, cubital. & ultra, ramosi. Fol. viscosa, annua, glabra. Fl. congesti, albi, supra rubri, cincti fol. suaveolentes. Fruct. maturi rubri, succosi. *Bis quotannis florens.*

13. *squarrosa*. D. fl. terminal. pedunculat. fol. sparsis, linear. mucronat. patentibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Thymelæa &c. Burm. afric. tab. 49. f. 1.

In Æthiopia h.

Frutex ramosus. Fol. plurima, inordinata, sessil. cinerea, ita congesta, ut caput efformant. Foliol. min. axillar. superne. Fl. terminal. simul iuncti. Cor. alba.

14. *oleoides*. D. fl. geminis, terminal. sessilibus: fol. elliptico-lanceol. glabris. *Syst. veg. ed. 14. Schreb. dec. 13. tab. 7.*

In Oriente h.

Caul. fruticosus, compositus.

Tom. II.

D d

15. *fatida*. D. glabra; fl. terminal. congestis, sessilibus: fol. oppositis, petiolat. ovat-oblong. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Tahiti.
An satis distincta a D. indica?
16. *rotundifolia*. D. hirsuta; fl. terminal. congestis, sessilibus: fol. subpetiol. oppositis, elliptic. obtusis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Tonga Tabu h.
 Rami tomentosi, cani.
17. *odora*. D. fl. aggregatis, terminal. sessilibus: fol. alternis, ovatis, glabris. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*
Jamnia Kintio. Kamp. am. exot. Fasc. V. p. 844.
In Japonia h.
 Caul. frutescens, erectus, dichotom. nudus, glaber, fuscus. Rami divaricato-erecti. Fol. in apice ultimorum ramorum adproximata, pollicar. inæqual. sessil. acuta, integerr. patentia, apice recurvo, supra satore virid. subtus pallidiora. Fl. in ultimo ramulor. apice, sessil. sub 11. Bract. inter fol. & florum umbellam sessilem, imbricatæ, lanceol. sub 10. Cor. tubo purpur. limbo lacin. extus purpur. intus incarnatis.
-
- candidum*. D. (Thymelæa) fol. petiolat. acuminat. mollibus, utrimque villosis, fl. longioribus. *Scop. Fl. Carn. In Carniola &c.*
 Differt a D. *Cneora* cortice foetido; fol. etiam summis fl. duplo longioribus: cor. segment. ovaris, albis.
590. *DIRCA*. Cal. o. Cor. tubulosa, limbo obsoleto. Stam. tubo longiora. Bacca 1-sperm.
1. *palustris*. D. *Syst. veg. ed. 14. Am. acad. 3. tab. 1. f. 7. Duham. arbr. 1. tab. 212.*
In Virginie paludosis h.
 Altitudo humana. Frutex facie *Daphnes Mezerei*. Fol. oblong. acumin. Fl. terni e singula gemma, nutantes, pedunculis breviss. Cor. alba.
391. *GNIDIA*. Cal. infundibulif. 4-fid. Petal. 4. calyci inserta. Sem. 1. subbaccatum.
1. *pinifolia*. G. fol. sparsis, linearibus: floralibus verticillat. *Syst. veg. ed. 14.*

Rapunculus &c. *Burm. afr. tab. 41. f. 3.*

Valerianoides &c. *Seb. mus. 2. tab. 32. f. 3.*

Ad cap. b. Spei h.

G. pinifolia. Lin. Suppl. differens est, monente Vahl.

Fruticulus. Fol. sparsa, unguicular. breviter petiol. linear. acumin. obtusa, subcarnosa, carinata, glabra. Spica subrotunda, bracteis, & fl. constans. Cal. albus. Petal. calyce breviora, lanceol. alba. Stam. 4. intra tubum; reliqua 4. extra.

2. *radiata.* *G. fol. subulat. triquetris, acutis: capitulis terminal. sessil. radiatis: bracteis lanceolat. Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Frutex prolifer, scaber. Fol. sparsa, glabra. Fl. extus subvillosi. Petal. 4. calyce min. pilosa. Stam. 4. exserta; 4. in fauce.

3. *simplex.* *G. fol. omnibus linear. acutis: fl. terminal. sessilibus. Syst. veg. ed. 14.*

Thymelæa &c. Breyn. cent. tab. 6.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. semiped. tuberculosi, inæqual. Fol. sparsa, erecta, lævia. Fl. nudi, sessil. lutei calyc. petal. antheris. Fol. floralia reliquis non latiora.

4. *tomentosa.* *G. fol. sparsis, ovat-oblong. glabris, margine scabris. Syst. veg. ed. 14.*

Ad cap. b. Spei h.

Caul. erectus, fruticosus, purpur. Rami aggregati: ramulor. apices lanati, ut congeneres. Fol. subcarnosa, glauca, pubescent. superiora pilosa, apice subpurpurea. Fl. terminal. 3-4. aggregati. Bract. foliiformes. Petal. parva, emarginata, albo-hirsuta, sericea. Stam. 4. exserta; 4. in fauce.

5. *sericea.* *G. fol. ovatis, tomentosis; floralibus quaternis, caul. hirsuto; fl. corona fetis 8. Syst. veg. ed. 14.*

Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 49. f. 2.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. plusquam pedal. Fol. unguicul. sessil. obtusa, erecta. Fl. terminal. sessil. in capitulum collecti. Cor. extus albido-hirsuta, lacin. ovat. obtusis, concavis. Stam. in tubo 4; in fauce 4.

6. *oppositifolia*. G. fol. oppositis, lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*
Thymelææ &c. Pluk. alm. tab. 323. f. 7.
b. Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 49. f. 3.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. ped. purpur. Fol. semiunguic.
 sessil. imbricato—patula, tuberculosa, glabra:
 suprema apice longuin. Fl. terminal. adgregati.
 Cor. albida, extus villosa, intus rubra. *Culca*
in hortis petala acquirit.
7. *capitata*. G. fol. sparsis, lanceolat. glabris: fl. capitatis,
 bracteis obvallatis; pedunc. nudo. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. ramis erectis, teretibus, purpu-
 rasc. Fol. remotiora, angustiora, lævia. Fl.
 terminal. Involuc. æquale, lanceol. 8 phyll.
 flosculis dimidio brevius. Flosculi 16. sessil.
 pubescent. cani. Tubus filiform. limb. brevis,
 5-part. Stam. 10. quinque extra faucem, 5.
 intra. *Flos Passerinae siml. Forte Dais?*
8. *filamentosa*. G. fol. ellipticæ ovatis, approximatis, glaberr.
 fl. capitatis: filamentis capillaribus. *Syst. veg.*
ed. 14. Lin. Suppl.
Ad cap. b. Spei h.
 Frutex cicutricibus folior. tuberculatus. Fol. al-
 terna, sessil. integerr. avenia. Capitula fl. solitar.
 sessil. Involuc. glabrum. Cor. villosa, limbo
 4 part. *Variet. fol. angustior. sed filamentis fa-*
ci e dignoscitur.
9. *imbricata*. G. fol. oblong. 4-fariam imbricatis, sericeis: fl.
 terminalibus in axill. fol. *Syst. veg. ed. 14. Lin.*
Suppl.
Ad cap. b. Spei h.
10. *pinifolia*. G. fol. lineari-subulat. acutis, supra planis: fl.
 axillaribus, binis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei h.
 Rami læves, nec tomentosi. Fol. non pungen-
 tia, subtus convexa, lævia, parula. Fl. e
 summis ramulis, glabri: limbus acutus, tubo
 duplo longiore. Anth. 4. supra faucem pilis
 cinctæ; & 4. intra tubum min.
11. *daphnifolia*. G. decandra: fol. oblong. planis, integerr. ca-
 pitulo terminal. pedunculato, involucrato: fl.
 5-fid. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Madagascar.

Habitus, folia, inflorescentia, involucrium, calyc.
fig. & hirsuties *Doidis* *Cot. nifolia* est: *structura*
vero, & situs partium fl. est exatē *Gniaie*, sed
non numerus.

Fol. alternā, nec opposita, ut in genere *Doidis*.
Involuc. fl. ut in *Daide*, sed 3-phyll.

Var. hirsuta = fol. oblong. spatulat. hirsutie
canis: fl. min.

= *glabra* = fol. oblong. ad basin attenuatis,
nuduscul. fl. ma.

polystachia. *G.* fol. sparsis, linear. obtusiuscul. sp. cis sub-
panicul. bract. ovatis: nectar. 8-phyll. *Berg.*
fl. cap.

Ad cap. b. Spei h.

Caul. fruticos. vix ped. ramosus, obscure ci-
nereus. Fol. vix unguicul. sparsa, adproxima-
ta, subfess. Spicæ pl. subrotun. Bractæ fl.
distinguentes ovatæ, obtusæ, glaucæ. Cal. o.
Cor. hirsuta, supra rubra, subtus albida.

592. *STELLE*. Cal. o. Cor. 4-fid. segment. æqualibus, tubo
RA. longo. Stam. breviss. Sem. 1. rostratum.

1. *passerina*. S. fol. linearibus: fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14.*
Passerina. Bauh. hist. 3. p. 456. Fuchf. p. 535.
Linaria &c. Colum. ceph. 1. tab. 80.

In Italia, Helvetiæ &c. campis aridis, apicis, &
inter stipulas ☉.

Facies Thesi alpini. Caul. erect. sesquipalm. ra-
mosus. Fol. alterna, integerr. glabra. Fl. la-
terales, sessil. ex spicis longis, laxis, in lana
minura. Stipul. sub fl. ovat-lanceol. Cor. par-
va, viridula, apicibus luteis.

2. *Chamaejas*-S. fol. lanceol. cor. 3-fid. *Syst. veg. ed. 14. Ann.*
me. ruth. tab. 2.

In Sibiria 24.

Rad. crassa. Caul. multi, dodrant. & ultra, de-
biles, inferne rubent. Fol. brevia, alterna,
utrinq. acuta, nervosa, subtus dilutiora, *Cen-*
taur. min. simil. Fl. umbellati. Cor. supra al-
ba, subtus purpur.

593. *PASSE*-Cal. o. Cor. 4-fida. Stam. tubo imposita. Sem.
RINA. 1. corticatum.

1. *filiformis*. P. fol. linear. convexis, 4-fariam inbriatis: ra-
mis tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. ph. t.*
tab. 213. f. 9.

In Ethiopia h.

D d iij

- Fruticul. Fol. alterna, sessil. erecta, 2. lineas longa semiteret. lateribus compressa. Fol. floralia basi margine lato, membranac. quod non in reliquis. Fl. axillar. sessil. Cor. lacin. oblong. obtusis.
2. *hispida*. P. fol. carnosus, extus glabris: caul. tomentoso. *Syst. veg. ed. 14.*
 Sanamunda 3. *Clus. hist. 1. p. 89. Breyn. cent. tab. 19.*
Passerina metnan. Forst. Æg-Arab. Vahl.
In Italia, Gallia provincia &c. h.
Sinon. Clus. ad Daphnem suam dioicam revocat Gouan. Illust. tab. 17. f. 1.
 Caul. ramosiss. diffusus. Rami crebri, lignosi, lanuginosi. Fol. parva, conferta, sessil. thymiform. ovat-lanceol. in medio depressa, supra tomento albida, subtus obscure virid. Fl. pl. parvi. Cor. lutea.
3. *ericoides*. P. fol. linear. lævibus, subimbricat. cor. globosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Ad cap. b. Spei h.
Facies omnino Ericæ, Frutex statura P. filiformis.
 Ramuli pubescent. Fol. brevia, *Ericæ*, opposita, ovat-oblon. florifer. subcordat. Fl. in summis ramulis laterales, sessiles. Cor. colorata. Sem. ovata, atra, nitida.
4. *capitata*. P. fol. linear. glabris: capitul. pedunculat. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*
Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 48. f. 3.
Ad cap. b. Spei h.
 Caul. fruticos. ped. cinereus, inferne simpl. dein ramosus. Rami subumbellati. Fol. sparsa. Pedunc. tomentosi, incrassati. Fl. sessil. Cor. utrinq. albo-hirsuta. Stam. supra faucem 16. quorum 8. castrata.
5. *ciliata*. P. fol. lanceolat. subciliat. erectis: ramis nudis. *Syst. veg. ed. 14.*
Thymelæa &c. Burm. afr. tab. 47. f. 2.
Erica &c. Seb. mus. 2. tab. 12. f. 9.
 Sanamunda 1. *Clus. hist. 1. p. 88.*
In Æthiopia, Hispania &c. h.
 Caul. breviss. fruticos. purpurasc. Fol. sparsa, semiunguicul. sessil. imbricato-patent. linear. obtusa, concava, pallide virent. Fl. terminal. 4-5. aggregati, sessiles. Cor. lacin. purpureus, & fauce villosa.

6. *uniflora*. P. fol. linear. oppositis: fl. terminal. solitar: ramis glabris. *Syst. veg. ed. 14.*
Thymelæa &c. *Burm. afr. tab. 48. f. 1. 2.*
In Æthiopia f.
 Caul. fruticos. ped. ramofus. Fol. sessil. quandoq. lineari-cuneiform. glauca, vel saturate virid. Cor. hirsuta, extus cinereo-albida, sericea, intus purpur. *Var cor. alba.*
7. *anthylloides*. P. fol. ovatis, villosis: fl. capitatis, hirsutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Fl. extus hirsutiss. albi; intus in viva planta lutei, in sicca nigri.
8. *spicata*. P. fol. ovatis, villosis: fl. lateralibus, solitar. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
 Ramulis floriferis refert spicam foliosam.
9. *laxa*. P. fol. ovatis, sparsis: fl. capitatis: ramis laxis, cernuis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.
Simil. Ericoidi, sed differt fl. capitatis.
10. *grandiflora*. P. glaberrima: fol. oblong. acutis, concavis, extus rugosis: fl. terminalibus, solitar. sessilibus. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
In Africa h.
 Dignoscitur magnis fl. limbis, extus sericeis.
11. *Gnidia*. P. diandra, glaberrima: fol. lanceol. acutis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Bankia gnidia. Forst. gen.
In nova Zeelandia ad fissuras rupium; in littore maris; & in summis montium cacuminibus.
 Fol. rigidiora, & *Gnidie* similia.
12. *pilosa*. P. diandra pilosa: fol. linear. obtusis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Bankia tomentosa. Forst. gen.
In nova Zeelandia.
13. *prostrata*. P. diandra, pilosa: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Bankia prostrata. Forst. gen.
In nova Zeelandia montibus aridis.
594. LACHNÆA. Cal. o. Cor. 4-fid. limbo inæquali; (in quo differt a *Passerina*). Sem. 1. subbaccatum.
1. *eriocephala*. L. capitulis solitar. linatis: fol. 4-fariam imbricatis. *Syst. veg. ed. 14.*
In Æthiopia h.

- Fol. trigona, gibba. Capitula terminal. cincta
lana candida.
2. *conglomerata*. L. capitulis confertis: fol. laxis. *Syst. veg. ed.*
14.
Sanamunda 3 &c. *Breyn. cent. tab. 7.*
Ad cap. b. Spei h.
Frutex *Rosmarini* facie. Rami alba lanugine ob-
fusi. Fol. *Polii*, *Lavandulae*, supra virid. sub-
tus lanuginosa. Capitul. terminal. umbellata.
Fl. Pisi magnitudine, extus albi.
595. BÆCKEA. Cal. infundibul. 5-dent. Cor. 5-pet. Capf. glo-
bosa, 4-locul. coronata.
1. *frutescens*. *Syst. veg. ed. 14. Osb. it. tab. 1.*
In China h.
Frutex habitu *Abrotani*, ramis virgatis: ramul.
brevibus, oppositis. Fol. opposita, linear.
acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. folitar. pe-
duncul. Petal. subrotunda.

DIGYNIA.

596. SCHMIE- CAL. 2-phyll. Cor. 4-petal. Germ. pedicel-
DELIA. lata, fl. longiora.
1. *racemosa*. S. *Syst. veg. ed. 14.*
Ufubis &c. *Burm. ind. tab. 32. f. 1.*
In India orient. h.
Arb. facie *Rhois Toxicoden*, ramis flexuosis. Fol.
alterna, petiol. subtoment. ternata: foliol. pe-
tiol. ovat-oblong. acumin. subserrata, nuda.
Racem. axillar. simpl.
597. GALENIA. Cal. 4-fid. Cor. o. Capf. subrotun. 2-sper-
ma.
1. *africana*. G. fruticosa, erecta: fol. linear. carnos. *Syst.*
veg. ed. 14.
Kali &c. *Bocc. mus. tab. 110.*
Atriplex &c. *Till. pif. tab. 15.*
In Africa h.
Frutex habitu *Tetragonie*, licet omnia minuta;
torus obsolete papillofus. Caul. teres, fetulis
raris reflexis. Fol. opposita, sessil. perennia.
Fl. panicul. dichotomi, sessil. albi.

2. *procumbens*. G. procumb. fol. ovaris, canaliculat. apice patulo, recurvato. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*
Ad cap. b. Spei.

asiatica. G. fol. alternis, ovato-oblong. *Burm. Ind. tab. 31. f. 5.*

In India h.

Arb. ingens, ramis divaricat. glaberr. lucidis.

Fol. subpetiol. integerr. nitida. Pedunc. terminal. racemosi, nudi. *Arb. grata Camellis.*

Fol. sapore Nasturtii hort.

598. WEIN- Cal. 4-phyll. Cor. 4-petala. Capf. 2-locul. 2-
 MANNIA. rostris.

1. *glabra*. W. fol. pinnatis; foliol. obovatis, crenatis, lævibus. *Syst. veg. ed. 14.*

In Jamaica h.

Arbuscula ramis oppositis, ultimis subpubescent.

Fol. opposita, impari-pinn. petiolo alato, articulis subovatis. Foliol. 11-13. parva, opposita, sessil. nuda, latere interiore ad basin angustiora, ferraturis utrimq. 3-4. Stipul. magnitudine folior. ovatae, inter paria petiolor. solitariae, deciduae. Racemi terminal. solitar. peduncul. simpl. erecti. Fl. multi, albi.

2. *tomentosa*. W. fol. pinnatis: foliol. ovatis, integerr. subtus tomentosis: stipul. caducis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Granada h.

Arb. valde ramosa, & foliosa, cortice fuscescent.

Fol. opposita, petiolo comm. alato. Foliol. 5-6-iuga, parva, crassiuscula, regularia. Stipul. solitar. Racemi ad apicem densiss. quasi spicae, pedicellis breviss. Nectar. campanulat. stam. cingens, membranac. integerr.

3. *trifoliata*. W. fol. ternatis: foliol. elliptic. lanceol. serratis, glaberr. panicul. compositis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

Ad cap. b. Spei h.

Facie non valde recedit a Pteleis. Frutex glaber.

Fol. opposita. Paniculae axillar.

4. *racemosa*. W. fol. simplic. ovaris, serratis, utrimq. glaberrimis: stipul. nullis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In nova Zeelandia.

In florescentia cum reliquis convenit; at fol. simplicibus, ma: distincta.

599. MOEHRINGIA. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Capf. 1-locul. 4-valv. polysper.

1. *muscosa*. M. Syst. veg. ed. 14. Jacq. Austr. tab. 449.

Alfine &c. Scheuch. alp. tab. 6. Pluk. alm. tab. 75. f. 1. Col. ecphr. tab. 290. Linder. hort. tab. 2.

b. Alfine &c. Morif. hist. 3. f. 5. tab. 23. f. 12. Segu. tab. 5. f. 1. Pluk. phyt. tab. 74. f. 3.

In alpinis Italiae, Helvetiae &c. umbrosis subhumidis 24.

Caul. debiles, dodrant. filifor. ramosiss. Fol. opposita, sessil. setacea, subulata, integerr. confluentia. Fl. axillar. longe peduncul. solitar. albi. Calyx laciniis ore pallentibus. Petal. patentia, angusta, elliptica, lanceol. alba, calyc. superantia. Capf. flavescens.

600 CODIA. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Receptac. comm. involucreatum.

1. *montana*. C. Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.

In nova Caledonia h.

Fol. opposita, petiol. elliptica, obtusa, integra, glaberr. Capitula terminal & axillar. breviss. globosa, pedunculata. Forte Brunia sp: fol. ellipticis.

TRIGYNIA.

601. POLYGONUM. Cal. 5-part. coloratus, segmentis ovatis. Stam. a 5 ad 8. Styl. 1-3. Sem. trigonum, nudum.

* *Atraphaxoides*, caul. frutescente.

1. *frutescens*. P. caul. fruticoso; calycinis foliol. 2. reflexis. Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 12. f. 2.

In Sibiria, Duauria h.

Frutex humilis, ramis non spinosis. Fol. rigida, & lente in mucronem abeuntia. Pedunc. recti. Petal. alba, in medio purpur. Cal. 2-phyll. Petal. 3. obcordat. Stigm. 3. Fructus triqueter.

** *Bistorta*, *spica unica*.

2. *Bistorta*. P. caul. simpliciss. monostachyo: fol. ovatis, in petiol. decurrent. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 421. Black. tab. 254. Ludw. ed. tab. 31. b. Bistorta britannica. Lob. ic. 292. Bauh. hist. 3. p. 539.*

Bistorta. Math.

In Europa pratis subalpinis 24.

Rad. magna, tuberosa, semel-bis-ter intorta.

Caul. 2-ped. genicul. tumidis. Fol. glabra, plana, vel undulata, subrus albida; ima petiol. summa sessili-amplexicaul. cordato-lanceol. Spica unica, ovata, densa, purpur.

3. *viviparum*. P. caul. simpliciss. monostachyo: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 13. Gmel. Sib. 3. tab. 7. f. 2.*

Bistorta alr. media. Pluk. tab. 151. f. 2.

In Europa subalpinis pascuis duris 24.

Rad. magna, intorta. Caul. dodrant. Fol. radical. petiolat. elliptica, firma, ore punctato, vel serrata: caulina linearilanceol. cæterum similia. Spica 2-unc. tenuis; in planta iunior densa, in adulta rara, strigosa. Fl. sessil. profunde divisi, albi. Bract. argute lanceol. Spica fl. inferior. in bulbum transeunt sæpe viviparum.

*** *Perficaria*, *pistil. 2-fid. aut flam. minus 8.*

4. *virginianum*. P. fl. pentandr. semidigyn. cor. 4-fid. inæqualibus: fol. ovatis. *Syst. veg. ed. 14.*

Perficaria &c. Moris. hist. 3. p. 589.

In Virginia 24.

Caul. pl. virentes, genicul. tumidis. Fol. ampla, 6. digit. longa, mucronata, nervosa, ex cærul-virid. plerumq. maculata. Fl. spicati, albi. Cor. clausa.

5. *lappathifolium*. P. fl. pentandr. semidigyn. flaminibus cor. regulari æqualibus. *Syst. veg. ed. 14.*

Perficaria &c. Lob. ic. 315.

In Gallia.

Caul. erectus, firmus, lævis. Vaginæ pubescent. ciliatæ. Fol. petiol. ovata, magnitudine *Phytolacca*. Pedunc. oppositifol. spicato-racemosi.

6. *amphibium*. P. fl. pentandr. semidigyn. spicata ovata. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 282.*

b. Perficaria &c. *Trew. Com. nor. 1737. tab. 5. f. 1. 2.*

In Europa, ad lacus 24.

Caul. rubri, longe reptantes. In *natibili* fol. *Biflora*, petiolo alato, elliptico-lanceol. ora ferrata, vel ciliata. In *terrestri* fol. minus dura, erecta, hirsuta.

7. *filiforme*. P. fl. pentandr. digyn. spicis filiform. fol. ovatis: stipul. ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. erectus, villosus, ferrugin. Rami erecti, alterni, hirsuti. Fol. pollic. alterna, petiol. integerr. nervosa, ciliata, villosa. Petiol. vaginant. dilatati. Stipul. interfoliac. inflatæ, membranac. Fl. inferne remoti, minuti. Spica spitham. apice cernua. Bract. amplexicaul. barbata, 3--fl. Cor. lacin. 3. superior. rubris, infima alba.

8. *ocreatum*. P. fl. pentandr. trigynis: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 8. Sloan. Jam. 1. tab. 3. f. 1.*

In Sibiria &c.

Caul. pedalis--3--cubit. procumb. ad nodos membranæ albido--fuscæ. Fol. subsessil. angusta, revoluta, splendens. Stipul. sunt vaginæ amplæ, ventricosæ, læves. Rami floriferi axillar. racemosi.

9. *Hydropiper*. P. fl. hexandr. semidigyn. fol. lanceol. stipul. submuticis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 119. Trew. Comm. nor. 1737. tab. 5. f. 7. 8. Ludw. ed. tab. 168. Dod. pempt. 607. Fuchf. 842.*

Idropepe. Matth.

In Europæ subhumidis, ad fossas ☉.

Caul. longior. Fol. subpetiol. longiora, & angustiora, undulata, e viridi-flavescent. Vaginæ coloratæ, latæ. Stipul. ciliatæ. Spicæ densæ, tenues. *Var. fl. albo. Sapor piperis.*

10. *Perficaria*. P. fl. hexandr. digynis: spicis ovato-oblong. fol. lanceolat. stipulis ciliatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 702. Black. tab. 118.*

Perficaria minus. Bauh. hist. 3. p. 779.

Perficaria. Matth. Trew. Comm. nov. 1737. tab. 5. f. 3. 4. 5. 6.

b. Perficaria minor. Morif. hist. 3. f. 5. tab. 29.

c. Polygonum. Hall. helv. n. 1556. Fol. subtus albo-tomentosa.

In Europæ humidis, & ad vias ☉.

Caul. 1-3-pedal. ramolus, sæpe rubens. Fol. subpetiol. ex elliptico-longe lanceol. plerumque glabra, nervis, & oris plerumq. macula nigra notatis. Vagina lacera. Spicæ laxiores. Fl. albi, vel rubri.

11. *barbatum*. P. fl. hexandr. trigynis: spicis virgatis; stipul. truncatis, setaceo-ciliatis: fol. lanceolat. *Syst. veg. ed. 14.*

Velurta-modela-mucu. H. mal. 12. tab. 77.

In China.

Caul. herbaceus, rufus. Stipul. vaginal. laxæ. Spicæ longæ, fl. remotis. *Var. caul. & fol. villosis, latioribus, & rubro-sericeis: spicis brevioribus.*

12. *orientale*. P. fl. heptandr. digynis: fol. ovat-acum. caul. erecto: stipul. hypocraterif. hirtis. *Syst. veg. ed. 14.*

Perficaria &c. Comm. rar. tab. 43. Hort. mal. 12. tab. 76.

In Oriente, India ☉.

Altitudo humana. Fol. magna, longo petiol. caulem amplectente. Racem. axillar. Cor. purpur. *Indica longe hirsutior est quam oriental.*

13. *pensylvanicum*. P. fl. octandr. digynis: peduncul. hispidis: fol. lanceolat. stipul. mucicis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Pennsylvania.

Facies P. Perficariæ, sed omnia maiora, & stri-diora. Caul. sub 3--ped. ramosus, angulatus, fistulosus, quandoq. maculat. Fol. ciliata, sæpe pubescent. quandoq. maculata, carina subius scabra. Stipul. truncatæ, mucicæ. Spicæ subracemosæ, ovatæ, floscul. pedicellat. herbaceis.

**** *Polygona fol. indivisis: fl. octandris.*

14. *maritimum*. P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. ovali-lanceol. sempervirent. caul. suffrutescente. *Syst. veg. ed. 14. Cam. epit. 691. Bauh. hist. 3. p. 376.*

In litoribus maris mediterranei &c. h.

Adfines sequent. sed omnia mai: & duriora. Fol. coriacea, subius albida, exsiccatione coerulescen. Caulis brevior, durus, perennans. Squamæ pellucid. albicant.

35. *aviculare*. P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. lanceol. caul. procumb. herbaceo. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 803. Black. tab. 315.*

Poligono maschio. *Matth.*

In *Europæ cultis ruderalis* ☉.

Caul. dodrant. Fol. parva, alterna, quandoq. ovata, vel linear. Vagin. membranac. coloratæ.

Fl. axill. vel glomerati. Cal. extus virid. intus, & margine coloratus. Cor. alba, aut subrubra.

36. *erectum*. P. fl. octandr. trigynis, axillar. fol. ovalibus: caul. erecto, herbac. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Philadelphia* ☉.

37. *articulatum*. P. fl. octandr. trigynis: spicis articul. paniculatis: stipul. vaginalibus, truncatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Canada* ☉.

Rad. parva, fibrosa. Caul. pedal. ramis superne alternis. Fol. linear. glabra. Spicæ filiform. angustiss. paniculam formantes. Cor. incarnata.

38. *divaricatum*. P. fl. octandr. trigynis, racemosis: fol. lanceol. caule divaricato, parulo. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 10.*

P. *alpinum*. *All. Fl. Ped. tab. 68. f. 1.*

Periscaria &c. *All. Spec. Ped. tab. 8. Bocc. mus. 2. tab. 83.*

b. P. *spicis* &c. *Gmel. Sib. 3. tab. 11. f. 1.*

In *Helvetiæ, Sibiria &c. pratis alpium* ☉.

Caul. erectus, cubit. & ultra, ramosus, geniculat.

Fol. petiol. subhirsuta, nervo magno, & albo.

Vagin. integræ. Stipul. ovato-lanceol. fuscæ.

Spicæ laxiss. Fl. copiosi, paniculati, albi.

39. *undulatum*. P. fl. octandr. trigynis, racemosis: fol. lanceol. acuminat. undulatis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Gottling. 1774. tab. 5.*

In *Sibiria* ☉.

Simillimum P. *divaricato*.

40. *ferratum*. P. fol. crenatis. *Syst. veg. ed. 14.*

In *Mauritania*.

Fol. oblonga.

**** *Helxine fol. subcordatis.*

41. *chinense*. P. fl. octandr. trigynis: pedunc. scabris: fol. lato-ovat. bract. cordatis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 30. f. 3.*

In *India*.

Caul. flexuosus, ramosus. Fol. petiol. (in Japonia sesquipollic.) quandoq. ovat-cordat. utrinq. glabra. Pedunc. hispidi, apice sæpius 3-fid. Fl. capitati. Stipul. vaginal. lætæ, ovatæ, integerr.

22. *sagittatum*. P. fol. sagittatis: caul. aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 13. f. 2. ic. plantæ sylvest. Helxme &c. Hort. Cliff. tab. 12. planta hort. Fagotritico &c. Pluk. mant. tab. 394. f. 5. Planta &c. Læet. amer. tab. 74.*

In Virginia, Marylande madidis ☉.

Caul. 1-2-ped. subsimpl. Fol. petiol. basi dissecta, integerr. lævia, superior. longiora. Ad exortum petioli membrana fusca. Fl. in summis ramis pauci, e viridi-albentes, & subrubent. Interdum scandit frutices.

23. *arifolium*. P. fol. hastatis: caule aculeato. *Syst. veg. ed. 14.*

Fagotritico &c. Pluk. amal. tab. 398. f. 3. In Virginia, Florida.

Caul. decumbens, scandens, ramosus, e viridirubescens. Fol. priore latiora, subpollic. longe petiolat. villosa--strigosa, inæqual. Stipul. ciliatæ, hirsutæ, truncatæ. Fl. in ramulis alterne aggregati.

24. *crassifolium*. P. fl. octandr. trigynis: fol. hastatis, carnosis: caul. decumbent. inermi. *Syst. veg. ed. 14.*

P. hastatum. Comm. Gott. 1774. tab. 6.

P. stricatum. Nov. Act. Petrop. tab. 7. f. 2.

25. *perfoliatum*. P. fol. triangularibus: caul. aculeat. stipul. perfoliato-foliosis, patentibus, subrotund. *Syst. veg. ed. 14. Burm. ind. tab. 31. f. 2.*

Fagotritico &c. Pluk. alm. tab. 398. f. 1.

In India.

Simil. P. Sagittato, & Arifolio. Caul. angulatus, Stipul. non vaginant. Fol. basi parum innuata, latiora quam longa, interdum peltata. Pedunc. ad apicem caul. pauciss. aculeati.

26. *tataricum*, P. fol. cordato-sagittat. caul. erecto, inermi: femin. subdent. *Syst. veg. ed. 14. Gmel. Sib. 3. tab. 13. f. 1. Ad. Stock. 1744. tab. 4.*

In Tataria ☉.

Habitus sequentis. Caul. cubital. a latere folior. canalicul. Petioli sulcati. Sem. scabra, e fusco-ciner.

27. *Fagopyrum*. P. fol. cordato-fagittat. caul. erectiusc. inermi: seminum angulis æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. Knor. del. 2. tab. F.*

Frumentum Saracenicum Matth. 876.

Ocymum cereale. Tabern. hist. 276.

In Asia; inter segetes Europæ quasi sponte ☉.

Caul. pedat-cubit. Fol. alterna, plicata, glabra, atro-virent. inferior. longe petiol. superior. subseffil. Fl. axillar. & terminal. laxè spicati. Cal. purpur.

28. *Convolvulus*. P. fol. cordat. caule volub. angulato: fl. obtusatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 744.*

Helline &c. Bauh. hist. 2. p. 157.

In Europæ agris ☉.

Caul. ped-cubit. volubil. angulati. Fol. petiol. acutiusc. glabra. Racemi axillar. parvi. Fl. etiam ad basin pedunc. comm. Cal. albo-virens. Anth. violac. Sem. cal. triquetro tecta.

29. *multiflorum*. P. fol. cordat. caul. volub. angulato: fl. panicula ramosa. *Syst. veg. ed. 14. Thunb. Jap.*

In Japonia.

Rad. tuberosa. Caul. filiform. Fol. 2-pollic. alterna, petiol. integerr. glabra, inferiora basi subtruncata, super. magis cordata. Fl. axillar. Panicula patentiss. Bract. ovata, acuta, integræ. *Differt a sequenti, cui simil. fl. minutis, obtusis: panicula ramosa, racemosa, patentiss.*

30. *dumetorum*. P. fol. cordato-fagitt. caul. volub. lævi: fl. carinato-alatis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 756.*

In Europæ austral. sylvis umbrosis ☉.

Habitus altior. Caul. non striatus. Panicul. e racemo composito, alterne bifario. Fl. longe peduncul. alii axill. racemosi, alii spicati. Anth. albæ.

31. *scandens*. P. fol. cordatis: caul. erecto, scandente. *Syst. veg. ed. 14.*

Fagotriticum &c. Pluk. alm. tab. 177. f. 7.

Fagopyrum &c. Sloan. Jam. hist. 1. tab. 90. f. 1.

In America 24.

Planta magna. Caul. rubens. Fl. carinati.

Obs. Petiolor. basis subtus poro perforata in P. scandente, dumetorum, Convolvulo.

striatum.

fridum.

P. fl. hexandr. digynis: fol. lineari-lanceol. stipulis ciliatis: caule divaricato, parulo: spicis interruptis, rariss. *All. Fl. Ped. tab. 67. f. 1.*

Perficaria pusilla &c. *Lob. ic. 316?*

Perficaria pumila. *Tabern. hist. 858.*

In suffis humentibus, ad stagnorum margines &c. ☉.

Caul. procumbent. rotundi, ex viridi-rubent.

Fol. alterna, petiolo dilarato-amplexice. supra

intense virid. subtus pallidiora, nervo albicante, glabra, ambitu subtilissime serrulata.

Geniculi nodosi. Fl. intus albi, extus purpur.

Stam. 5-6. Styli 2.

Bellardi.

P. erectum; fl. axillar. octandr. trigynis: fol. elliptico-lanceol. vaginis ciliatis. *All. Fl. Ped. tab. 90. f. 2.*

In Pedemontii arvis, vere florens ☉.

Rad. tortuosa, alba. Caul. erectus, 2-ped. &

ultra, rotundus, firmus, striatus, glaber, pluries per alternam dichotomiam divisus: rami

omnes florigeri, fl. alternis, subsessil. Fol.

breviter petiolat. nervo subtus eminente; ramea linear. floralia breviora, subsessil. Flos

primum albus, dein roseus, breviter pedunculat. sæpe solitar. quandoq. 2-3. Vagina argenteo colore nitens, ad basin fusca, in ore

lacera, & resecta.

602. COCCO-LOBA. Cal. 5-part. colorat. Cor. o. Bacca calycina, 1-sperm.

I. uvifera. C. fol. cordat-subrotund. nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 73. ed. plæa tab. 11.*

Uvifera &c. *Pluk. alm. tab. 236. f. 7.*

Guaiabara &c. *Plum. ic. tab. 145.*

Prunus &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 220. f. 3.*

Catesb. car. 2. tab. 96.

In America h.

Arb. procera, diffusa, ramosa, ramis vastis,

sæpe fulcratis, cortice ciner. Fol. magna, alterna, breviter petiol. basi vaginant. subrotund.

cordata, in breve, & obtusum acumen abeuntia, integerr. crassa, coriacea, nitidiss. satire virentia, nervo medio, venisq. magis,

minusq. coccineis. Racemi terminal. longiss. erecti; fructiferi penduli. Fl. parvi, albicant.

odore fl. Cerasi. Fruct. Cerasi magnitudine,

Tom. II.

E e

subrotun, vel subovati, purpur, pulpa acido-
ducis, purpur. edulis. Nux. semitrilocul,

2. *pubescens*, C. fol. orbiculat. pubescentibus. *Syst. veg. ed.*
14.

Scortea &c. *Pluk. phyt. tab.* 8.

In America h.

Arb. 60-80-ped. Coma saepe constat 2-3, tan-
tum ramis crassis, inordinatis, cortice subfu-
sco. Lignum durissimum, sub terra lapidescens.
Fol. pauca, alterna, diametro 2-ped. brevi,
& vaginanti petiol. inmixta, cordata, integerr.
venosiss. valde rugosa.

3. *excoriata*, C. fol. ovat-oblong. ramis quasi excorticatis.
Syst. veg. ed. 14. *Jacq. amer. tab.* 78. *ed. pi-
da tab.* 115.

Guaiabara &c. *Plum. ic.* 146. f. 1?

Arbor &c. *Pluk. amalt. tab.* 364. f. 4?

In America h.

Arb. 20-ped. ramosa, comosa. Fol. semiped.
alterna, petiol. integerr. nitida, rugosa, ve-
nosa. Racem. terminal. simpl.c. solitar. sur-
sum vers. Fl. exigui, flavescent. Fruct. dul-
cis, edulis.

4. *punctata*, C. fol. lanceol-ovat. *Syst. veg. ed.* 14. *Jacq. am.
tab.* 77. *ed. pi. tab.* 114.

Uvifera &c. *Pluk. alm. tab.* 237. f. 4.

In America h.

Arb. Fol. subpetiol. lata, cordata, longe emar-
gin. venosa. Fl. racemosi, sessil. Fruct. pun-
ctati, aromatici. *Var.* C. *uvifera*.

5. *emarginata*, C. fol. subrotun, exciso-emarginat. subcoriaceis,
Syst. veg. ed. 14. *Jacq. Obs.* 1. *tab.* 9.

In Amer. calidiore h.

6. *barbadensis*, C. fol. cordat-ovat. undulatis. *Syst. veg. ed.* 14.
Jacq. Obs. 1. *tab.* 8.

In Barbados h.

Habitus C. *uvifera*. Fol. 1-pollic. valde coria-
cea. Petiol. tomentoso-ferrugin.

7. *unifolia*, C. fol. ovatis, membranaceis. *Syst. veg. ed.* 14.
Coccolobis &c. *Brow. Jam. tab.* 14. f. 3.

In Jamaica h.

Recedit a congeneribus. Fol. non coriacea. Pe-
tiol. cincti membrana loco stipulae. Racem.
terminal. simpl. Fl. sparsi, pedicellati.

- leoganeensis*. C. fol. subrotund. integerr. nitidis: racemis frutuum erectis. Jacq. amer. tab. 178. f. 33. ed. piñā tab. 260. f. 30.
In Domingo fruticosus h.
Arbuse. erecta, 10-ped. ramosa. Fol. figura C. uvifera, at duplo min. coriacea, venosa.
- obtusifolia*. C. fol. oblong. obtusiss. Jacq. am. tab. 74. ed. piñā tab. 111.
In Carthagenæ fruticosus h.
Arbuse. 12-ped. ramuliss. ramis cinereis, glabris. Fol. numerosa, alterna, petiol. apice plerumq. latescente, plana, coriacea, integerr. nitida, venosa. Racem. terminal. solitar. simplic. Fl. parvi, albi. Nux. arcte calyc. involuta, atra. Fructus adstringens.
- flavescens*. C. fol. lanceol-oblon. obtusis, mucronat. Jacq. am. tab. 75. ed. piñā tab. 112.
In Domingo fruticosus h.
Arbuse. 12-ped. ramosa. Fol. numerosa, alterna, petiol. integerr. coriacea, subrigida, fere avenia, nitida, flavo-virent. Racem. terminal. erecti, simpl.
- diversifolia*. C. fol. ramusculis ovatis, ramorum ovar-cordatis. Jacq. amer. tab. 76. ed. piñā tab. 113.
In Domingo h.
Arbuse. 10-ped. ramosa. Fol. numerosa, magnitudine varia, alterna, petiol. attenuata in apicem obtusum, subcoriacea, integerr. venosa, nitida, læviter rugosa. Racem. terminal. erecti, 3-pollic. solitar. simpl. Drupa magnitudine Cerasi min. subrotund. pellicula nigricante, pulpa molli, purpur.
603. PAUL-
LINIA. Cal. 5-phyll. Petal. 4. Nectar. 4-phyll. inæqual. le. Caps. 3. compressæ, membranac. connatæ.
1. *asiatica*. P. fol. ternatis; petiol. cauleq. aculeatis. Syfl. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 61. f. 1.
Chamelæa &c. Burm. Zeyl. tab. 24.
Frutex &c Pluk. alm. tab. 95. f. 5.
Kaka-toddali. H. Mal. 5. tab. 41.
In India h.
Frutex ramis teretibus. Fol. alterna. Foliol. subsessil. lanceol-ovat. obtusiusc. crenata. Racemi axill. erecti. Aculei sparsi, recurvi. Fl. candidi, graveolentes.

2. *Seriana*. P. fol. ternatis; petiolis nudis: foliol. ovat-oblong. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 3. tab. 61. f. 2. Plum. ic. 113. f. 2.*
In America calidiore h.
 Planta sarmentosa, & volubil. Foliol. intermedia: ma: Pedunc. axillar. racemoso-panicul. cirriferi. Caps. ad basin perii sem. Foliol. sunt breviter petiol. nec adeo serrata, ut in icone Plumeriana.
3. *nodosa*. P. fol. ternatis; petiolis nudis; foliol. medio obovato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 2. f. 3.*
In America h.
4. *Cururu*. P. fol. ternatis; petiolis marginatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 61. f. 4. Plum. ic. 111. f. 2. Pluk. ph. tab. 145. f. 4.*
In America calidiore h.
 Caul. sarmentosi, scandent. flexuosi. Fol. alterna. — Foliol. petiol. oval. subserrata, glabra. Cirrhus axill. & racemi. Fruct. pyritorm. Sem. ad apicem.
5. *mexicana*. P. fol. biternat. petiol. omnibus marginatis: caul. aculeato. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 61. f. 5.*
Seriana &c. Plum. ic. 113. f. 1.
In Amer. calidiore h.
 Planta scandens, & aculeata. Foliol. sessil. lanceol-linear. obtusa, integra, glabra. Racem. axill. simpl.
6. *carthaginiensis*. P. fol. biternat. petiol. omnibus marginatis: caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 6.*
Habitat Carthagenæ h.
 Fol. cæteris magis incisa, & valde tenuia.
7. *caribæa*. P. fol. biternat; petiolul. omnibus marginat. ramis aculeatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 7.*
In Caribæis h.
 Foliol. subovat. incisuris raris.
8. *curassavica*. P. fol. biternat. petiolul. omnibus marginat. ramis inermibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 61. f. 8.*
Cururu. Plum. ic. 111. f. 1.
Cordis &c. Pluk. alm. tab. 168. f. 6.
In Curassavo h.

Foliol. sessil. ovat-oblong. basi adtenuata, incisa, crenata. Fl. racemosi. Fruct. subpyriform. triquetri, rubri.

9. *barbadensis*. P. fol. biternat. foliolo intermedio marginato; reliquis nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 9.*

In Barbados h.

Differt a priore potissimum folior. fig. & incisuris rarioribus.

10. *polyphylla*. P. fol. taternat. petiolul. nudis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 61. f. 10.*

Seriana. Plum. ic. 112.

Cordis &c. Pluk. alm. tab. 168. f. 5.

In Amer. calidior h.

Planta fruticosa, & sarmentosa. Foliol. subovata, obtusa, raro crenata. Cirrhus axillar. Panicul. longiss.

11. *triternata*. P. fol. triternat. petiolul. marginat. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 11. amer. 180. f. 38. ed. picta tab. 260. f. 29. quoad solum.*

In sylvis Domingo.

Arbores scandit ad 20. pedes. Rami longi, flexiles. Fol. multa, alterna, nuda. Fl. axill. sub 50. parvi. Cal. & cor. albicans.

12. *japonica*. P. fol. quinato-pinnat. petiolulat. marginatis: caule herbac. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia.

Caul. scandens, angulatus. Fol. alterna, petiol. foliol. infima subfessil. ovata, incisa, 2-3-fid. pollicar. foliol. intermedia ternata, petiolulo marginato: pinnis lateral. ovatis, integris, vel incis, intermedia 3-fid. Foliol. ultimum pinnatum, petiolulo articulado, marginato. Pinnæ 2-iugæ, oblong. 3-fid. infima mai: 3-fid. Fl. foliis oppositi, paniculati.

13. *pinnata*. P. fol. pinnat. petiol. marginatis: foliol. nitidis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 12.*

Clematis &c. Plum. amer. tab. 91.

In Brasilia &c. locis siccis, arenosis h.

Caul. sarmentosus, lentus. Foliol. 5. opposita, fessil. oblong.-ovat. profunde, & remote serrata. Racemi terminal. longi. Fl. parvi, ex luteo, albo, & viridi col. variegati. Caps. coccinea.

14. *tomentosa*. P. fol. pinnat. petiol. marginatis: foliol. tomentosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Obs. 1. tab. 10. & Obs. 3. tab. 61. f. 13.*

In America h.

Planta tomentosa, sicuti, & calyc. qui ex glaucosufci. Petioli inter foliol. inferiora, non marginati.

15. *diversifolia*. P. fol. supradecomposit. petiol. marginatis; infimis pinnatis, reliquis ternatis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. ibidem tab. 62. f. 14.*

In America h.

- tetragona*. P. fol. pinnatis; foliol. integerr. fructu 4-gono, subalato. *Aubl. Guian. Rumph. Arb. 5. tab. 2.*

In Gulana.

604. **CARDIOSPERMUM**. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Nectar. 4-phyll. inæquale. Capsl. 3. connatæ, inflatæ. Sem. basi cordis effigiem referentia.

1. *Halicacabum*. C. fol. lævibus. *Syst. veg. ed. 14. Rumph. arb. 6. tab. 24. f. 2. Dod. pempt. 455.*

In Indiis ☉.

Caul. debiles. Fol. ovata, incisa. Pedunc. teretes, fol. longiores. Cal. minimus, lacin. 2. min. Cor. parva, alba. *Variat fol. & fruct. min.*

2. *Corindum*. C. fol. subtus tomentosis. *Syst. veg. ed. 14.*

In Brasilia.

Simil. priori, sed caps. & fol. subtus tomentosa. Pedunc. inter cirrhos 10-11-fl. a casu fructificationum persistentes, rigidi. Capsul. arctiores.

605. **SAPINDUS**. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Capsl. 3, connatæ, ventricosæ, carnosæ.

1. *Saponaria*. S. fol. impari-pinnat. caul. inermi. *Syst. veg. ed. 14. Mont. in Zann. tab. 149.*

Nux amer. &c. Comm. hort. 1. tab. 94.

Nuciprunifera &c. Pluk. alm. tab. 217. phyt. tab. 217. f. 7.

In Indiis h.

Arb. Foliol. longa, elliptica, subundul. nutantia, petiol. longis alatis. Fruct. rotund. *Cerasi magnitudine*, niger, vel pullus.

2. *spinofus*. S. fol. abrupte pinnat. caul. spinosiss. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 20. f. 7.*

In Jamaica h.

Frutex, & rami spinosiss. Foliol. ovata.

3. *trifollatus*. S. fol. ternatis. Syff. veg. ed. 14.
In Malabar h.
4. *chinensis*. S. fol. pinnatis: foliol. laciniat. Syff. veg. ed. 14.
Kölreuteria paniculata. Ad. petrop. v. 16 tab. 17.
In China.
Cal. 5-phyll. inferus; lacin. ovatis, concavis,
membranac. inæqual. infimi lateris divergenti-
bus. Petal. 4. oblong. æqual. sursum veſta,
apice recurvo, flava. Foliol. *Crutagi Oxy-
cantha*.
-
- frutescens*. S. fol. pinnatis: fruct. coccineo. Aubl. Guian.
tab. 138.
In Guiana h.
Frutex 8-ped. superne folioſus. Fol. ampla, al-
terna. foliol. 7-iuga, ſubſſil. ovat-oblon.
acuta, integerr. Coſta inferne foliol. deſtituta,
apice acuto terminata. Fruct. axillar. racem-
oſi, globoli, coccinei, cum tuberculo ſu-
brotun. minimo, intus cavo, ad baſin aduato:
quandoq. fruct. gemelli.
- arboſcens*. S. fructu parvo, rubro. Aubl. Guian. tab. 139.
In Caribæis h.
Arb. 7-8-ped. superne ramoſa. Fol. alterna,
pinnata. Foliol. 3-iuga, ſubſſil. ovata, acuta,
integerr. glabra. Fructus axillar. racemoſi, ut
in priore, ſed min. & eiufdem coloris.
-

TETRAGYNIA.

606. PARIS. Cal. 4-phyll. Petal. 4. anguſtiora. Bacca 4-
locul. polyſper.
1. *quadrifolia*. P. fol. quaternis. Syff. veg. ed. 14. Fl. Dan.
tab. 139.
Herba paris. Carid. tab. 45. Black. tab. 286.
Bauh. hiſt. 3. p. 613.
Erba paris. Matth.
In Europa nemoribus 24.
Rad. craſſum tuber reſert. Caul. ſimpl. Fol. 4.
raro 3-5. univerticillata, lanceol-ovat. craſſuſc.
late virentia, venoſa, glabra. Flos terminal.
E e iv

- pedunculat. solitar. Petal. e viridi-pallent. *Bacca nigra*.
607. **ADOXA**. Cal. 3-fid. inferus. Cor. 4-5-fid. supera. *Bacca* 4-5-locul. calyce coarctata. Sem. solitar.
1. *Moschatelina*. A. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 94. Sabb. hort. 2. tab. 69.*
Fumaria &c. Tabern. ic. 39.
Minimus Ranunculus &c. Lob. 674.
In Europæ nemoribus 24.
Odor Moschi. Rad. crassa, geniculata, squamosa. Caul. palmar. 2-phyll. paucifol. Fol. ternata, triloba, flavo-virent. tenuiora, glabra; lobis petiolat. latera libus semibilobis, medio semitrid. Fl. spicati. Petal. luteo-virent. Stam. quandoq. 9-10. *Bacca succulenta*.
608. **ELATINE**. Cal. 4-phyll. Petal. 4. Capf. 4-locul. 4-valv. depressa.
1. *Hydropiper*. E. fol. oppositis. *Syst. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 156. Buxb. cent. 3. tab. 37. f. 2.*
Alfinastrum &c. Paris. 5. tab. 2. f. 1. 2.
In Europæ inundatis 24.
Caulicul. exigui, diffusi, ramosi; inde radiati.
Fol. ovat-ellipt-lanceol. Pedunc. 1-fl. Petal. rosea, vel alba, calyc. ma.
2. *Alfinastrum*. E. fol. verticillatis. *Syst. veg. ed. 14.*
Potamopytys. Buxb. Ad. Petrop. tab. 1. f. 6.
Alfinastrum &c. Vaill. parif. tab. 1. f. 6.
In Europæ fossis 24.
Caul. per aquam radicans, inde erectus, dodrant. simpl. latiuscul. Fol. Galii, lineata; inferior. acutiora, reflexa; superior. latiora, obtusa, ovat-lanceol. patula. Fl. parvi, albidi. Capf. fuscae.
609. **HALO-RAGIS**. Cal. 4-fid. superus. Petal. 4. *Drupa sicca. Nux* 4-locul.
1. *prostrata*. H. fol. lanceolat. integris; fructibus globosis. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl. Forst. gen.*
In nova Caledonia ad littora maris b.
P. intuita, fructu maturo, referebat Ammanniam latifoliam. Rami 4-gon. glabri. Fol. opposita, sessil. oblong. basi adtenuata, undulata, glabra. Fruct. axill. solitar. peduncul. globosi.

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

GRUBBIA.

Fl. subterni, lanati, intra perian. comm. 2-phyll.

rosmarinifolia. *G. Berg. Fl. cap. Ad. Stock. 1767. tab. 2. f. 3. Ad cap. b. Spei h.*

Caul. fruticos. Rami oppositi, ramulosi. Fol. opposita, linear. obruscula, margine revoluta, supra virid. subtus glauca, semiunguicul. patentia. Fl. axillar. conglomerati, sessil. albo-hirsuti. Cal. fuscus. Petal. extus albo-lanata.

GLAUCENA.

Cal. Perian. 1-phyll. 4-dent. breve, planiuscul. *Cor.* Petal. 4. subrotund. sessil.

Stam. Filam. 8. subulata, cor. breviora, inferne dilatata, incrassata, intus excavata, germini circumstantia, nectariumq. constituentia. Anth. subrotund. versatiles.

Pistil. Germ. subrotund. styl. cylindric. staminibus brevior. Stigm. simpl.

Sem.

excavata. *G. Burm. Fl. Ind.*

In India h.

Frutex. Fol. alterna, pinnata. Foliol. plurima, petiolat. ovat-oblong. vix crenata, pubescent. Racemi paniculati.

SODADA.

Cal. Perian. 4-phyll. inæqual, deciduum, lacinia super. maxima, convexa, gibba, compressa: 3. inferior., æqual. lineari-lanceol. patent., margine ciliat.

Cor. 4--petal. inæqual, calyc. longior. Petal. 2. superior. recondita primum inter laciniam magnam calycis, ovata, acumin. plana: 2. infer. alternantia cum calyc. 3. lacinis minor: oblonga, acuta, plana, margine, & subtus villosa.

Stam. Filam. 8. filiform. petalis longiora, inæqual. inclinata, fusco-virid. Anth. simpl. erectæ, flavæ, lanceol. recurvæ.

Pistil. Pedicellus ex receptac. filiform. inclinatus, longitudine stamin. Germ. globosum, 4-sulcat. Styl. subulat. Stigm. acutum.

Peric. Fruct. Nuce Coryli maior.

decidua.

S. Forsk. *Æg.*

In Arabia h.

Frutex diffusus, ramis alternis, remotis, sesquipollic. patentibus. Fol. decidua, raro præsentia, sessil. oblon. Spicæ 2. breves, patentes. Pedunc. a spinis exeuntes, terni, 1-fl. Fl. & fruct. rubri.

MALICOPE.

Cal. Perian. inferum, campanulat. 4-part. lacin. rotundat.

Cor. Petal. 4. ovat. acumin. patentia. Nectar. germinis basi adnatum, 8-fid. lacin. crenatis.

Stam. Filam. 8. subulata. Anth. erectæ, subcordatæ.

Pistil. Germ. ovat. apice 4-lobum. Styl. brevis, sub 4-angul. Stigm. crassiusc.

Peric. } Germ. 4-sperm. forte in baccam abiturum.
Sem. }

Obs. Genus obscurum, ulterius examinandum.

HEYMASSOLI.

Cal. Periant. 1-phyll. 4-part. lacin. acutis.

Cor. 4-petal. petal. oblong. obtusis, supra tomentos. albis, receptac. pistilli insertis.

Stam. Filam. 8. Anth. linear. oblon. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum. Styl. brevis, cylindr. Stigm. acutum.

Peric. Drupa ovata, 1-locul.

Sem. unicum, putamine fragili inclusum.

spinosa.

H. Aubl. *Guian.* tab. 125.

In Guiana h.

Frutex 3-6-ped. ramis tortuosis, aculeat. Fol. alterna, petiol. ovata, integerr. glabra. Acul. axill. solitar. Fl. axillar. corymbofi, pedunculat. Petal. inferne virent, superne alba, & tomen-

OCTANDRIA MONOGYNIA. 443

tofa. Interdum flos 3-petal. & flam. 6. Drupa
flava. Nucleus edul.

inermis.

H. Aubl. *Guian.*

In *Guiana* h.

Caret aculeis. Fl. expansi odorem *Caryophylli*
aromatici exhalant.

A N I B A.

Cal. Perian. 1-phyll. 6-part. lacin. ovat. obtusis,
concavis.

Cor. nulla.

Stam. Filam. 8. receptac. pistill. inserta. Anth.
2-locul.

Pistil. Germ. subrotund. styl. brevis. Stigm. ob-
tusum.

Peric.

Sem.

Guianensis.

A. Aubl. *Guian. tab.* 126.

In *Guiana* h.

Arb. 40-ped. & ultra, apice ramosiss. Fol. op-
posita, petiol. 3-4-5. verticill. ovat-oblon.
acuta, integerr. glabra. Fl. axillar. racemosi,
minimi. Cal. virid. Lignum trunci citrinum,
aromaticum.

I R O U C A N A.

Cal. Perian. 1-phyll. 5-part. lacin. brevioribus,
acutis.

Cor. nulla.

Stam. Filam. 8. tria breviora; 5. longiora, disco
inserta. Anth. oblon. 2-locul. intra singula
filam.

Pistil. Germ. ovat. ad basin disco cinctum. Styl.
oblong. crassus. Stigm. compressum.

Peric. Capf. globosa, 1-locul. 3-4-valv.

Sem. 3-4. membrana pulposa, rubra obvoluta,
placentæ in medio adfixa.

Guianensis.

I. Aubl. *Guian. tab.* 127.

In *Caienna*, & *Guiana* h.

Frutex ramosus. Fol. alterna, petiol. ovata,
dentata, glabra. Stipul. minimæ, acutæ. Fl.
axill. & supra tuberc. caul. & ramorum fasci-
culat. peduncul. Cal. albus. Capf. subearnosa,
violac.

M A T A Y B A.

Cal. Perian. maximum, 1--phyll. 5--part. lacin. subrotun. acutis.

Cor. Petal. 5. subrotun. emarginata: petalum quodlibet continet foliol. 2. minora, villosa, alba, prope unguem adnata, cal. disco inserta.

Stam. Filam. 8. cor. longiora, disco inserta intra petal. Anth. 4-gon. 2-locul.

Pistil. Germ. ovatum, disco ad basin cinctum. Styl. nullus. Stigm. obtusum.

Peric. Capf. ovat. oblon. compressa, utrimq. sulco longitudinali notata, 1-locul. 2-valv.

Sem. 2. reniformia.

1. Guianensis. M. Aubl. *Guian. tab.* 128.

In Caribæis h.

Arb. 30 60-ped. superne ramosiss. rami in centro longi, erecti; cæteri sparsi, horizontal. Fol. alterna, pinnata. Foliol. 4 6-8. opposita, vel subopposita, sessil. ovat. obrusa, integerr. glabra. Fl. axillar. aut terminal. Paniculæ ampliss. Cor. exigua, alba. Capf. subvirid.

I C I C A.

Cal. Periant. 1-phyll. 4-dent. denticul. subacutis.

Cor. Petal. 4-5-6. oblonga, acuta, erecta, in tubum conniventia, apice extus incurva, disco inserta.

Stam. Filam. 8. disco inserta. Anth. oblong. 2-locul.

Pistil. Germ. subrotun. ad basin disco cinctum. Stylus brevis. Stigm. capitat. planum, concav. 4 sulcat.

Peric. Capf. coriac. subrotun. acuta, vel ovata, 2-3-4-valv.

Sem. Olficul. 2-3-4. angulata. pulpa rubra dulci obvoluta, aut alba.

Guianensis. 1. fl. cespitosus, supra, & ad axill. folior. Aubl. *Guian. tab.* 131.

In Guiana h.

Arb. 15-ped. superne ramoso-pinn. ramis sparsis. Fol. impari-pinn. Foliol. opposita, subsessil. ovat. acut. integerr. glabra. Fl. congesti, breviter peduncul. Petal. subvirid.

- altissima*. *E cortice stillat succus resinofus, aromaticus.*
 1. fol. amplifsim. impari-pinnat. fruct. racemoso.
Aubl. Guian. tab. 132.
In Guiana h.
 Arb. 60 ped. superne ramofiff. ramis fparfis.
 Fol. alterna. Foliol. magna, longe, & obtuse acumin. tubseffil. integerr. rigida, glabra, utrimq. 3. oppositis. Capf. magna, extus valvul. verrucolis, rufefcentibus.
- Aracouchini*. 1. balsamitera; fol. ternatis--quinatis. *Aubl. Guian. tab. 133.*
In Caribæis.
 Arb. 15-ped. superne ramofa, ramis fparfis.
 Fol. alterna. Foliol. ovat. integerr. glabra.
 Fruct. axillar. & terminal. racemofi.
Stillat succus balsamicus, subflavefcens, odore grato.
- enneandra*. 1. fol. ternat-quinatis. *Aubl. Guian. tab. 134.*
In Caribæis h.
 Arb. 30-ped. superne ramofa. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. oppofita, petiol. ovata, acuta, integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Petal. 5-6. alba. Capf. flavefc.
- decandra*. *Stillat succus resinofus, & aromaticus.*
 1. fol. pinnato-quinatis. *Aubl. Guian. tab. 135.*
In Caribæis h.
 Arb. 40-50-ped. superne ramofa. Fol. alterna, impari-pinn. Foliol. oppofita, petiol. ovat. acumin. integerr. rigida, glabra. Fl. axillar. & terminal. paniculati. Petal. 5. viridi-albent. Capf. fubvirid.

TALISIA.

- Cal.* Periant. 1-phyll. 5-part. lacin. acut.
Cor. Petal. 5. ovat. difco ovarii inferta. Squamulæ 5. breves, erectæ, pilofæ, flam. te-gentes, intra petal.
Stam. 8. brevia, difco inferta. Anth. oblon. 2-locul.
Piffil. Germ. minimum, fubrotund. Sryl. breviff. Stigm. obtufum.
Peric. fubrotun. 4-locul.
Sem. . . .

Guianensis. T. Aubl. *Guian.* tab. 136.

In Caribæis h.

Arbusc. ramosa. Fol. alterna. impari-pinn. Foliol. crebra, ovar-oblong. acuta, glabra. Fl. paniculati, exigui. Panicul. & fl. rosei.

TRIGONIS.

Cal. Periant. 5-phyll. lacin. oblong. obtusis, erectis, concav.

Cor. Petal. 5. triangular. erecta, basi acumin. plana, intus hirsuta, longitudine calyc. apice villosa.

Stam. Filam. 8. subulata, erecta, basi hirsuta, petal. duplo longiora. Anth. oblong. incumbentes.

Pistil. Germ. ovar. superum, hirsutum. Styl. nullus. Stigm. simpl. obtusum.

Peric.

Sem.

tomentosa.

T. Jacq. *amer.* p. 102.

In Domingo sylvaticis h.

Arbusc. 12. ped. erecta. Rami junior. & fol. costæ subtoment. Fol. semiped. altern. abrupte-pinn. Foliol. utrimq. plerumq. 3. oblong. basi adtenuata, serrata, supra glabra, subtus toment. exter. ma. sæpe semipedal. costaq. longiora. Racem. axillar. 7-pollic. simpl. erecti. Fl. numerosi, parvi. Petal. subflavesce.

Diâ Trigonis ob petala inversum sriangul. Iso-scal. referentia.

DIGYNIA.

LITCHI.

Cal. **P**eriant. parvum, 5-dent. extus pubescens.

Cor. 5-petal.

Filam. 6-8. inferne pubescent. Anth. oval. emarginatæ.

OCTANDRIA DIGYNIA.

447.

Pistil. Germ. 2-lobat. Styl. brevior flaminibus.
Stigm. 2. divergentia.

Peric. Drupa subrotunda, squamata. Nucleus
ovalis. Caro edulis.

chinesis.

L. Sonnerat. Voyag. aux Indes 2, tab. 129.
In China h.

Arb. magna, ligno tenero, albo. Fol. alata.
Foliol. 5-7. ovali-lanceol. acuta, integerr. op-
posita, breviter petiol. utrimq. glabra, supra
longitudinaliter sulcata, nitida, dura. Fl. pa-
nicula terminali, parvi, herbacei. Fruct. ma-
turus subruber, edulis.

T O N D I N.

Cal. 4-fid.

Cor. 8-9-petal.

Stam. 8. 4. longiora, 4. breviora. Anth. glo-
bulosæ.

Pi. il. Stigm. 2. quorum unum altero crassius.

Nectar. 4. luteæ.

Peric. Caps. vel potius nucula pollicem fere lon-
ga, turbinata, superius e rotundo-molliter 3-
gona, & inter torulos exiguo mucrone instru-
cta, 3-valv. 3-locul. Nuclei 3.

Simile Paullinæ.

surinamensium, T. Schilling. de Lepre tab. 1.

Clematis 5-phylla. *Plum. Amer, tab. 91.*

In locis uliginosis h.

Frutex mediocr. magnitudinis. Caul. trianguli.

Coma diffusa, caulicul. longis, foliosis, cir-
rhosisq. Fol. pinnata, quina uni petiolo. Fl.
axillar. racemosi, candidi.

Valet in Lepre.

T R I G Y N I A.

T O U L I C I A.

Cal. **P**eriant, 1-phyll. 5-dent. lacin. subrotun.
concavis.

Cor. Petal. 4. calyc. ma. lanceol. apice villosa, disco pistil. inserta.

Stam. Filam. 8. alterna min. disco inserta. Anth. ovat. 2-locul.

Pistil. Germ. oblong. sub 3-gon. disco insidens. Styli 3. breves. Stigm. acuta.

Capf. trialata, 3-locul. singul. alis 2-valvibus. Sem. solitar. ovata.

Gulanensis. T. Aubl. Guian. tab. 140.

In Caribæis h.

Arb. 20-30-ped. superne ramosa. Fol. alterna, pinnata. Foliol. 8-iuga, subopposita, subsessil. ovata, acuta, integerr. glabra, Fl. axillar. & terminali paniculati. Ramus paniculae 3-gon. villosus, tactu asper. Fl. in glomerulos densos sparsi, & in spicam dispositi, exigu, sessil. Cor. apice rubro. Capf. rufescens.

PENTAGYNIA.

POLYSCIAS.

Umbel. maxima, verticillato-prolifera, umbellul. terminal. multiradiat. planis.

Periant. proprium: margo truncatus, persistens, vix conspicue denticul. notatus.

Cor. Petal. 6-7-plerumq. 8. lanceol-subulata, patentiss.

Stam. ex numero petalorum subulata.

Anth. erectæ, 4-fulcræ.

Pist. Germ. inferum, hemisphæric. calyce marginatum. Stry. nulli. Stigm. 3-4-plerumq. 5. breviss. erect-patentia.

Peric. Bacca globosa, 4-locul. calyc. margine, pistillisq. coronata.

Sem. solitar. triquetra, convexa.

P. Forst. gen.

Ad insulas maris austral.





CLASSIS IX.

ENNEANDRIA.



MONOGYNIA.

611. *Tinus*. Cal. erectus, campanulat. 5-fid. Cor. 5-part. Nectar. urceolat, includens germen. Bacca 3-locul. Sem. solitar.
609. *Laurus*. Cal. o. Cor. calycina, 4-6-8-part. segmen. erectis, concavis. Nectar. glandulis 3. bifetis, germen cingentibus. Filam. interior. glandulifera. Drupa oval. 1-sper. *Var. num. flum. & cor. calycinæ divisione.*
610. *Anacardium*. Cal. erectus, 5-part. Pet. 5. reflexa. Stam. 9. decimo castrato, Nux magna, reniform. supra receptacul. carnosum.
612. *Cassya*. Cal. o. Cor. calycina, 6-part. Nectar. glandulis 3. truncatis, germen cingentibus. Filam. interior. glandulifera. Drupa ovata, 1-sper.

TRIGYNIA.

603. *Rheum*. Cal. o. Cor. impervia, basi angustata, persistens, 6-fid. lacin. obtusis, alternis minorib. Sem. 1. triquetrum, margine membranac. Fl. paniculati.

HEXAGYNIA.

614. *Butomus*. Cal. o. Pet. 6. duorum ordinum; exter. mucronata, duriora. Capf. 6. polysper. 1-locul. Involucr. umbellæ 3-phyl.

MONOGYNIA.

609. LAURUS.

Cal. o. Cor. calycin-4-6-8-part. Nectar. glandulis 3. bifetis, germen cingentibus. Filam. interior. glandulifera. Drupa 1-sperm. corolla calycina comprehensa. *Variat num. flaminum, & cor. calycinæ divisione.*

1. *Cinnamomum*.

L. fol. trinerviis, ovat-oblong. nervis versus apicem evanescentibus. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. ed. pida tab. 117. Black. tab. 354. Burm. Zeyl. tab. 27.*

Cassia &c. Herm. Lugd. tab. 655.

b. Katou-Karva. H. mal. 5. tab. 53.

In Martinica, Zeylona h.

Arb. 20-ped. & ultra, comosa, trunco seped. col. e fusco-ciner. Fol. opposita, breviter petiol. 3-5-pollic. plerumq. ovat-oblong. vel ex oblong-acumin. vel subovat. obtuse acumin. integerr. coriacea, nitida, supra læte virent. subtus albescent. nervis candicantibus, odore *Cinnamomi*. Pedunc. axill. 3-fl. vel 3-fid. pedicell. 3-fl. Fl. parvi, e flavo-virent. odore subfoetido. Fruct. olivæform. satore cœruleus. *Dioica enneandra.*

2. *Cassia*.

L. fol. triplicinerviis, lanceol. *Syst. veg. ed. 14.*

Cinnamomum &c. Burm. Zeyl. tab. 28.

Cassia lignea. Black. tab. 319.

Cerna. H. Mal. 1. tab. 59.

In Malabaria, Sumatra, Java h.

Arb. 4-5-orgyal. Fol. spitham. & ultra, breviter petiol. supra virid., subtus dilutiora; iuniora col. hepatico, odore *Cinnamomi*. Fl. axillar. subumbellati, parvi, stelliform. dilute albicant. odori. Baccæ glandiform. maturæ cœrul-fuscae, nitentes. *An var. prioris fol. angustioribus, & obtusioribus?*

Ex cortice radic. elicitur oleum Camphora dictum.

3. *Camphora*.

L. fol. triplicinerviis, lanceol-ovat. *Syst. veg. ed. 14. Kamph. am. exot. tab. 771. Black. tab. 347.*

Arbor &c. Breyn. prod. is. 16. tab. 2. Comm. hort. 1. tab. 95.

In Japonia h.

Caudex ramis longe, lateque brachiatis, cortice nitente. Fol. prior. æmula, alterna, petiol. palmar. 2. digit. transversos lata, nitida. Fl. parvi. *Var. baccis rubris, flavis, atro-purpur.*

4. *Cullilaban*. L. fol. triplicinerviis, oppositis. *Syst. veg. ed. 14.*

Cortex &c. *Rumph. amb. 2. tab. 14.*

In India Orient. h.

Arb. alta, foliatura densa. Fol. *Cassia Lignea* æmula, palmaria, 3-4. digitos lata, opposita, ovat-acum. firma, supra lature virid., & glabra, subtus cinerea.

Genus dubium ab fol. opposita; fide Rumphii receptum.

5. *Chloroxylon*. L. fol. trinerviis, ovatis, coriaceis; nervis apicem attingentibus. *Syst. veg. ed. 14. Brown. Jam. tab. 7. f. 1.*

In Jamaica h.

Fol. rigida, glabra. Fl. singular.

6. *glauca*. L. fol. nervosis, lanceol. perennibus: ramulis tuberculat. fl. solitar. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

Kuru &c. *Kampf. am. exot. Fasc. V. p. 770.*

In Japonia h.

Arbor. Rami patentiss. cinerei, punctis elevatis scabridi. Ramuli subverticill. Fol. in apice ramulor. frequentia, 2-pollic. & ultra, alterna, petiol. acum. obruso, parula, integerr. margine reflexo, nervosa, supra pallide virid. subtus glauca, vel lutea. Petiol. unguicular. Fl. inter fol. sparsi, breviter peduncul. Drupa ovata, apice parum attenuata, obtusa, cœruleo-atra, magnitudine *Pisi*.

Oleum fructuum expressum pro fundendis candelis inservit.

7. *pedunculata*. L. fol. nervosis, oblongis, integris: fl. solitar. pedunculatis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Caul. fruticosus. Rami a casu folior. nodulosi, rugosi, cinerei. Fol. 2-pollic. opposita, breviter petiol. acumin. glabra. Fl. in apice ramulor.

8. *nobilis*. L. fol. lanceolat. venosis, perennantibus: fl. 4-fid. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 175. Cam. epit. 60. Dod. pempt. 849.*

F f ij

Lauro. *Mauth.*

In Italia, Græcia h.

Arb. glabra. Fol. alterna, petiol. ovat-lanceol. undulata, odora. Flos decolor. Bacca satore coerul. *Scam. numero variant: fl. pleno etiam ludit. Dioica est.*

9. *indica*. L. fol. lanceolat. perennantibus, planis: ramulis tuberculat. cicatricibus: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Pluk. alm. tab. 301. f. 1.*

Laurus latifolia &c. *Barr. rar. tab. 877.*

Cinnamomum &c. *Seb. thes. 2. tab. 84. f. 6.*

In Virginia h.

Arb. alta. Fol. inter L. *nobilem*, & *Lauro-cerasum*; seu *Pudi æmula*, col. subviridi, non ita firma, ut *Laurus*, subpalmar. latitudine 6-unc. Bacca oblong.

10. *Persea*. L. fol. ovat. coriaceis, transverse venosis, perennantibus: fl. corymbosis. *Syst. veg. ed. 14. Jacq. Amer. ed. pida tab. 264. f. 92. quoad fructum.*

Persea Plum. gen. tab. 20. *Clus. hist. 1. p. 2.*

Prunifera &c. *Sloan. Jam. hist. 2. tab. 222. f. 2.*

Arbor &c. *Pluk. alm. tab. 267. f. 1.*

In America calida h.

Altitudo, & extensio *Pyri*. Fl. multi, parvi, albi, subodori. Fructus gratissim. pugni maior, ex rotundo-obverse ovat. maturus ex fusco-fature purpurasc. Caro butyracea, sapore iucundo. Nucleus subrotund. albus, non edulis.

11. *Borbonia*. L. fol. lanceolat. perennantibus: calyc. fructus baccatis. *Syst. veg. ed. 14. Cates. Carol. 1. tab. 63. Seligm. ic. 26.*

In Carolina, Virginia h.

Arb. elegans. Fol. magna, vix petiol. glabra, venosa, subtus pubescent. nervis transversal. Fl. axillar. longe peduncul. corymbosi. Fruct. glandiform. quandoq. globosus, carnosus, purpureus, vel aureus.

12. *lucida*. L. fol. oblong. ferratis; ramulis ternis: fl. axillaribus, solitar. subsessil. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap.*

In Japonia h.

Arb. tota glabra. Rami divaricati, nodosi, cinerei. Fol. in apice ramulor. sparsa, 1-fesquipollic. breviter petiol. acumine obtuso, mar-

- gine reflexo, supra lucida, subtus pallida.
Fruct. oblongi.
13. *umbellata*. L. fol. ovatis, serratis: ramulis umbellatis: fl. racemosis. *Syst. veg. ed. 14. Thumb. Jap. ta.*
In Japonia h.
Caul. fruticosus, ramosiss. Rami subterni, incurvi, tuberculati, cinerei. Ramuli erecti, subumbellati. Fol. in apice ramulor. sparsa, pollic. & ultra, petiol. obtusa, marginata, nervosa, supra nitida, subtus pallidiora, glabra. Fruct. magnitudine *Pisi*, globosi, coerul.
14. *aestivalis*. L. fol. oblong. acumin. venosis, annuis, subtus rugosis: ramis supra-axillaribus. *Syst. veg. ed. 14.*
Cornus &c. Catesb. car. 2. tab. 28?
In Virginia ad ripas rivulorum h.
Arbor. Fol. petiolat. Fl. umbellati, involuc. 4-phyll. ut in *Corno*. Pedunc. fructiferi colorati. Cor. alba.
15. *Benjoin*. L. fol. ovatis, utrimq. acutis, integris, anerviis, annuis. *Syst. veg. ed. 14.*
Arbor &c. Comm. hort. 1. tab. 97. Pluk. alm. tab. 139. f. 3. 4.
In Virginia h.
Caudex fuscus. Fol. Citriform. sed molliora, tenuiora, mucronata, supra pulchre virid. subtus albidiora, odore ingrato. Fl. exigui. Cor. e luteo-herbac.
16. *Sassafras*. L. fol. integris, trilobisque. *Syst. veg. ed. 14. Trew. Ehret. tab. 69. 70. Black. tab. 267.*
Cornus &c. Pluk. alm. tab. 222. f. 6. Catesb. car. 1. tab. 33. Seligm. ic. tab. 10.
In Virginia, Carolina, Florida h.
Arbor pumila. Fol. primi anni elliptica, integerr. dein triloba. Racemi terminal. Fl. lutei. Baccæ maturæ purpur. *Mareo 5-petal. 8-andri: hermaphrodite 6-andrie.*
-
- globosa*. L. fructu nigro: calyc. rubente, *Aubl. Guian. Borbonia &c. Plum. gen. 4.*
In Guiana.
611. ANA-CARDIUM. Cal. 5-part. Petal. 5. reflexa. Stam. 9. unico castrato. Nux reniform. supra receptacul. carnosum.

1. *occidentale*. A. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer. tab. 181. f. 35. ed. piñā tab. 121. Black. tab. 369.

Pomifera &c. Catesb. car. 3. tab. 9.

Castuvium. Rumph. amb. 1. tab. 69.

Caschon. Mer. Surin. tab. 16.

Kapa-maua. H. mal. 3. tab. 54.

In Indiis h.

Arb. 20-ped. comosa, ramis inæqual. fulcratis.

Fol. alterna, petiol. subovata, coriacea, in-

tegerr. nitida. Panicula terminal. diffusa, co-

rymbosa. Fl. pl. parvi. Cal. supra receptacul.

carnosum, pyriforme. Cor. rubra, suaveolens.

Nux reniformis, flavo-coccinea. Nuclei albi,

dulces, sapore viroso, acidulo.

Nux alex. caustico statet; e qua, candelæ admota,
ignis luforius physici.

612. TINUS. Cal. 5-fid. Cor. 5-part. Nectar. urceolat. includens
germen. Bacea 3-locul. Sem. solitar.

1. *occidentale*. T. Syst. veg. ed. 14.

Volkameria &c. Brow. Jam. tab. 21. f. 1.

Baccifera &c. Sloan. Jam. hist. 2. tab. 198. f. 2.

In Jamaica h.

Arb. trunco crasso, cortice lutescente, ramis in

orbem dispositis. Fol. in apice ramulor. 3. unc.

longa, $\frac{1}{2}$ unc. lata, petiol. lævia, obscure virid.

Baccæ pl. Pist. magnitudine, subrotund. pedunc.

cul. pallide luteæ, glabræ, calyc. fusco coro-

nata; pulpa dulci, alba, farinacea; ossiculo

fusco.

613. CASSYTA. Cor. calycina, 6-part. Nectar. glandulis 3.
truncatis, germen cingentibus. Filam. inter-
iora glandulifera. Drupa 1-sper.

1. *filiformis*. C. filiformis, laxa. Syst. veg. ed. 14. Jacq. amer.
tab. 79. ed. piñā tab. 116.

Cuscutea &c. Pet. rar. tab. 49. f. 12. Pluk. alm.

tab. 172. f. 2. Rumph. amb. 3. tab. 184. f. 4.

Acaisia-valli. Hort. mal. 7. tab. 44.

In India.

Herba Cuscutea; fructificatio Lauri. Planta para-

sitica, diffusa, aphylla, filamentosa, ramul.

inordinat. nitida. Cauliculus emittit pl. verru-

cas situ longitudinali, pedibus Erucarum omnino

similes. Spicæ lateral. crassæ. Fl. minimi, albi,

inodori. Fruct. Pisiform. albi, nitidi, pelluci-

di, sapore dulci.

2. *corniculata*. C. ramis lignosis, spinosis. *Syst. veg. ed. 14. Burm. Ind. tab. 33. f. 1.*
In Celebis montibus, inter truncos putridos h.
 Rami pedal. crassitie digiti. Spinæ solitar. recurvæ. Fol. spinis min. lanceol-linear. Baccæ subsessil.

TRIGYNIA.

613. RHEUM. **C**AL. o. Cor. 6-fid. persistens. Sem. 1. triquetrum. Fl. paniculati.
1. *Rhaponticum*. R. fol. (subrotundo-cordat.) glabris; petiol. subtus sulcatis. *Syst. veg. ed. 14. Black. tab. 262. Sabb. hort. 1. tab. 34. Knorr. del. 2. tab. R. Aln. Rhap. 1. tab. 1.*
In Thracia, Scythia, Monte auro 24.
 Fol. vix undulata, & fere plana, virid. adspersa poris. Petioli subtus rubri. Panicul. rotundata, ramul. confertis. Corollul. & pedicelli nivei.
2. *Rhabarbarum*. R. fol. (oblong-cordat. undulatis) subvillosis; petiol. æqualibus. *Syst. veg. ed. 14. R. undulatum. Amœn. acad. 3. tab. 4. In China, Sibiria h.*
 Fol. magis oblonga, & undulata, canescentia, pilis brevissim. rectis, albidis. Panicula oblonga, ramul. divaricat. corollul. & pedicell. albidis.
3. *palmatum*. R. fol. palmatis, acumin. *Syst. veg. ed. 14. Linn. fasc. 7. tab. 4. Ad. Angl. 1763. tab. 12. Black. tab. 600. a. b.*
Rhabarb. Brun. orient. tab. 73. In China ad murum 24.
 Fol. scabriuscula; seminalia ovalia, & integra. Gemmæ obscure rubræ. Folioli 1-cin. oblong. acutiusculæ. Est R. officinale genuinum.
4. *compactum*. R. fol. sublobat. obtusiss. acute denticulat. glaberr. lucidis. *Syst. veg. ed. 14. Mill. Dict. tab. 218.*
 Fol. magis quam reliqua, coriacea, seu compacta. Lobi rotundati, obsoletiores, crenati, margine cartilagineo, utrimque glaberr. venis rubultioribus. Paniculæ rami nutantes.

5. *Ribes*, R. fol. granulat. petiolis æqualibus. *Syst. veg.* ed. 14.

Lapathum &c. *Dill. elth. tab.* 158. f. 192. *Po-coch. orient. tab.* 84.

In Persia, Libano, Carmelo &c.

Fol. subrotunda, aspera, & verrucosa.

6. *tataricum*, R. fol. cordato ovat. integris, planis, glaberr. petiol. semiteret. angulatis: panicul. sulcata. *Syst. veg. ed. 14. Lin. Suppl.*

In Tataria min. &c.

Folia magna, radicalia, humo incumbent. Petioli rubri. Nervi folior. valde dilatati. Inflorescentia vix fol. altior. Racemi sulcati.

7. *hybridum*, R. fol. cordatis, acuminat. planis; radicalibus utrimq. 2-3-dent. reliquis repandis. *Syst. veg. ed. 14. Comm. Götting. 1779. vol. 2. tab. 1.*

Habitas

Gemma vernalis, ovata, rubra. Caul. fistulosus, internodiis subpedal. punctis rubris confusus. Fol. petiol. patentiss. subvillosa: radical. multa, longe petiol. quaquaversum disposita, ovat-acut. quædam acuminata, cordata, quædam palmata, cætera repanda; subrugosa, 3-nerv. nervis purpur. caulina alterna, dentibus obsolete. Stipul. sesquipalm. vaginant. luteo-rubrae. Fl. pyramidati, viridi-albescent. ut in R. *Rhabarbaro*; sed min. R. *Rhapont.* Convenit igitur cum R. palmato gemma rubra; caul. alto, rubro-maculato, & internodiis magnis instructo; fol. magnis, explanatis, patentiss. & circumscript. similibus, licet forma discrepantibus: petiol. longis, rubicundis; panicul. longioribus, & magis pyramidalibus; fl. paucioribus quam in R. *Rhapontico*, non viridi-albis, & inde rubescentibus.

HEXAGYNIA.

614. BUTO-
MUS. CAL. o. Petal. 6. duorum ordinum; exteriora mucronata, duriora. Capsl. 6. polysper. 1-locul. Involuc. umbellæ 3-phyll.

ENNEANDRIA HEXAGYNIA. 457

1. *umbellatus*. B. Syff. veg. ed. 14. Fl. Dan. tab. 604. *Casalp.* 553.

Sedo adfinis &c. *Morif. hist.* 3. f. 12. tab. 5. f. 1.

Juncus floridus. *Matth.* 1037.

Juncus &c. *Lob. ic.* p. 86.

In Europæ aquosis 24.

Culm. erectus, 2-cubir. teres. Fol. radical. longiss. cubital. ensiform. triquetra. Pedunc. sub-20. ex summo culmo umbellati, digitum longi. Petal. ovata, albo, rubroq. col. varia. Stam. petalis breviora. Stigm. 2-fid. *Var. petal. totis albis.*

NOVA GENERA.

MONOGYNIA.

PALOUÉ.

P *Eriant.* duplex; exterius 1-phyll. 2-part. lacin. ovat-oblong-acut. ad basin squamulis munitum; interius 1-phyll. cyathiform. 4-5-fid. lacin. oblong. acutis, unica ma.

Cor. Petal. 3. longa, angusta, fimbriata, calyc. lacinia latiori ad basin inserta.

Stam. 9. filiform. cor. longiora, varie inflexa, disco circulari ad faucem calyc. inserta. Anth. crassæ, versatiles, 2-locul.

Pistil. Germ. pedicellat. (pedicello ab uno latere ala membranac. munito) oblong. compressum. Styl. filiform. longitudine stam. Stigm. obtusum.

Peric. Legum. longum, angustum, 1-locul. 2-valv.

Sem. 7-8. ovat. compressa, glabra.

1. *Guianensis*. P. *Aubl. Guian.* tab. 141.

In Caribæis h.

Frutex 15-ped. ramosus. Fol. alterna, subsefil. ovat-oblong. acuta, integerr. glabra, virid.

Stipul. 2. minimæ, ad basin petiolor. Fl. terminal. 3-4. peduncul. Petal. purpur. Stam. purpur. Anth. violac. Sem. subrufescentia.

VOLUTELLA.

Cal. Periant. 6-phyll. minimum deciduum; laciniæ ad basin cor. subrotundæ, ciliatæ, planæ, tres alternæ, exteriores crassiores.

Cor. inæqual. erecta, calyce quadruplo longior. Pet. 6. tria exter. ovalia, obtusa, concava, interne e basi emittentia corniculum cochlearifor. Tria alterna interiora, reliquis breviora, angustiora, lanceol.

Filam. Anth. 9. separatæ, sessil. inter cor. & nectar. pyramidales. Nectar. inter anth. & pistil. Cornicula 3. recta, transversa, spathulata.

Pistil. Germ. in calyce demersum, globosum. Styl. subulat. Stigm. capitulatum, nigrum.

Peric. Bacca globosa, coronata. Drupa sessil. rubra, *Pist* magnitudine.

Sem. unicum, rugosum, nigrum.

I. aphylla. Volutella. Forsk. *Æg.*

In Arabia 24.

Mira planta; tenuissima, tota fere nulla, sine radic. ramis, fol. caule capillari, fl. vix manifestis, arborescendit, valde implicat. surgendo fructum, in flore superum, invertit. Caul. valde volubil. fili crassitie, parum striatus, villosus. Pedunc. lateral. patentes, caule crassiores, spicati. Fl. alterni, sessil. globosi, lente min. albi.

CADAMBA.

Cal. Periant. 1-phyll. extus pubesc. caducum, integerr. undulatum.

Cor. 1-petal. infundibulif. tubo longiss. limb. 9-fid. lacin. ovalibus, obrusis; extus pubescens.

Stam. Filam. fere nulla. Anth. 9. subsessil. cor. adhærentes.

Pistil. Germ. inferum, parvum, subrotund. Styl. filiform. Stigm. parvum, globosum.

ENNEANDRIA MONOGYNIA. 459

Peric. Drupa subrot. 6-angular. compressa, umbilicata. Nucleus 6-lobat. 6-9-locul. loculis 1-sperm.

Sem. oblonga, alba.

1. *Jasminiflora*. C. *Sonnerat Voy. ag.* 2. tab. 128.

Rava-pou. *Hort. mal.* 4. p. 99.

In *Coromandel* b.

Arb. pumila, cortice nigro. Fol. opposita, petiol. ovalia, 3. pollices cum dimidio lata, 5. longa, integerr. glabra, mollia, subtus nervosa. Petiol. subrubent. tomentosi. Pedunc. ex axill. superioribus longi, dichotomi, 7-10. fl. Cor. alba, forma, & odore *Nyctanthes*.



11.3.79

11.3.79

005663107



